

B. C. D.

# SCIAGRAPHIA MORBORUM,

CUJUS

PARTEM PRIMAM,

VENIA EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ  
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

PRÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.  
HAARTMAN,

Assess. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-  
ques Reg. Ord. Waf. atque Membrum Reg.  
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

Et

RESPONDENS

ALUMNUS REGIUS

JOHANNES NORDSTEN,

Abo - Fennus,

In Auditorio Majori Die XII. Junii,  
Anni MDCCCLXXIX.

*Horis ante meridiem Consuetis.*

---

ABOÆ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.  
Joh. CHRISTOPH. FRENCKELL,

S C I A G R A P H I A  
M O R B O R U M

Cura  
ARTEM PRIMAM  
Medicinam invenit necessitas, notavit experientia, probavit ratio, suggestit casus.

W E D E L I U S.

I  
Sed tum primum homines res ipsas neglexerunt, quum nimio studio nomina querere inciperent.

G A L E N U S.

J O H A N N E S N O R D S T E N

In Acciōne Maiori Die XIIII Iunii

Anni MDCCCLXXIX.

Hoc opus invenitum Gorgetis.

M A D

Imprimētus ab ipso Vincenzo Regi Acad. Tabulari  
Joh. Christiani, Fruncerti.

S:Æ REG. M:TIS  
ARCHIATRO,  
EQUITI AURATO DE STELLA POLARI,  
REGII COLLEGII MEDICI PRÆSIDI,  
NEC NON  
ACAD. IMPER. NAT. CURIOS. REGIÆ  
ACAD. SCIENT. HOLM. SOCIETT. LITT.  
UPSAL. AC NIDROS. MEMBRO,  
NOBILISSIMO ATQUE EXPERIENTISSIMO  
DOMINO DOCTORI  
ABRAHAMO  
BÆCK,

S: E: R: E: M: T: I: S

A R C H I A T R O

**O**b immortalia *Tua* merita in ipsam ar-  
tem & Instituta Patriæ Medica; ob  
favorem vere maximum, quem mihi a  
primis retro Annis, quibus Medica medi-  
tatus sum, exhibuisti; & ob Patrocinium  
singulare, quod singulis, maxime vero  
sinceris Æsculapii atque Apollinis filiis  
indulgentissime præbes; has pagellas *Tibi*  
ut Parenti Optimo summa veneratione sa-  
cerare voluerunt & debuerunt

Præses ac  
Respondentes.

**S**cientiam Medicam, si partem ejus Theoreticam spectaveris, nostro aeo & in primis hoc seculo longe majora quam unquam antea cepisse incrementa, neminem fere in dubium vocare putamus. Quot enim inventa utilissima, assidua opera & industria Ruysschii, Morgagni, Winslovii, Albini atque Halleri, aliorumque in Anatomicis facta sunt, repertis & exhibitis injectionibus? Ex quo artificio Physiologiæ tantum accessit lumen, ut ejus ope Summus Boerhave, in primis v. Illustrissimus v. Haller mechanicas corporum functiones felicius quam antea illustrare, simulque plurimum morborum caussas detegere potuerint. Quam notabilem mutationem etiam hoc seculo subiit Chemia, postquam Immortalis Boerhave primus dedit occasionem, eam scientifice tractandi; & quantum utilitatis in Medicinam inde redundaverit, quisque facile judicare potest ex collatione Pharmacopœæ Holmiensis, operis sui quidem temporis perfectissimi, cum Anglicana, vel Svecica quam primum edenda. Quantum praeterea incrementi Historia Naturalis etiam hoc nostro aeo acceperit, id satis comprobant scripta magni nostri v. Linnei, aliorumque, in quibus & ordo Systematicus & descriptiones accuratissimæ sumnam utique merentur laudem. Quamvis v. fatendum sit, Materiam Medicam & Diætam eadem ratione auctam non esse, interim tamen constat, Historiæ Naturalis scrutatores, ope Chemicorum id effecisse, ut vires simplicium hodie multo felicius quam antea sint explicatae, & ex principiis Physicis confirmatae, rejectis Medicamentis fabulosis & obsoletis fere singulis.

TABU

Optan-

Optandum quidem suisset, ut pars Medicinæ Prædictæ, medulla ipsius scientiæ, morborumque diagnosis & prognosia concernens, tanta etiam cepisset augmenta; sed plures adfuerunt causæ, cur hæc pars utilissima illa prærogativa habetens destituta fuerit. In posterum v. quum, prater illa quæ jam a Theoretica repetit adminicula, simul observationibus Clinicis sane accuratissimis in dies locupletetur, non sine ratione speramus, hanc etiam Medicinæ partem, nisi ignavia omnia corruperit, successu temporis magis magisque exaltam iri; nec dubitamus progressus ipsius tanto majores evasuros, quanto citius & felicius morbi singuli in ordines maxime naturales distribuantur.

In hac Medicinæ practicæ parte elaboranda occupati quidem fuerunt perplurimi; nostro tamen judicio Iusti Regis Consiliario ac Medico Boissier de Sauvagesio in hoc punto maximus competere videtur honor, quamvis Archiatri Regii Linnæ & Vogel, atque Professores & Doctores Cullen, Mackbried, Selle & Sagar priusque alii recentiora edidere specimena haud contemmnda. Quum v. tanta morborum multiplicatio, quæ in operibus Boissier de Sauvagesii, Vogelii & Sagaris occurrit, neutrquam minus Scientiæ nostræ adferat incommodum vel detrimentum, quam nivis generalis & coarctata aliorum Classificatio defectum prodat; non iutile fore existimavimus, medium tenere, atque hisce Speciminiis Academicis experiri, utrum memoria dissentium ac judicia practicorum & salus agrotantium felicius ad hanc methodum sublevari & promoveri possit. Si abbreviations & correctiones nostræ, quæ in Nosologia Methodica imprimis tam quoad Classes & Ordines, quam Genera ac Species suscepimus, etiam aliorum Practicorum assensum consequi possent, vel etiam doctioribus ansam suppedarent, suis lacis benigne corrigere & complexe, quos viribus corporis jam deficientibus in medium proserre non valuerimus, suam intentum obtinuimus, tempusque huic labori impensum bene collocatum esse putabimus.

TABU-

# T A B U L A

## C L A S S I U M atque O R D I N U M.

C. I. FEBRES (*sensu strict.*): Sv. Febrar.  
Pyrexiae simplices, sine inflammatione.

O. 1. CONTINUÆ: Bråmsjukor.  
Febres, sine vera inflammatione, intermissione vel remissione.

2. INTERMITTENTES: Fråßfebrar.  
Febres, cum plenaria intermissione vel integritate.

3. REMITTENTES: *Remittenta* Febrar.  
Febres Continuae, cum exacerbationibus quotidianis, Tertianis, Quartanis l. Erraticis.

C. II. DOLORES: Wårckpassioner.  
Passiones dolorificæ locales, cum inflammatione, sive vera s. spuria, sed sine exanthematibus.

O. 1. INFLAMMATORII: Brandvårder.  
Phlegmasiæ sanguineæ, cum pyrexia universali.

2. PHLEGMONODEI: Bølde.  
Tumores inflammatorii, cum leviori & partiali pyrexia.

## TABULA

O. 3. CRUCIATUS RHEUMATICI: Fluswärder;  
Inflammationes serofæ, leviori cum  
pyrexia.

C. III. EXANTHEMATA: Utflager.  
Morbi cum efflorescentia.

O. I. FEBRILIA: Utflags Febrar.  
Phlegmasiæ cum efflorescentia.

2. APYRETA: Hetsigheter.  
Efflorescentiæ, sine prægressa pyre-  
xia.

C. IV. PROFLUVIA: Flödder.  
Evacuationes præternaturales, neque  
criticæ neque tabificæ.

O. I. HÆMORRHAGIÆ: Blodflödder;  
Profusiones sanguineæ.

2. CATARRHEUMATA: Glemflödder.  
Defluxiones acres serofæ vel mucosæ.

3. FLUXUS: Bøfflödder.  
Evacuationes Ventrals.

C. V. NERVOSI: Nervepåfioner.  
Indolentes Sensorii & Systematis  
Nervosi morbi.

O. I. MENTALES: Swårmodigheter.  
Mentis læsiones.

2. SPASMI, f. Tremuli: Convulsioner.  
Motus involuntarii.

O. 3. RIGORES: Krampsjukor.  
Temporariæ vel constantes partis s.  
totius corporis rigiditates.

C. VI. DEBILITATES: Brister.  
Sensationum & functionum abolitio-  
nes.

O. 1. PARALYTICI: Lamheter.  
Languidæ & soporosæ debilitates.

2. DYSÆSTESIAE: Sinnens Brister.  
Sensuum externorum vitia.

3. SUFFOCATIONES s. Anhelationes: Läppor,  
Respirationis vitia.

4. SUPPRESSIONES: Förföppningar.  
Functionum naturalium privationes.

C. VII. INTUMESCENTIAE: Swullnader.  
Chronicæ corporis intumescentiæ &  
decolorationes.

O. 1. CACHEXIAE: Vänsårgande Sjukdomar.  
Cacochymica corporis discoloratio  
& constitutio.

2. HYDROPS atque Emphysemata: Wattfoter.  
Tumores fluctuantes aquosi l. flatu-  
lenti.

3. TUBERA: Swullster.  
Protuberantiæ, non fluctuantes & oc-  
casionaliter tantum dolentes.

4 TABULA CLASS. atque ORDIN.

- C. VIII. MARASMI: Astyningar.  
Succi Nutritii & Pingvedinis consum-  
tiones.
- O. 1. TABES: Trän - eller Twinsoter.  
Marcores pyretici totius corporis, sæ-  
pius ab interna partium solutione.
2. ULCERA: Gårnader.  
Marcores partiales, a solutione parti-  
um externarum.
3. DEFORMITATES: Wanställningar.  
Morbosæ & Seniles transfigurationes.

## CLASSIS I.

FEBRES Sauvagesii; *Morbi Critici Linnaei*; *Febres Intermittentes & Continuae simplices* Vogelii; *Pyrexiae Cullenii* (a); *Morbi Febriles nonnullorum*. Sv. Febrar.

*Character* consistit in Augmento præternaturali caloris innati, quod præeunte frigore aliisque symptomatibus primariis (b) sic di-

A 3

ctis

(a) *Febres s. Pyrexias*, h. e. morbos febriles singulos indiscriminatim cum Clarissimis *Vogelio*, *Cullenio* & *Sellio*, intra unam solummodo Classem restringere, contra ordinem Pathologicum non minus quam Therapeuticum esse censuimus. Humores consideramus peccantes, & Quantitate, s. Diathesi phlogistica, & Qualitate, s. Dyscrasia singulari. Hæc, vix febrilis peccat 1:0 vel nimia aquositate, ut Leucophlegmaticorum humores, atque intumescientium morbi; vel 2:0 nimia muco-sitate, ut phlegmaticorum humores & Paralytodeorum morbi; vel 3:0 nimia aciditate, ut Hypochondriacorum humores & Nervosi morbi; vel 4:0 nimia biliositate & Putredine, ut Cholericorum humores, & Fluxuum atque Ulcerum morbi; 1.5:0 nimia siccitate atrabilari, ut senum humores & Deformatum morbi. Illam vero, Febres simul excitantem, consideramus: 1:0 vel ut nimis copiosa & calidam l. biliosam, quemadmodum febricitantium stricte sic dictorum, & in nonnullis Profluviorum morbis; vel 2:0 Diathesi simul densa peccantem, ut in Rheumatismodeorum morbis; vel 3:0 Diathesi densa atque simul acri contagiosa, ut in Exanthematicorum morbis; vel 4:0 Diathesi lardosa vasorum Lymphaticorum, ut in Catarrheumatum morbis; vel 5:0 Diathesi hec-tica, lardoſa & putrida, ut in Marasmorum Tabe.

(b) Ad *symptomata Aethiologica & Nosologica primaria* Februm simplicium, strictiori sensu consideratum, sequentia numerantur: 1:0 Inquietudo, cum hebe-

ctis simplicioribus, interdum etiam malignis  
(c) invadit, & per determinata temporis in-  
tervalla criticam evacuationem promovet.

## ORDO I.

tudine atque anxietate aliqua pulmonali; 2:o Lassitudo, cum artuum & spinae dorsi tensione; 3:o Fastidium ci-  
bi, cum obstipatione alvi; 4:o Pallor cutis cum collap-  
su capillarium; 5:o Extremorum frigus, cum algore,  
horrore vel rigore; 6:o Oscitatio & Pandiculatio;  
7:o Pulsus celer, initio parvus posteaque plenior; 8:o Oppressio pectoris, cum respiratione suspiriosa, iterum-  
que aucta; 9:o Calor reversus & auctus cum dolore  
Capitis & Lumborum; 10:o Oris siccitas, cum siti vehe-  
mentiori; 11:o Pervigilium & Delirium acutum transitori-  
um; 12:o Evacuationes levantes, per crises vel Lyses.

*Symptomata vero Aethiologica & Nosologica Febr-  
um compositarum, præter jam nominata sunt:* 1:o Dolores  
locales & Inflammationes; cfr. Class. II. 2:o Anxieties  
Cardiacæ s. Cardialgicæ, Exanthemata cutanea & fauces  
Aphtosæ vel Ulcerosæ; cfr. Cl. III. 3:o Hæmorrhagiæ  
non criticæ; cfr. Cl. IV. Ord. I. 4:o Destillationes, E-  
phidroses & Profluvia Catarrhosæ, cfr. Cl. IV. Ord. 2.  
5:o Vomititiones minime levantes, nec non alii Ven-  
tris fluxus primarii; cfr. Cl. IV. Ord. 3. 6:o Vertigi-  
nes, Tusses, Singultus & Convulsiones, atque Rigores Fe-  
briles, cfr. Cl. V. 7:o Comata & Suffocationes febri-  
les; cfr. Cl. VI. Ord. I. 3. 8:o Suppressiones febriles;  
cfr. Cl. VI. Ord. 4. 9:o Tumores atque Intumescen-  
tiæ febriles; cfr. Cl. VII. Atque 10:o Marasmi Febr-  
iles cum vel sine Ulcere tabescente; cfr. Cl. VIII.

(c) *Symptomata Semeiotica Febrium malignarum a  
sequentibus cognoscuntur, scilicet:* 1:o ex Symptomatibus  
febr. simplic. præter ordinem aggravantibus; 2:o Neque tem-  
poribus s. stadiis respondentibus; 3:o neque signis exter-  
nis quadrantibus. Præterea 4:o ex Doloribus Cephalalgi-  
cis vel Cardialgicis, Lumbarium & Artuum gravioribus,  
sine signis Rheumatismi vel Arthritidis; 5:o Algoribus  
& sudoribus saepius alternantibus; 6:o Vomitu sincero si-

## ORDO I.

**CONTINUÆ** Boerh. Sauv. Vog. Cull.; Continentes Senn, Stahlii, Junck. Linn.  
Brånnſjukor.

Pyrexiae phlogisticae acutae a fervore sanguinis post unum alterumve horrorem accensa, absque multis prægressis prodromis & sine perfecta intermissione l. remissione nisi matutina, in dies ingravescentes, usque quo

A 4

per

ne signis calculi; 7:o Lipothymis, Vertigine, Tinnitus  
Aurium l. surditate; 8:o Vultu squalido, vel lurido atque  
horribili, cum nimia virium prostratione; Oculis tristibus & admodum cavis, pulverulentis sive splendidis, la-  
crymosis, tumidis, alterutro altero minori, cum distor-  
fione vel amaurosi; 9:o Mente torpida s. stupida & fo-  
porosa in principio febris, cum nimia incuria l. dispi-  
centia sui; 10:o Inappetentia cibi potusque; 11:o So-  
mno aut nullo, aut turbato aut perpetuo, cum pavore  
vel ore aperto; 12:o Lingua tumida viscosa nigra; vel  
arida, sifla, rubra, dentibus nimis sordidis; 13:o Alvo  
in principio fusa, postmodum fœtida, varie colorata, in-  
voluntaria; ventre in principio tenuo, posteaque tumido inflato; Hypochondriorum tensione vel dolore; 14:o  
fillis sanguineis atris per Nares vel inter faeces; 15:o  
Pulsu plerumque debili & depresso; interdum vix per-  
ceptibili, intermittente, vel inæuali cum celeritate, vel  
celeri cum fortitudine; 16:o Jaætatione atque indecenti  
s. insolita corporis denudatione, decubitu supino & pro-  
lapsu ad pedes; 17:o Delirio Lethargico l. soporoſo ta-  
citurno continuo, delirantes circa necessaria; 18:o Tre-  
moribus, Convulsionibus, subsultibus tendinum & floc-  
corum venatu, stridore dentium insveto; Singultu cum  
aphonia; 19:o Deglutitione laboriosa, strangulatoria,  
vel Tussiculosa; cum strepitu in pectore inter potandum;  
20:o Respiratione parva, rara & frigida; immo magna  
oppressa, rara & laboriosa; sono sternoroſo intra fau-

per determinatas evacuationes maxime cutaneas finiuntur l. solvuntur. Sanguis spissus; pulsus plerumque validus & plenus; lingua ut & cutis initio arida; Urina, declinante morbo, sedimentosa, cinnabarinum quid interdum deponens. (d)

Gen. I. DIARIA Linn. Vog. *Ephemera Veterum* & Sauv. *Synocha* Cull. *Judicatoria* Sagar. Digns Feber. Febris acutissima unius l. alterius diei, fine

ces; 21:0 Sudoribus partialibus frigidis, colliquativis, in fronte viscosis cum Exanthematis pulicariis; 22:0 Ischuria; lotio nonnihil cocto vel varie tincto, albo, viridi, rufo, nigro, fœtido, ante judicationem cocto & turbido; 23:0 Ungvium, palpebrarum, vel nasi livore, hujusque acuminatione labiis lividis contractis; labiis fonticuli flaccidis pallidis & siccis f. lividis & siccis 24:0 Crisibus f. evacuationibus tempore criseos nec integris nec levantibus; Tumoribus Parotidum, pedum, Scroti, &c. lividis rufis &c.

(d) Sequentia signa Diatheseos sanguinis phlogisticae Clariss. D. D. Selle in Pyretologia sua pag. 95. alle-gavit; exæstuatio; refrigerium; neglecta sanguinis mis-sio & suppressio Hæmorrhagiæ consuetæ, atque plethora ex his caussis contracta; contagium; vulnus & alia irritamenta tam interna quam externa; constitutio robusta ac sensibilis, sit hæc l. naturalis l. ex anni tem-pestate orta, perlante nempe diu borea præcipue hie-mis tempore; sanguis de vena detractus spissus, alba l. gryfea crux obtectus ac parum l. nil seri secedens; pulsus durus, plenus, celer; lingua arida, aliquando alba; cutis initio arida; urina ante coctionem pro febris intensitate rubra, declinante v. morbo in colorem lateritium abit, turbatur, atque pulverulentum quid rubrum secedit; vires ac sensilitas bonæ; corripit abs-que multis prægressis prodromis; symptomata correspon-dentia,

ne prægressa lassitudine veniens, & interdum labiis exulceratis intra quartum definiens; facies nonnihil inflata cum rubore; pulsus frequens & mollis; sudor halitus; Urina vix mutata, sub declinazione cum concoctionis notis.

Spec. 1. DIAR. PASSIVA, occasionalis a potentiss nocentibus & formalibus.

a) — *ab ingluvie*: a) cibis calidis l. insuetis; b) crapula l. Vino fermentato; Eph. naufeat: S. sp. 2.

b) — *Hiemalis*: a) perflante diu borea; b) a balneis frigidis; Eph. a frigore S. sp. 3.

c) — *a calore*: insolatione, Ambustione, Hypocaustis l. Thermis; Eph. a cal. S. sp. 4.

d) — *a dolore*: laboribus insuetis, casu, contusione, vulnere, fractura l. luxatione; Eph. a phlogosi S. sp. 6. Judicat. plagaria Sag.

e) — *a Vigiliis*:

f) — *ab Affectionibus*: terrore, mœrore l. ira. S. sp. 3. 6.

g) — *Verminosa*: Tert. verminosa S. sp. 18. cfr. Hemitr. Verm.

*Cura*: Laxantia & Julapia antiphlogistica; e) & f) c. paregoricis mixta.

Sp. 2. DIAR. PLETHORICA, a potentiss material.

a) — *exquisita*: Vog. Præl. §. 47. S. sp. 1.

b) — *Vernalis*: medica ex emanatione Diarrhoeæ &c. Eph. annivers. S. sp. 9.

*c) — a suppressa evacuatione:* e. g. Epistaxis l. Menſ. &c. l. intermissa sanguinis missione; Eph. Menstr. S. sp. 8. Eph. dich. S. sp. 11. Errat. semilun. S. sp. 6.

*d) — Spermatica: Febr. Amatoria; Vog. gen. 17.*

*e) — Lactea puerperarum, S. sp. 5.*

*Cura:* Venæ Sect. Salia Antiphlogistica, Laxantia & Nitrosa; d) Nitrosa Camphorata cum infuso Menthae & Rutæ; atque e) c. Emollientibus externe postulat.

**Sp. 3. DIAR. COMPLICATA** s. symptomatica.

*a) — Arthriticorum:* cfr. Cl. II.

*b) — Scabiei, Urticar. &c. Erysipelacea,* Vog. gen. 68. cfr. Cl. III.

*c) — Prostivicor. & Catarrhalium:* Epistaxis; Hæmoptysis; Abortientium; Hæmorrhoidariorum; Hæmatydotica; &c. Eph. Hæm. S. sp. 10. sudor Anglicus, s. Eph. Sudat. S. sp. 7; cfr. Cl. IV: tæ morbos & symptom.

*Cura:* Antiphlogistica & morbor. primariorum.

**Gen. 2. SYNOCHUS Auctorum;** *Synocha & Synochus* Sauv. *Humoraria & Frigidaria* Sagar. *Hetsig Feber.*

Febris peracuta, cum dolore capitis; lingua alba; pulsus frequens; sitis intensa; somnus l. nullus l. cum spectris, & hinc etiam sensorii functiones turbatæ, cum insania paraphrosynica; cutis humida, alyus

alvus sicca & urina rubra; intra XI l. XIV perfecta crisi solvitur, nisi in Putridam mutetur.

Sp. 1. SYNOCH. PASSIVA, Potentialis.

a) — *a calore*: a) aëris l. Lampadum, Syn:a Tragœd. S. sp. 4. b) ex abusu spirituorum, c) medicamentis, d) ex agitazione corporis, Syn:a ardens S. sp. 2.

b) — *ex baustu frigido*: Juncker.

c) — *a dolore*: a) a Phlogosi verberum, b) ambustionis, c) ex ictu & effusione sanguinis in Cellulosa, Syn:s Tarant.? S. sp. 11. d) Vulnerum, Febr. vulneraria Vog. gen. 77. Syn:a S. sp. 7. a.

d) — *a Vigiliis*: Juncker.

e) — *ex odore Santali?* Amph. mim. S. sp. 17.

*Cura:* Diariæ passivæ.

Sp. 2. SYNOCH. PHLOGISTICA f. ardens; facie rubra & pulsu valido. *Syn. imputris Galeni.* Ordin. Hetsig Feber.

a) — *Plethora*: Simplex Hoffm. Syn:a pleth. S. sp. 1. Syn:s sangv. S. sp. 1.

b) — *Spermatica*: Syn:s, S. sp. 10.

c) — *Rheumatisans*: S. sp. 7. & *Hiemalis*, a cohibita transpiratione; S. sp. 8. Syd. T. I. p. m. 348.

d) — *Vernalis*: cum Diarrh. & post Venæ Sectionem cum sudatione; Syn:s sud. S. sp. 2. — anniverf. S. sp. 9.

*Cura:*

*Cura:* V. Sectio, Laxantia Antiphlog. Nitrofa & Julapia acidulata, tum acidis vegetabilium, tum acido Nitri, l. spir. Nitri dulcis.

Sp. 3. SYNOCH. COMPLICATA, cum aliquali colluvie gastrorum saepius comitata.

a) — *Phrenitica*, c. delirio constanti, vehementique; *Phrenitis* Græcor. Vog. gen. 18. *Phrenesis* Sydenh. a) sanguinea, Phrenit. Synochi Sauv. sp. 2. 4. — Indica S. sp. 12. — a Tarantismo S. sp. 14. Amphim. Phren. S. sp. 18. b) a repulsione Phagadænæ capitis & Plicæ; Phren. a Plica? S. sp. 8. conf. Delirium Cl. V. c) Exanthematicor. Phren. Variolosa — Morbillosa — Miliaris. S. sp. 3, 5, 6. Herpetis exulcerati. d) Inflammatorior. Diaphragmatis, Otitidis &c. Phren. a dolore S. sp. 13.

b) — *Vermifera*: a) a Vermibus in sinu frontali; Syn:a Ceph. S. sp. 8. Phrenit. Verm. Sagar. b) ab Acaris; a Scabie Synoch:s S. sp. 15. c) a Scabie retropulsa.

c) *Metastatica*: cum Pleurit. &c. — Pleur. S. sp. 5. cfr. Cl. II.

d) — *Biliofa*: Cholerica Hoffm. Syn:s Ardens S. sp. 6. — Dysenteriod. S. sp. 4. cfr. Hemitr. acut.

e) — c. *Catarrbo & Tussi*: a) Tussi aspera; b) Humida; Syn:a Catarrh. S. sp. 5. cfr. Catarrh. Cl. IV.

f) — *Inflammatorior. & Exanthematicor?* Synoch:s Variol. & — Miliaris, S. sp. 3, 14. cfr. Cl. II. & III. nec non Hemitr. acut. compl.

*Cura:*

*Cura:* Antiphlogistica & morborum primaria. In Verminalia a Verm. in sinu frontali, Decoctum Valer. c. sale Ammon. & Vitr. Mart. saturatum & c. syringa in Nares quotidie injectum Sagar. commendat.

Sp. 4. SYNOCH. MALIGNA; ex humorum putredine in putridam citius l. serius mutata. *Synochus putrida* Auctorum, *Continens putrida*; Lommii obl. Med. L. I. p. 4. *Typhus Sauvagesii* & Cullenii? (e) Rötfeber.  
 a) — *Imputris & Sporadica*, versus finem putrida & soporosa; *Synocha putr.* S. sp. 3. a) a regimine calidiori; *Synochus sopor.* S. sp. 12.

(e) Permagni interest Practico, ad diversitatem Putredinis attendere, ut etiam Cl. D. D. Selle in sua Pyretologia pag. 167 & sequ. luculenter monuit, siue a sanguine; s. a ventre & vitio liquoris nutritientis, ut in Remittentibus; s. a Miasmate Epidemicorum l. Exanthematicorum, originem suam derivent. Ad Synochum putridam, nullas alias febres putredinosa referre voluimus, quam eas, quarum materialis causa speciatim & quoad maximam partem ex vitio sanguinis, in eodem primarie genito, derivanda sit, quæque a principio usque ad finem Typum continentium observant, quæque optime cum Antiphlogisticis & acidis maxime mineralibus debellantur, minime vero Purgantibus & Vesicatoriis. Putredines vero & Colluvies gastricas, quæ cum his atque Antimonialibus depelluntur, ad Febres Remittentes; & Miasmatum putredines, quæ specificum Plumerii, ut & Mercurialia, Antimonials & Chinata &c. diaphoresin promoventia, requirunt, ad Cl. III Exanthematicorum adduximus. Primarias hujus putredinis notas ex nominati Auctoris Pyretologia recitare atque hic loci allegare non inutile esse censuimus. “Solida laxa, humores justo tenuiores,”

sp. 12. b) a perversa medicatione; c) ex laxa Corporis constitutione; d) a dispositione scorbutica; Syn:a scorb. S. sp. 6. Syn:s scorb. S. sp. 13. e) Metastatica, cum tumore parotidum.

b) — *Endemica*: sordide viventium & pauperum urbanor.; ab aëre, loci & corporis conditione, aliquantis per contagiosa: a) hyemalis, b) æstivalis, 1) sedentiariorum, sub laxa corporis conditione; 2) ab effluviis putridis tempore calido & sicco.

c) — *Epidemica*: a) ab aëre inquinato Nosocomiorum & Carcerum; Typh. carc. S. sp. 1. b) Famelica, in Svec. 1772-3 c) Epidemice contagiosa, cum Exanthemat.; Nauitarum, Nosocom. & Carceralis Anglor. cfr. Peth. Cl. III.

d) — *complicata*: a) cum inflammatione, cfr. Cl. II. b) cum Exanthem. cfr. Cl. III. c) cum Catarrho, Hæmorrh. l. Dysent. &c. sine Euphoria, confr. Cl. IV. d) Apoplecticorum &c. cfr. Cl. VI. e) cum putredine biliosa gastrorum; cfr. Remittentes; f) a pituita valorum chylopojeticor.; cfr. Hemitr. *Cura:*

“effluvia putrida, tempore calido & sicco; aër inclusus,  
“exhalationibus Animalium inquinatus; abusus carnium  
“& nimis calidorum; contagium, proprio non Exanthe-  
“maticæ indolis; sanguis laxiori contextu, quandoque  
“pellicula micanti obtectus, serum rubicundum; Lingua  
“initio alba, postea nigra & arida. Calor tacui mor-  
“dax; excreta valde fetida? Pulsus initio celer duriu-  
“sculus, postea obscurus, inæqualis; prostratio virium  
“tempore status; oculorum splendor imminutus; stupor  
“& tremores qui remittente pulsu crescent; Petechie li-  
“vidæ;

*Cura:* Julapia Antiphlogistica, c) in primis c. acido Vitriolico interdum saturata; & Chinata versus finem c. sero Lactis Vinoso, l. spiritu Mindereri. Ess. Antifebrilis n. ex Spir. Antiscorb. Dr. c. Rad. Angel. Serpent. & Valer. atque Camph. saturato maxime his utilis. Nec Cucurbitæ Nuchæ applicatae, varietati a) inutiles sunt.

## ORDO II.

INTERMITTENTES Auctorum: Fråbor,  
falla Febrar.

Pyrexiae algidæ, plus l. minus Chronicæ, a soli & stagnantium effluviis, liquorem nutrientem coagulantibus; cum pandiculatione, rigore l. horrore incipientes, atque cum subsequente calore, sudore atque urina lateritii sedimenti intra nycthemeron per lysin quidem solvendæ, ast intra determinata tempora iterum interumque revertentes. (f)

Gen. 3. QUOTIDIANA Auctorum: Quotidian. Hvardags Fråsam.

Paroxysmi similes intervallo 24 circiter horarum.

Spec. 1. QUOTID. LEGITIMA.

a) — Sim-

---

(f) Caussam intermittentium supponimus latere in peculiari & imputri humoris nutrientis ex soli effluviis & bilis inertia exorta congelatione, per singularem systematis Nervosi actionem ad sanguinem perdidice delata, & per lyses e corpore eliminanda,

- a) — *Simplex*: Sauv. sp. 1.  
 b) — *Inflammatoria*: Vernalis, c. signis diatheseos phlogisticae ad continuam inclinans.  
 c) — *bilioſo — inflammatoria*: Autumnalis phlogistica, c. colluvie bilioso fœrida gastrorum, ad horas octodecim extensa, & in Remittentes mutabilis.

*Cura*: Sal. Ammon. & Antiphlogistica c. Chinatis.

*Quot:m bilioso putridam* D:i D:s Selle, f.  
 — *Anomaliam* aliorum & — deceptivam Sauvagesii sp. 2. nec non — duplicitam ad Remittentes ablegavimus. cfr. Hemitr. acutum.

**Sp. 2. QUOTID. PARTIALIS, f. *Topica*.**

- a) — *Ophthalmica*: v. Svet.  
 b) — *Odontalgica*: Sagar.  
 c) — *Cephalalgica*: Sauv. sp. 6. Cephalalg. int. S. sp. 7. Cephalæa febric. S. sp. 4.  
 d) — *Artuum*: Qv. part. S. sp. 10. — Isch. S. sp. 5. Ischias int. S. sp. 1.

*Cura*: præcedentium.

**Sp. 3. QUOTID. COMPLICATA, aliis morbis comitata.**

- a) — *catarrhalis?* S. sp. 9. Coryza febr. S. sp. 6. cfr. Cl. IV.  
 b) — *cum Epistaxi*: v. Rosenstein.  
 c) — c. *Phlogisticitate & spasmis*: Nephralg. S. sp. 7. Nephralg. Febric. S. sp. 13. Quot. strangur. S. sp. 11.  
 d) — *Venerea Störckii*.  
 e) — *Spa-*

- e) — *Spasmodica*: — *Hysterica* S. sp. 3.  
*Hysteralg.* febric. S. sp. 9. — *Epilept.* Sagar.  
f) — *Rachitica infantum*, cum tumore  
abdominis cfr. *Hemitr.* *Lent.* *Infant.*  
g) — *Scorbutica*: cfr. *Stærckii Ann. Med.* 2.  
b) — *Soporosa*: S. sp. 8.  
*Cura*: morbi primarii c. *Chinatis*.  
*Spuriæ*:  
Quotid. *Verminosa* v. d. *Bosch*. cfr. *He-*  
*mitr.* acut.  
— *Vespertina* Sagar. cfr. *Hemitr.* *Chron.*

Gen. 4. TERTIANA Latinis; *Tertian.*  
*Paroxysmi* similes intervallo 48 circiter  
horarum.

Sp. 1. TERT. LEGITIMA c. frigore intenso; *vera*  
*Clegh.* paroxysmis haud ultra horas 12  
extensis.

a) *Vernalis*, a cohibita transpiratione: —  
*legit.* S. sp. 1.

b) — *a faburra* primarum viarum: *Tert.*  
*accid.* S. sp. 12.

c) — *Pituitosa*?

*Cura*: Laxantia Digestiva, e. g. Rad. Ja-  
lappæ c. Rad. Ari, Tartaro Tartaris. & Sac-  
charo Aurantior.

Sp. 2. TERT. EXTENSA. *Febr. Periodica Per-*  
*nicia Torti*.

Paroxysmis ultra horas 12 extensis; saepius aestivalis 1. Autumnalis. — Lipyriæ Sa-

gar. (g)

a) — *bilioso-inflammatus*. Tert. Emet. S. sp. 7.

b) — *biliosa*; c. colluvie sordida gastrorum comitata, sympt: Cardialgicis, Cholericas & Dysent. Tert. spur. S. sp. 2.

c) — *biliofa*, c. sopore: Tert. Carot. S. sp. 10.

*Cura*: Emeticico Laxantia & Chinata cum Tart. Tartarisato & Rheo saturata.

Sp. 3. TERT. DUPLICATA.

a) — *duplex*: quotidie revertens, parox. alternis similibus; — S. sp. 13.

b) — *duplicata*: alternis diebus paroxysmis binis; S. sp. 14.

c) — *triplex?* S. sp. 15. cfr. Hemitr. acutum.

*Cura*: Salina c. Pulv. Cornachini ad finem Cort. Peruviano suffulta.

Sp. 4. TERT. PARTIALIS, scilicet *Topica*.

a) — *Capitis*: Cephalæa febric. S. sp. 4. Ophthalm. febric. S. sp. 23. Odontalgica &c.

b) — *Pectoris*: Tert. Pleurit. S. sp. 4. a. Pleurod. febric. S. sp. 15. Pleur. period. S. sp. 14.

c) — *Abdominis*: Colica interm. S. sp. 21. Ga-

---

(g) Quamdiu permanenter intermittit, tamdiu etiam ut Intermittens extensa consideranda est; ubi vero frigus singulorum paroxysmorum minuitur, calor vero augetur, in Remitt, degenerat; confr. Tritæoph. comitatem.

21. Gastrod. febric. S. sp. 17. Hysteralg. febric. S. sp. 9. Nephralg. intermitt. v. Rosenstein.

*d) — Artuum:* Pedis l. Brachii, Rachialg. febric. S. sp. 2.

*Cura:* Intermittentium & Topicarum.

Sp. 5. TERT. COMPLICATA, aliisque morbis comitata.

*a) — Dolorum:* Tert. Pleurit. S. sp. 4. Tert. Arthrit. S. sp. 5. Rheumat. febric. S. sp. 9. &c. cfr. Cl. II.

*b) — Exanthematicor.* Tert. urticata, S. sp. 22. — miliaris, S. sp. 21. — Syphil. S. sp. 17. — Metastatica, a Scabie retropulsa; S. sp. 11. cfr. Cl. III.

*c) — Profluviorum:* a) Catarrhalium cum Epistaxi &c. Hæpatirrh. interm. S. sp. 7. Melaina hepat. S. sp. 7. — Febr. S. sp. 6. b) Emeticæ; c) Diarrhoica Sagar.

*d) — Nervosorum:* Tert. Hyster. S. sp. 8. Hyster. febric. S. sp. 8. Tert. Hypochondr. Sagar. — Epilept. S. sp. 16. Epilept. febric. S. sp. 9. Ecclamps. febric. S. sp. 17. Tetan. febric. S. sp. 10. Tert. tussiculos. v. Rosenstein de morbis infantum. cfr. Cl. V.

*e) — Debilitatum:* Tert. Asthm. S. sp. 6. Ephialtes Tertianaria S. sp. 5. cfr. Cl. VI. nec non Remittentium Complicatas.

*f) — Scorbut.?* S. sp. 9. cfr. Cl. VIII.

*g) — Infantum:* Rachitica cum placenta febrili. cfr. Hemitr. Lent. Inf. Altan.

*Cura:* primitivor. c. Intermittentium mixta. d) Ol. Anim. Dipp. ad gr. xv. & Metastatica Exanthematicor. Flores Sulphuris in atque Epispastica Externe requirunt.

Gen. 5. QUARTANA Auctorum. Quartan, Tredjedags Fråffa.

Paroxysmi similes intervallo 72 horarum; de quarto in quartum paroxysmos differens, cum interveniente intermissione.

Sp. 1. QUART. LEGITIMA, Autumni soboles.

a) — *Legitima:* S. sp. 1.

b) — *sine sub sequente transpir.* Størckii Ann:s Med. II. p. 169.

c) — *Endemica:* post remittentium incompletam judicationem; Aboæ 1776.

d) — *Pituitosa Chronica:* a) Pancreatis. b) Mesenterii. c) Splenetica. S. sp. 2. d) — Hepatica c. levi aurigine.

e) — *Infantum:* S. sp. 13.

*Cura:* a) & b) c. Laxant. & Digestivis posteaque c. Chinatis ad modum Werlhoffii; e) c. Flor. sulphuris & Chinatis & c) c. frictionibus cfr. Stoerck. d) f. Pituitosa in primis Salia Amara c. Aperientibus requirit; ut & Regulum Antim. Medic., casibus protractis c. Mercur. dulci l. Pulv. Alterante administratum. Nonnulli Tinct. Arsenic. Jacobi l. Slevogtii commendant.

Sp. 2. QUART. DUPLICATA.

a) — du-

a) — *duplicatis paroxysmis* uno die: S. sp. 4.  
 b) — *triplicatis paroxysmis* 1. 4. 7. die:  
 S. sp. 16.

c) — *cum accessionibus* 1 & 2. 4 & 5. die:  
 S. sp. 3.

d) — *Paroxysmis quotidianiis* quarto quo-  
 vis die conspirantibus: S. sp. 5. Amph. semi-  
 quartana S. sp. 23. cfr. Hemitr. Lent.

*Cura* præcedentis.

Sp. 3. QUART. PARTIALIS.

a) — *Oculi* S. sp. 17.

Sp. 4. QUARTANA COMPLICATA cum aliis mor-  
 bis comitata.

a) — *Affectibus rheumat.* a) Quart. Arthr.  
 S. sp. 11. Arthr. febric. S. sp. 11. b) Qv. Ne-  
 phralg. S. sp. 9. c) Metastatica a retropulsâ  
 Ophtalm. S. sp. 17.

b) — *Affect. Nervosis:* Qu. Hyster. S. sp.  
 10. — Epilept. S. sp. 8. — Catalept. S. sp. 7.

c) — *Debilitatum:* Qu. Amens S. sp. 12.  
 — Comatosa S. sp. 15. — Asthmatica; — I-  
 cterica; — Scorbust. S. sp. 14. — Hydropica.

d) — *Morborum Marasmorum:* Qu. Phthisica s. Pneu-  
 mon. Stoeckii A:s Med. p. 173. — Siphil.  
 S. sp. 6.

*Cura:* morborum primitivor., cum Anti-  
 monialibus, l. Pulv. Alterante interdum acua-  
 ta; b) & d) vero c. Paregoricis & Cortice  
 Peruiano condita.

22 ORDO II. INTERMITTENTES.

Gen. 6. ERRATICA Sauv., accessibus l. intermissionibus prolongatis.

- Sp. 1. QUINTANA S. sp. 1. Amph. semiqvint.  
S. sp. 24.
- 2. SEXTANA Eph. N. C. D. 1. A. IV. & V.  
obs. 70. &c.
- 3. SEPTANA S. sp. 2.
- 4. OCTANA S. sp. 3. Hemitr. Lunat. S. sp. 10.
- 5. NOVANA S. sp. 4.
- 6. DECIMANA S. sp. 5.
- 7. ANNIVERSARIA vernalium. Eph. Anniv.  
S. sp. 9.?
- 8. VAGA S. sp. 6.

*Cura:* D. D. Sagar, Physicus Iglaviensis  
in Moravia, sequenti pulvere Intermittentes  
“Febres curat: R. Pulveris Bryoniæ, faliis Ta-  
“marisci, florum Salis Ammon. Martialium  
“aa grana xx. Sulphuris Antim. Aurati, gra-  
“na III l. IV. misce f. Pulvis Dentur doses  
“XIV. Sumat omni mane unum ex aqua; pro  
“potu ordinario bibat infusum Flor. Chamo-  
“milla, l. Decoctum R. Cariophyllatæ, l. De-  
“coctum Chamædryos; Diætam strictiss. fer-  
“vet, aut plane famem patiatur. Pulveri an-  
“tifebrili descripto addit subin gr. x. Aga-  
“rici trochiscati, l. Aluminis rupei aut Florum  
“sulphuris. confer Auctoris Systema Morbor.  
“pag. 704.

ORDO III.

## ORDO III.

REMITTENTES Sauv. Huxh. *Exacerbantes*  
 Linn. *Synoches Græcor.*; *Febr. Mesenterica*  
*& Lympbatica* Baglivii L. I. p. 51. *Inter-*  
*mittentes subintrantes, proportionatæ Sub-*  
*continuæ & Solitariæ Torti; Intermit.* no-  
*tha Cleg. Intermitt. Continuæ Nicolai,*  
*Continuæ Periodicæ Senn. Junck. Conti-*  
*nua Remittentes Boerh. Lommii obf. p. 5.*  
*Mag. Febrar.*

Pyrexiaæ gastricæ, sine plenaria integrata-  
 te, ex colluvie biliosa & Saburrali atque pi-  
 tuita primarum viarum per plures repetitas  
 exacerbationes algidas & phlogisticas redeun-  
 tes, atque cum calore in dies ingravescentes.  
 Acutiores quoque per dejectiones alvinas,  
 demumque per urinam sedimentosam atque  
 sudorem judicantur. (b)

B 4

Gen. 7.

(b) Colluviei biliosa suspicio adest, ubi febris pe-  
 riodice, manifestis remissionibus stipata & sporadicæ vel  
 Endemice tantum afficit; quando autumnum nimis cali-  
 da æstas prægressa est; vel solum humidum s. lacustre,  
 inundationibus sèpius expositum, l. aér effluviis puteo-  
 rum repletus, & corpora consequenter a bile sale & o-  
 leo immodice exacuta; unde constitutio corporis bilio-  
 sa, cholericæ-melancholica & per imbecillitatem ven-  
 triculi, vitam sedentariam & diætam lautam, saburralis  
 l. pituitosa, quæ nullo modo correcta, neque per alvi-  
 ductionem ad exitum parata; lingua squalida plus mi-  
 nusve muco tenaci flavescenti obtecta, sapor amaricans;  
 "sitis; tremor labiorum & maxillæ; pervigilia; stupor"  
 & sopor; convulsiones; prostratio virium; Deliria; co-  
 lor cutis ictericus; Hæmorrhagia; sanguinis serum ex"

Gen. 7. TETARTOPHIA Sauv. Linn., *Quartana Continua Nicolai*, *Quartana remittens Auctorum*. Hetsig Quartan.

*Febris typica cuius paroxysmi quartanæ typum imitantur.*

Spec. 1. TETARTOPHIA a Pituitosa colluvie.

a) — *simplex*: S. sp. 1.

b) — *splenalgica*: S. sp. 2.

c) — *Hepatalgica*: S. sp. 3.

Sp. 2. TETART. COMITATA.

a) — *Carotica Tetart.* S. sp. 4. a. — *Maligna* S. sp. 6. *Quart. Comat.* S. sp. 15.

b) — *Cataleptica Tetart.* S. sp. 4. b.

*Cura*: Laxans Antiphlogisticum & China Tart. Tartarisato modificata.

Gen. 8.

---

flavo virescens; pulsus intermittens; urina Jumentorum.

"Mobili hac colluvie reddita l. ex massa sanguinis  
 "ad intestina delata Hippocratis loquendi more tunc  
 "turgida est. Turget autem vel supra l. infra. Mate-  
 "ries circa ventriculum l. supra turgescens, sequentibus  
 "sgnis sese manifestat: Lingua squalida, ita ut illa  
 "fordities digito desumi posuit; anima fœtida; Nausea;  
 "Conatus vomendi; Vomitus biliosus l. pituitosus; sen-  
 "sus molestiæ circa præcordia, Extremitatum frigus; In-  
 "quietudo & anxietas; Dolores Artuum. Cephalalgia;  
 "Susurrus Aurium; Oculorum caligo; Vertigo. Mate-  
 "riem autem infra turgere, l. intestinis insidere signifi-  
 "cant: Genuum gravitas; Lumborum dolor; Ventris di-  
 "stensio; Murmura & tormina. Alvi egestiones liqui-  
 "dx, corruptæ acres. efr. Cl. Selle L. c. pag. 199.

Gen. 8. TRITÆOPHIA Sauv. *Tritæus* Linn.  
*Tertiana Continua plurimorum.*

Hetsig Tertian Feber.

Febris typica, cuius periodi similes inter-  
 vallo 48 horarum saepius sine horrore  
 exacerbantur.

Spec. 1. TRIT. BILIOSA *Pseudoinflammatoria* f.  
*Phlogistica ardens*, a Synocho simplici  
 & colluvie biliosa vernalium composita.

*F. ardens biliosa* Auctorum. *F. biliosa*  
*inflamm.* Selle; Brånnande Tertian.

a) — *Exquisita*: alvo diffusa, Vog. inst. Gal.

§. 79. &c. Gall Tertian.

b) — *Ardentissima*: alvo adstrictiori, *Cau-*  
*sos* Vog. Gen. 20. *Tritæus Causus* S. sp. 2.  
*Trit.* Amer. S. sp. 12. a. Brånnsjukan.

*Cura*: Amphimerinæ Biliosæ.

Sp. 2. TRIT. BILIOSO-RHEUMATICA, a tempe-  
 state & effluviis soli, Endemica, beni-  
 gnior.

a) — *imputris Castrinium*, plethoricis  
 familiaris.

b) — *legitima lacustrium tempore autu-*  
*minali in Tertianas & Quartanas mutabilis.*  
*Tert. subintrans Torti.* *Tert. spuria* S. sp. 2.  
*Tritæoph. decept.* S. sp. 10. b.

Skärgårds Tertian.

*Cura*: confer Amphim. Rheumaticam.

Sp. 3. TRIT. COMPLICATA.

B 5

a) — *Pseu-*

a) — *Pseudophlogistica*: comitata sudoribus & delirio Phren.

b) — *Rheumatisans*: a) Soporosa, Tert. Carotica S. sp. 10. — Hemipl. S. sp. 20. Trit. Carotica S. sp. 7.

c) — *Lactea*: Trit. Lact. S. sp. 8.

*Cura*: Hemitritæ acuti, prægressa phlebotomia: in 2:0 & 3:0 stadio morbi, Cucurbitæ pone aures applicari etiam possunt, posteaque vesicatorium ad nucham Cervicis.

*Obs.* Trit. *Anomala* s. maligna cfr. Hemitrit.

Gen 9. AMPHIMERINA Græcis; *Quot. Continua*, Vog. G. 15. Hetsig Quotidian.

Pyrexiaæ intervallo horarum 24 plerumque cum algore exasperantes.

Spec. 1. AMPH. BILIOSA PSEUDOINFLAMMATORIA vernalis, cum signis diatheoseos, Synochi simplicis & colluviei biliosa. Febr. Ardens biliosa Auctorum.

a) — *Ardentissima* cum alvo adstricta: *Causos*, accessi. quotid. Lieut. Synops. m.

b) — *Exquisita*, cum vomitu & alvo soluta: *F. biliosa* Vog. §. 79. *Cholerica* Hoffm. Vog. gen. 28. Hvardags Gull-Feber.

c) — *pituitosa*: a) — latica S. sp. 1. b) *Hæmorrhoidarior*. *Hæmorrhoidal* Feber.

d) — *comitata cum delirio* : - Phren. S. sp. 18.

*Cura*: Laxantia Antiphlogistica, saepiusque Emetico laxantia prægressa Venæ Sectione; Salia media; Haustus Salinus Riv. & Cremor Tartari.

Spec. 2.

Sp. 2. AMPH. RHEUMATICA, Endemica Æstival.  
benigna, a solo & tempestate: *F. Putrida cum diathesi phlogistica* Tissoti;

Rymaktig Quotidian.

a) — *Hiemalis*: Febr. Hiem. Syd. T. I.  
pag. 348.

b) — *Imputris in Castris*, Plethoricorum  
cum tumore Parotidum. — Hung. S. sp. 10.  
Fäst Quotidian.

c) — *legitima lacustrium*, cùm soli efflu-  
viis associata & tempore autumnali in Inter-  
mitt. transiens: *Subcontinua Torti*; *Skärs-*  
*gårds* Quotidian. a) a calore: Quot. decept.  
S. sp. 2. b) a solo humido putrescente: Amph.  
Palud S. sp. 19. Trit. Decept. S. sp. 10. a.

*Cura*: Pulv. Jalapp. Scr. ij c. scr. i Cryst.  
Tartari 1:0 Stadio propinatus, Amph. bilio-  
fas & Rheumat. saepius jugulavit; sin minus V.  
Sect. pro indicatione, ut etiam Salia media  
cum Antim. Diaph. & Chinata, vel Cremo-  
res Hordei c. aceto curam absolvunt.

Sp. 3. AMPH. COMPLICATA, s. sympt.

a) — *Rheumatisans*, c. dolore locali; Amph.  
Angin. S. sp. 12. — Arthrit. S. sp. 21. conf.  
Inflammator. Cl. II.

b) — *Catarrhalis* S. sp. 2. — *Lochialis*  
&c. conf. Cl. IV.

c) — *Exanthem.* conf. Hemitr. acut. &  
Cl. III.

*Cura*: Antiphlogistica & morbi primarii  
1. secund.

Obs. Am.

Obs. *Amphim. Anomala* s. maligna, cfr. genus sequens.

Gen. 10. HEMITRITÆUS Græcis, Semiter-tiana Latinor.; (i) *Febris Lymphat.* Bagl. *Tritoph. erraticæ.* Half Tertian; Mag. och Nerve Feber.

*Febris Nervosa Remittens* saepiusque er-ratica, a colluvie pituitoso putrida acri *Chylopojeticorum & Lymphaticorum*, vi-res valde degravans, c. horrore, (l. al-goribus fugitivis pedis &c.) interdiu, & pyrexiiis gravioribus vespere.

A) Exacerbationibus singulis diebus du-plicatis: *Quotidiana* & *Amphim. duplicata* Au-ctorum. B) Exac. singulis diebus revertenti-bus, alterno die gravioribus: a) singulis die-bus uno paroxys. imparibus diebus gravio-re; *Hemitr. Hipp. & Celsi*: b) alternis die-bus paroxysmis duplicatis, perinde ac si Tert. c. Amph. associata esset; *Hemitr. Legit* Au-ctor. *Tert. cont. duplicata* Werlh: C) Hemite-tarteos &c. a) Amph. c. Quart. b) Amph. c. Quint. c) Tert. c. Quart. D) Vagus, ubi Paroxysmi inordinate revertunt.

Spec. 1. HEMITR. ACUTUS; *Intermittens bilioso*  
*putri-*

(i) At in semitertiana appellata contingit quidem & acutos morbos fieri, & est haec præ ceteris maxime le-thalis; sed & Tabidi, & quicunque ex aliis longis mor-bis ægrotant, ex hac maxime ægrotant, Hippocr. po-pular, Libr. I, Seçt. III,

*putrida*, Selle; *Quot.* & *Tert.* *Anomala*,  
Vog. inst. §. 83. (k) Præl.

Hetsig Mag- och Nerve-Feber.

Bilioſa & Gangrænosa deceptiva *Febr.*  
*Nervosa*, cum magna atque algida anxi-  
etate & virium prostratione, sæpiusque  
pluribus symptomatibus perniciōsis com-  
plicata, intra unam alteramve hebdoma-  
dem inflammatione putrida Chylopojeti-  
cor. funesta.

a) *Hemitr. deceptivus paludum* & *lacu-*  
*strium* &c., sæpius Endemicus, a stagnantium  
putredine &c. a) *Algidas*, *Epiala* Gal. Vog.  
gen. 19. Amph. Ep. Sauv. sp. 3. — *Hemitr.*  
Sauv. sp. 8. *Leipyria* Gal. Vog. Gen. 24.  
*Triteoph.* Leipyr. Sauv. sp. 9. *Phricodes* Gal. ~~et~~  
Vog. Gen. 25. Amph. Phric. S. sp. 7. *Tert.*  
*Tripl.* S. sp. 15. — *Lipyr.* S. sp. 23. b)  
*Cardiacus* Torti; Amph. Card. S. sp. 5. Car-  
dialg. febric. S. sp. 4. Rachialg. febric. S. sp.  
2. *Affodes*, Vog. Gen. 27. *Triteoph.* Affod.  
S. sp. 6. c) *Syncopalis* Torti, Vog. Gen. 22.  
Amph. Sync. S. sp. 4. *Triteoph.* Sync. Sauv.  
sp. 1. d) *Cholerica f.* Torti, & Atrabil. In-  
diæ Occid. Lind. — Orient. Clerck, Hungar.  
Ægypt. &c. *Triteoph.* Amer. S. sp. 12. *Typh.* ~~et~~  
Ægypt. S. sp. 6. *Cholera interm.* S. sp. 6.  
*Tert.* Subcont. S. sp. 19. *Diarrh.* febric. S.  
sp. 20.

(k) Cum in Autumno Aër humidus & calidus, pu-  
tridis effluviis inquinatus est, hæ febres in primis gras-  
fantur; signa colluviei biliosæ; sanguinis putredo; va-  
ria symptomata nervosa periculosisima; spyrexia brevis.  
Selle l. cit. p. 311.

Sp. 20. Dysenter. interm. S. sp. 17. *Isteriodes*, Vog. Gen. 32. *Febr. flava* Indiar. Hilary, Lining &c. Typh. Icter. S. sp. 7. Febris Lenta putr. Huxh. T. II. p. 352. e) *Diphoretica* F. Torti; *Elodes*, Vog. Gen. 21. Trit. Elod. S. sp. 5. *Typhodes*, Triteoph. Typh. S. sp. 4.

b) — *Castrensis*, a bile & pituita prim. viarum, nec non a tempestate calida & humida, atque putredine Castror. *F. Hungar.* f. *Castr.* Junck. Tab. 74. Desc. des Maladies des Armées, v. Sw. p. 134. Pringle &c. a) biliosa Amph. Sauv. sp. 22. Bilioso-Rheumatifans S. sp. 22. b) Putridus.

c) — *Carcerum* & *Nosocomiorum* ab aëre putrido &c. Typh. Carcer. Sauv. sp. 1, b) Petechialis. conf. Cl. III.

d) — *Famelicus*, a fame &c. b) c. Pe- tech. cfr. Cl. III.

e) — *Verminosus*: Interm. Verm. v. d. Bosch., Selle; Tert. Vermin. S. sp. 18. Typh. Hyst. Verm. S. sp. 4. Phrenit. Verm. S. sp. 7. Cephalit. Verm. S. sp. 7. Purp. Verm. S. sp. 4.

f) — *Complicatus*: a) a. dolore locali Inflammatorior. *Cynanches Pædancone* Sever.; *Pleuritidis* & *Peripn.* Amph. Peripn. S. sp. 15. Peripn. Typhod. S. sp. 5. &c. cfr. Cl. II. b) Exanthematicor. *Erysipelatosus*, Variol. Miliaris Syn:s Variol. S. sp. 3. — Miliar. S. sp. 14. Miliar. puerp. S. sp. 3. k. Amph. Mi- liar. S. sp. 11. — Variol. S. sp. 20. c) Hæ- morrhæ-

morrhagiar. Uteri &c. & Catarrhalium: Amph. Catarrh. Petech. S. sp. 2. b. cfr. Cl. IV. d) Nervosorum: *Zyngodes*, Vog. Gen. 26. Amph. Sing. S. sp. 14. — *Tussiculosa* S. sp. 13. — Spasm. S. sp. 16. *Oscitans*, Vog. G. 31. cfr. Cl. V. e) Debilitatum: *Lethargus* Vog. Gen. 22. cfr. Cl. VI.

*Cura:* V. Sectio si plethora; Emetica Antimonialia; Pulv. Sudorif. Doveri, & Jullap. Refocillans Vin. v. Rosenst. aliaque Nervina Diaphoretica; si urina c. sedimento, Chinata plurimum conducunt, quod de omnibus Remittentibus dictum habere volumus; Vesicantia sudores colliquativos demovent. e) post vomitorium, Anthelminticis: Spigelia, Tanac. Ruta, Extract. Nicot. &c. cum Vitriolo Martis acutis, tollitur.

Sp. 2. HEMITR. LENTUS; Febr. *Lenta Nervosa*  
Auctor. *F. Maligna Lenta* Vog. inst. §. 56. *Gat.*

*Term. Feber.*

*F. Lentior Nervosa*, ex inertia fibrarum, & hinc genita congestione pituitosa Chylopojeticor.; Facies his pallida & tristis, haud raro c. abdominis dolore atque intumescientia, & vomendi conatibus laborant, licet præter phlegma insipidum parum ejiciatur; sudoribus fugitivis colliquantibus & Lipothymiis sub erectione nec non somno Comatoso gravantur (Aliis sola c. abdominis distentione, Dyspnoea aliqua & insomniis); Plerumque ad mensem & ultra sine tabescientia

scentia porrigitur, c. resolutione per alvum; lingua arida est, sitis tamen vix ulla; calor mediocris c. pulsu debili, maximaque virium prostratione (*l*); urina pallida atque limpida.

a) — *Pseudophlogisticus siccus*, c. Cephalalgia gravedinosa, lassitudine immensa, inquietudine & Dyspnœa a distentione ventris, foecibus teterrimis: a) Sedentarius, b) ex obstructione Hæmorrhoidum, c) a suppressa transpiratione.

b) — *Gastricus*, c. cacochylia copiosa crassa: a) ex abusu acidorum; b) a diæta lauta frigido glutinosa & vita sedentaria. Amph. humor. Sauv. sp. 6.

c) — *Endemicus*, a constitutione aëris nebulosa & soli frigida & humida: a) Autumnalis Anglor. Huxh. T. I. p. 163. b) Hungarica, Moraviæ &c. Typh. Castr. S. sp. 5. c) Italiæ, Sarcone. d) F. Upsaliensis, contr. Dis. D. D. Boström. Tritoph. Mang. Sauv. sp. 11.

d) — *Nervosus*, ex inanitione & evacuationibus immodicis: a) curis, meditationibus & vigiliis; b) ab evacuationibus nimiis, Cathartico-

(*l*) Prostratio virium nota quidem generalis est malignar., atque hinc ejusmodi Febres nomen putridar. merentur. Illa tamen prostratio non semper æquie manifesta est, in primis in illis putridis ubi sanguis simul phlogisticus, quem admodum Febres Exanthematicar. id luculentissime illustrant. In illis vero putridis ubi Nervi gastrici & vasa Chylopojetica simul, etiam si minus acute afficiuntur, ibi maxima prostratio obvenit, & hinc forsitan illæ lacrymæ Mesentericarum,

ticorum vel Ptyalismi; Typh. Nerv. S. sp. 2.  
c) abusu veneris; Typh. exhaust. S. sp. 8.

e) — *Complicatus*: a) ab intermitt. protractis l. male curatis. Hect. infant. Sauv. sp. 1. b) Remittentium; Tetart. Semitert. Sauv. sp. 5. Amph. c. Quart. S. sp. 23. — c. Quint. S. sp. 24. — Pseudohemit. S. sp. 9. c) Colicæ Mesentericæ cfr. Cl. II. d) a Miasmate Canis Rab.? e) Criticus, Pleuritico-  
rum, Hæmorrhoid. &c. f) a suppressione fluxuum &c. Tetart. Splen. & — Hepat. S. sp. 2. 3. cfr. Tetart.

*Cura*: Laxantia Antiphlog. mitiora, l. se-  
quens saepius repetitum: Rec. Antim. Diaph. non abl. Scr. β. Tartari Tartarisati gr. xv. Pulv. R. Rhei gr. v. M. dispens. in IV:plo. Liquor Terræ fol. Tart. c. Extr. Aqv. Myrræ; Acetum cum Sale Corn. Cervi saturatum & Syr. de Hyssopo comp. edulcoratum; & aquæ Selter. cum Chinatis suffultæ, aperiunt & tonum simul restituunt; Vesicatoria pone Aures & ad Tibias sopores demovent. d) Lacticinia, & Vitellos ovor. rec. c. Inf. Chinch. requirit. Hemitr. Infantum, sive Hectic. Infant. Sauv. D. D. Sagar cito sanavit Pulvere ex Sale Ammon. Vitriolo Mart. & Sale Amaro. cfr. Quotid. simpl. ipsius p. 701.

Spec. 3. HEMITR. HECTICUS, chronicus atque Tabidus: *Febris secundaria s. symptom.* Junckeri. *Hectica* Sauv. *Slekt-Feber.* Protracta Nervosa, sine periodis deter-  
minatis & sine determinatione critica,

ad annum l. ultra affligens. Fibræ nimis irritabiles, tabescentes; lingua arida; pulsus frequentior (interdum dicrotus) in primis post pastum & tempore vesperino, calorque c. fervore & ardore cutis, maxime in volis manuum & plantis pedum, & sudores colliquativi c. anxietate præcordiali associati; urina sine critica determinatione, acris olida & spumescens.

a) — *Passivus*: a) vespertinus, Hect. Vesp. Sauv. sp. 2. Quotid. Vesp. Sagar; b) Senum; c) ex aëre & Climate, Helveticor. &c. Hect. Nostalg. S. sp. 8. d) abuso Spirituosor.; e) Uxorator., Tabes dorsal. S. sp. 1. f) Nutricum Tabes, S. sp. 4. g) Salivantium, S. sp. 6. h) a Veneno S. sp. 17. i) Amatoria Hect.; k) a curis & vigiliis; l) a fame; m) a Vermibus & Infectis. *Helminthiasis* Plenck. Phthir. int. Sauv. sp. 2. Malis acridoph. Sauv. sp. 4. — Vermin. S. sp. 2. — Dracunc. S. sp. 6. — Transylvan. S. sp. 9. — a pulice Amer. S. sp. 3. Hect. Vermin. Sauv. sp. 9. n) Calculosa Hectica, S. sp. 6.

b) — *Complic. & symptom. Exanthemator.* Pemphig. Variolar. Erysipel. &c. confer Clasf. III.

c) — *Complic. & symptom. Profluviorum*: a) Catarhalis Tabes S. sp. 13. b) a Diarrhoea protracta &c. cfr. Cl. IV. c) a fluxu mensium perennante Junck. Hectica fluxuum, S. sp. 11. d) Ephidrosis, Tabes sudat. Sauv. sp. 6. cfr. Cl. IV.

d) — *Com-*

*d) — Complic. & symptom. Nervosorum:*

- a) Hystericar. & Hypoch., Hect. Nerv. S. sp.  
13. b) Maniacor. &c.

*e) — Complic. & symptom. Debilitatum:*

- a) Paralyseos; b) Anorexiæ, c) Ephialtis &c.  
confr. Cl. VI.

*f) — Complic. & symptom. obstrutorum: ex  
obstructione viscerum &c., Febris Lenta Jun-  
keri. a) Dolorum Rheumaticorum, Gastrody-  
niæ, Cardialgiæ, Colicæ, Arthriticorum, Rheu-  
matismorum, Osteocopi, Splanchnodynisi &c.  
Tab. Rachialg. S. sp. 16. — Hepat. S. sp. 8.  
— Mesent. S. sp. 9. — Glandul. S. sp. 10. cfr.  
Cl. II. & Ord. III. b) Intumescentiar. Hect.  
Cachecticor. S. sp. 10. — Hydrop. S. sp. 7.  
— Lymphat. S. sp. 12. — Scrophul. S. sp.  
5. Tabes ab Hydrope Sauv. sp. 5. — a Pe-  
ricard. S. sp. 7. cfr. Cl. VII.*

*g) — Complic. & symptom. Exulcerator.  
Febris Hectica Junckeri. a) Apostematoso, Tab.  
Apost. S. sp. 3. — Ulceros. S. sp. 12. — a  
Vomica S. sp. 15. b) Renalis Tabes, S. sp.  
2. c) a Stomacho, S. sp. 14. d) Hectica Scroph.  
S. sp. 5. a. e) Phtisicor. &c. cfr. Cl. VIII.*

*Cura:* Lac recens, aliaque Eupepta aci-  
dulata; Aqua Selterana c. lacte I. Lohoch de  
Maltho, uti etiam Pilulae Rhabarbarinæ c. Gum-  
mi Ammon. Extract. aquoso Myrrhæ, Tereb.  
Ven. & Syr. Croci præparatæ; nec non cer-  
tis temporibus Chinata & Paregorica, c. Es-  
sent. Antiscorbutica Drav. atque Effent. Ca-  
scarill. saturata, palmam ceteris præripiunt,  
in primis in Complicatis.

## CLASSIS II.

**DOLORES** s. *Morbi Rheumatismodei. Phlogistici & Dolorifici Linn.; Phlegmasiae Culennii; Phlegmasiae, Dolores & Phymata, Sauv. Febres Inflammatis. Dolores & vitiorum inflammations*, Vogel. Wärck-Passioner.

Dolores locales cum graviori vel leviori phlegmasia, sive sanguinea sive ferosa, sine Exanthematibus, nisi symptomatis, a peculiari sanguinis inflammatione cum stimulo orti.

## ORDO I.

**INFLAMMATORII:** *Phlegmasiae Sauv.; Phlogistici Linn. Febres Inflammatoriae Hoffmann, Vog. v. Sv.* Brandsjukor.

Pyrexiae phlogisticæ universales, acutissimæ l. peracutæ, cum phlegmasia topica, h. e. cum locali partis cuiusdam dolore, ardore, calore & tensione, ad suppurationem l. Gangrænam usque continuante, saepius cum pulsu duro &c. cfr. signa Diatheseos sanguinis phlogisticæ I:ma Cl. & I:mi Ord.

Gen. 10. **CEPHALITIS**, Selle; *Phrenismus*, Vog. Gen. 45. Hjärne-Brand.

Phlegmasia acutissima Cerebri & Meninx, cum Cephalalgia pulsatili, rubore faciei & oculorum, facie vultuosa, turgida, atque trucibus l. fulgentibus oculis incipi-

cipiens, & postmodum cum delirio constanti gravans.

Spec. 1. CEPHAL. VERA, inflammatoria s. primaria Synochalis, cum pulsu duriusculo, saepiusque cum delirio feroci Paraphrofynico. *Phrenitis* Sauv. Linnae & Sagaris. — A) Meningum; B) Cerebri. C) Cerebelli. D) Gland. pinealis? Phren. Littriana S. sp. 5.

a) — *passiva adolescentium & Calidorum*, a) itinerariorum in regionibus calidis; b) ab insolatione & c) liquorum spirituosorum abuso &c. Phren. vera Sauv. sp. 1. — a Calent. Sauv. sp. 11. Cephalitis Ægypt. Sauv. sp. 1. — Cerebelli, S. sp. 8.

b) — *Spontanea*: a temperamento &c.

c) — *Symptomatica*: a) Phrenitidis Hippocrat. Sauv. sp. 2. & 4. b) Inflammatoriorum: Otitidis, Diaphragmatis. &c. c) Exanthematicorum, variolosa &c. cfr. Syn. compl.

*Cura Antiphlogistica*: V. Sect. repetitis, Cucurbitisque, Clysimatibus atque Eccoproticis, fomentis pedum & potiunculis acidulatis: Nec non in stadio II. & III. Essent. Febrili nostra. Forte varietas c) c. Sulph. aurato Antim. & ex his Exanth. c. Pulv. alterante Plummeri in principio corrigi potest, uti etiam Erysipelatosa c. Roob Sambuci.

Sp. 2. CEPHAL. NOTHA SOPOROSA; a colluvie pituitosa turgescente.

- a) — *Passiva Serum*: a) ab intenso formacum calore. Cephal. focaria, Sagar.  
 b) — *Spontanea* Cephal. Sauv. sp. 3.  
 c) — *Symptomatica*: a) Soporosa 1:0) *A-grypnocomatis* cum sopore vigili; 2:0) *Typhomaniae* cum somniculoso Comate; 3:0) *Le-thargica* cum oblivione; 4:0) *apoplectica* c. sterrorofo somno-intermixta. Typh. Com. S. 3. cfr. Cl. VI. b) *Remittentium*: Phren. Apyr. S. sp. 10. Cephalit. Ægypt. — Epid. & — Verminosa. S. sp. 1. 6. & 7. cfr. Hemitr. acut.  
 c) *Exanthematicor.* cfr. Hemitr. acut. compl.  
 d) *Traumat.* Sauv. sp. 2. e) *Siriasis infantum* Vog. Gen. 34. Ceph. Siriasis Sauv. sp. 4. cfr. Coma Febr. Cl. VI.

*Cura*: pro plethora funde sanguinem, & deinde applicari poslunt Cucurbitæ cum cœcæ tum scarificatæ, & in cæteris cura antecedentis cum Laxantibus & potiunculis anti-phlogisticis; an etiam cum potu Salino Riveri l. Mindereri? Vesicatoria ad furas & infra aures ad Parotides extrahendas. Sagar.

*Obs.* Cephal. *Spuria*; Phren. *Inanitor.* S. sp. 16. & — a *Plica*, Sauv. sp. 8 cfr. *Delir.* — *Aphrodis.* Sauv. sp. 9. & — *Hydrophobia*. S. sp. 15. cfr. *Maniacor.* Cl. V. — *Hippocr.* cfr. *Synoch.* compl.

*Gen. II. OTITES* Vog. Gen. 48. *Otalgia acuta* Auctor: Dr. Brand.

*Phlegmasia intolerabilis*, acutissima auris, cum dolore pulsatili, *Cephalalgia* & *A-grypnia*, nec non *Delirio*.

Spec. 1.

## Spec. I. OTIT. PASSIVA.

a) — *Traumat.* Otalg. inflamm. S. sp. I.

b) — *a Vermibus:* Otalg. Vermin. Sauv.

sp. 2.

c) — *Rheumatica:* a refrig. ad Gangrænam proclivis.

*Cura:* antiphlogistica in- & Cataplasma  
Emollientia, e. gr. ex mica panis & lacte c.  
Croco & Camphora &c. externe. Bals. Sulph. c.  
Camphora & tantillo spir. C. C. pro diver-  
sitate circumstantiarum post V. Sect. inter-  
dum conductit.

## Sp. 2. OTIT. COMPLICATA: s. Symptomat.

a) — *Remittentium metastatica:*

b) — *Pblegmonodea:*

c) — *Erysipelas:*

d) — *a retentis Evacuat.* e. gr. menstruant.  
Epistaxeos, &c.

*Cura:* a) Præter antiphlogistica & Cata-  
plasma nominatum b) vesicatorium infra au-  
res, c) Sambucina in- & externe, atque d)  
præter detergentia Epulotica in Aure, phlebo-  
tomiam pedis, & quæ evacuationes retentas re-  
stituunt, requirit. cfr. Dysmenorrh. Hyfetalgiae.

## Gen. 12. CHEMOSIS.

Ögon-Brand.

Phlegmasia vehementior tunicarum oculi,  
cum dolore pulsatili & pyrexia partiali,  
Cephalalgie & Agrypnia, atque interdum  
cum Delirio.

Spec. 1. CHEMOS. EXTERNA, adnatæ & albugineæ, cum rubore purpureo, & tumore interdum super corneam. *Chemosis* Ætii, Vog. Gen. 46.

a) — *Passiva*: a) a contusione, Ambustione l. ictu; Exopht. Traum. S. sp. 4. Opht. Chemos. S. sp. 12. b). a medicatione perversa.

b) — *Plethora Hæmorrhoidal*is: &c.

c) — *Metastatica*: a) post casum ab alto vel contusione Capitis; b) aliorum Morborum.

*Cura*: V. S. & Laxans antiphlogisticum; Cataplasma ex mica panis l. Pomis, c. lacte post applicationem Hirudinum; & post paucos dies aqua vitae Camphorata externe, cfr. Sauv. l. cit.

Sp. 2. CHEM. INTERNA: lucis maxime impatiens c. pupilla constricta. ~~H~~ Phlegmone oculi Platneri &c. *Ophtalmites*. Vog. Gen. 47.

a) — *Passiva*: ab ictu in operatione Cataractæ &c. Ophtal. Choroid. S. sp. 13.

b) — a *Pletora*:

c) — *Metastatica*:

d) — *Complicata in Hypopion transiens*.

*Cura* antecedentis, c. repetitis V. S. &c.

Gen. 13. ODONTITIS; Brånnande Tandvärk. Phlegmasia vehementior Gingivarum, Convulsio-

vulsiones periculosa*s*, atque dentium I.  
maxillæ cariem efficiens.

Spec. 1. ODONT. PASSIVA.

- a) — *a perversa medicatione*: Seminibus Coccognidi<sup>is</sup>; &c.
- b) — *Mechanica*: ab evulsione dentis: &c.

Sp. 2. ODONT. PLETHORICA.

- a) — *Infantum a dentitione*. confer Odont. III:tii Ord.
- b) — *a coibita evacuatione sangu.*

Sp. 3. ODONT. COMPLICATA.

- a) — *Metastatica*, Podagricor. &c. conf. Odontalgiam Ord. III:tii.
- b) — *Pblegmonodea*, in Parulidem abiens. conf. Phlegm. Ord. II.
- c) — *Fistulosa*:  
*Cura*: V. Sectio, & Laxans salinum &c.  
cfr. Odontalgiam III. Ord.  
Obs. *Glossitis* s. Inflammatio Linguæ. cfr. Cynanchen.

Gen. 14. CYNANCHE Sauv. Linn. *Angina inflamm.* Bœrh. Vog. Gen. 49.

Hals-Brand.  
Phlogistica faucium angustatio, cum loquelæ & deglutitionis difficultate, nec non suffocationis metu.

Spec. 1. CYN. UNIVERSALIS, omnes fere partes faucium inflammatorie simul affligens.

a) — *sanguineo-inflammatoria*: Angina exquisita, sive vera; Vog. Præl. §. 183. a) Rheumatica a tempestate; b) a retenta sanguinis evacuatione.

b) — *Bilioso-inflammatoria*: acuta, interdum Endemica, Ang. aquosa Wallensis Meadii; — Pituitosa; Vog. Præl. §. 186. a) faucium tonsillarum, b) Laryngis, c) Bronchiarum; cfr. Peripn. Bronchiarum.

c) — *Gangrenosa* s. maligna; Pædancone Severini; bilioso putrida Huxhamii, c. ulceribus aphtosis & saniosis; Vog. Præl. §. 184. Cyn. Epid. S. sp. 2. — Maligna S. sp. 3. 6.

d) — *Pituitoso-Catarrb.* s. ang. Bronchus cfr. Ang. Rheum.

e) — *Spasmodica*: cfr. spasnum nervosor. *Cura*: V. Sectio & Sal quoddam, scopo laxandi; & Linimentum volat. Lond. circa collum infra aures externe; ut etiam Gargasmata cum sale Ammoniaco. c) Hausto Vol. Huxham. &c. levatur. confr. Auct. T. III. pag. 112. &c.

### Sp. 2. CYN. PARTIALIS.

a) — *Lingualis* & *musculorum ossis hyoidis*. *Glossitis* Vog. Præl. §. 180. cum loquelæ & deglutitionis plenaria perditio[n]e.

b) — *Trachealis* nec non ad radicem Linguæ; a) Infantum; cum raucedine, *Tussi clangosa Gallinæ* & membranacea concretione. *Suffocatio stridula Homii*; *Ang. inflamm. inf. Russel*; Rosenstein om Barna Sjukdomar, p.

429. b) Laryngea sine tussi, nonnullorum *Laryngalgia*, c. dolore aucto inter loquendum; c) vera Græcorum; Cyn. trach. S. sp. 5.

c) — *Pharyngea*: Phlegmonodea, cum rubore in imis faucibus, deglutitione maxime difficiili & dolentissima. *Pharyngitis*; ang. *infl. Pharyng.* Bœrh. aphor. §. 804. Cyn. Phar. S. sp. 6.

d) — *Tonsillarum*: vulgarior, interdum cum infl. uvulæ & veli palatini. Cyn. Tons. S. sp. 1.

e) — *complicat. maxillarum & Parotidum*; Cyn. purpuro-Parot. S. sp. 15.

*Cura*: V. Sect. & Sulph. Aurat. ant. gr. unum, c. Sacch. Chocol. bis l. ter quotidie, usque quo supra l. infra operet; Linim. volat. ext. etiam conducit, l. Epispaſtica.

### Sp. 3. CYN. COMPLICATA & Symptomatica:

a) — *Remittentium & Continentium*: Cyn. prunella S. sp. 12.

b) — *ab Arthritide*: Vog. Præl. §. 187. S. sp. 10.

c) — *a putredine & infl. Pulmonum*; Lieut.

d) — *Exanthematicorum*: Pemphyg. Helv. S. sp. 3. Cyn. Variolos. aphtosa, Morbillosa & Scarlatinæ; a scab. & Herpete repulsis. Cyn. Exanthemat. S. sp. 4. & 10. b. confr. Clasf. III.

e) — *a Dysenteria*: Sauv. sp. 13.

f) — *Hydrophobica Nervosorum*:

*Cura*:

*Cura:* Epispaistica ad Cervicem & ad suras; l. Vesicatorium infra aures; & Liqu. C. C. succ. l. Tinct. Pectoral. Vol. Danorum; l. Vin. Rhen. c. Sale C. Cervi satur. ad noctem; c) d) & e) cum Elixirio Paregorico levantur.

Gen. 16. PERIPNEUMONIA Auctorum. *Pulmonia* & *Peripneumonia* Castelli.

Lung-Brand.

Phlegmasia Pulmonum, cum pyrexia saepius acutissima, anxia, dolore obtuso, spiritu calido, pulsu reduplicato molli, genis roseis, Dypnœa, Tussi sputis in principio colore rubicundo sanguineo, deinde 6:0 l. 7:0 die flavescente. In affecto latere ægri etiam commodius quiescunt.

Spec. I. PERIP. RHEUMATICA Bronchiarum, cum dolorifica & inflammatoria oppilatione tunicarum asperæ & Bronchialium, Raucedine, Tussi Rheumat. & subcruenta expectoratione.

a) — *Rheumalis secca*: cum Tussi aspera, dolorifica a) a frigore & asperitate aëris vernalis. Catarrh. ferin. S. sp. 2. b) ex abusu spirituorum, c) ab inspir. acidi Vitr.

b) — *Rheumalis humida* s. Catarrhalis verna; cum Tussi leviori humida &c. Peripn. Catarrhal. S. sp. 6. a. cfr. Catarrh. Cl. IV.

c) — *Polyposa Infantum*, cum Tussi Galinacea &c. cfr. Cynanch. part.

*Cura:* V. Sect. & Pil. ex Rheo c. G. ammonia-

moniaci, Thereb. Veneta & Syrup. Croci; ut etiam Pulv. pectoralis, a Pulv. Nitri Unc. β. G. Tragac. Dr. iij Rad. Liquir. & Irid. flor. ana Dr. j & Pasta alth. Dr. vj. Rheumalis siccæ Expectorationem juvant Ol. Amygd. c. Syr. Balsam. & tantillo Extr. Myrh.

Sp. 2. PERIPNEUMONIA SANGUINEA Cellularum Pulmonalium, a plethora & infarctu subitaneo Pulmonum cum Synocho simplici, Tussi violenta, spiritu, ex ore minime fœtente, interrupto, difficillimo, pulsu pleno atque veloci, nec non cum rubicunda ac turgida facie. *Peripn. vera* auctorum.

a) — ab aëris frigidioris inspiratione sub motu æstuante. *Pneumonites Bourgardi* S. sp. 2.

b) — a Tussi:

*Cura* præcedentis speciei, c. V. Sect. repetitis. Vapor Aceti inspiratus, & Potiones, ex Aqua fl. Samb. & Hyssopi c. Nitro, Elix. Pareg. & Syr. Hyssopi comp. horis Vespertinis resolutionem promovent.

Sp. 3. PERIPN. GANGRÆNOSA putrida, & gastrica, cum permagna pectoris oppressione, fœtore oris & debilitate corporis, nec non cum gravi præcordiorum pondere & Febre Remittente, pulsu inæquali & urina cruda, nec non vomendi conatibus comitata.

a) — a temperamento bilioso cum faburra ventrali. *Peripneumonitis Bourgardi* Peripn. ard. S. sp. 3.

b) — En-

b) — *Endemica*, bilioso-inflamm. Miltum: Peripn. Typhod. S. sp. 5.

c) — *bilioso-putrida remittentium*: Peripn. putrida S. sp. 2. a) carcerum, b) nautarum. c) nosocom.

*Cura* præcedentis, c. una solummodo V. S. & propinata manna c. Crem. Tart. & Sulph. aur. antimonii; posteaque Julapia c. sp. Nitri D. &c.

#### Sp. 4. PERIPN. COMPLICATA & Symptomatica.

a) — c. *Cordis inflammatione associata*; Carditis Epid. Sagar; — spont. S. sp. 1. a. conf. Cardiogmum III. Ord.

b) — *Exanthematicorum*: Variolosa, Morbill. Erysipelas, Petechialis; Peripn. exanthem. S. sp. 9. — Maligna pestilens A:o 1348  $\frac{9}{10}$  hominum devastans S. sp. 4.

c) — *Arthriticorum* S. sp. 7.

d) — a *Colica Pict.* Peripn. Rachialg. S. sp. 12.

e) — *Puerperarum a Lacte*: Deleurye.

f) — *Hydrocephobica* Peripn. S. sp. 10.

g) — *Phtisicorum*; S. sp. 8. & 11.

*Cura*: V. Sectio; Infus. Sambuci, c. Lacte Ammoniacali & Aceto Scillitico; Pulv. Peator. nuper descriptus.

Obs. Peripn. *Notha* Syd. & Huxh. Per. Catarrh. S. sp. 6. Senes obesos & crassos invadens; Huxh. T. II. p. 200. Cfr. Catarrh. Cl. IV.

#### Gen. 17. PLEURITIS Auctorum. Pleuresie.

Plegmasia peracuta Intercostalium & Pleu-

— (

— ræ,

ræ, nec non mediastini & Pericardii, cum Tussi acutissime pungente & augmento doloris sub inspiratione.

Spec. I. PLEUR. VERA, *sanguinea* Auctor. Febris Synochi simplicis, pulsus durus, tensus, cum dolore acute pungente ad costas veras; Tussis sicca, sub qua dolor ita exasperatur, ut ægroti illam suppressione omnimodo conentur; crux corio albo crasso obiectus est.

a) — *Intercostalium & Pleuræ*: raro cum sputis sanguineis vel expectoratione, nisi sub statu criseos; a) a tempestate frigidiori & sicciori, b) ex intermissa sanguinis evacuatione, c) ex abuso spirituorum, d) a viœtu duro, excretionem alvinam impediente &c. Pleurod. Plethor. S. sp. I. Pleurit. vera S. sp. I. — Conv. S. sp. 13. e) Verminosa S. sp. 8. c. dolore sub costis spuriis lateris sinistri, Dyspnœa & pupillis dilatatis.

b) — *Mediastini*: *Mediastina* Vog. Gen. 52. a) anterior Avenz. cum offendiculo ad Sternum &c. S. sp. 4. b) posterior *Dorsalis Hipp.* S. sp. 3?

c) — *Pericardii*: *Pericarditis* Vog. Gen. 53. cum Syncope & Palpitatione, atque assidua ad Tussiendum proclivitate, Pleur. Peric. S. sp. 5. Hydroth. S. sp. 15.

d) — *Diaphragmatis* cfr. Genus sequens;  
& lie-

& *lienis* Pleurit, imitans, conf. Splanchn. Li-  
enalem III. Ord.

*Cura:* Pauperibus & Ruricolis sufficit u-  
na rariusque altera V. Sectio, & mixtura de  
aceto Ol. Lini rec. & Syr. comm. ana ad Co-  
chlearia tria mane & Vespere; atque inter-  
dum, Pulvis nitrosus cum Card. Ben. Ant.  
Diaph. & Sach. menthae. Alvis moderate  
aperta tenetur. Et in casu difficultiori die 4  
vel 6. Vesicatorium ad suras applicetur; Di-  
tiorum confr. Spec. 3. Verminosa Emeticum  
posteaque anthelmintica expostulat.

Sp. 2. PLEUR. VERA MALIGNA, Febris Synochi  
putridæ, cum dejectione virium comi-  
tata.

a) — *Sanguinea:* Synochi putridæ.

b) — *Bilioso-phlogistica:* cum ardore u-  
rente & ariditate linguae, jactatione & excur-  
sione doloris in varia loca. Pleur. Erysipel.  
S. sp. II.

c) — *Epidemicorum:* cum Bubon, & Carb.  
v. Svet. T. V. p. 152.

*Cura:* Laxans e. gr. ex Elect. Linit. cum  
**Cryst.** Tartari & Sulphure Aurato Antimonii  
mane, & mixtura Simplex Camphorata Ve-  
spere quotidie repetetur in I. & II. stadio. Si  
V. S. fert morbus, his præcedat. Senega  
Polygalæ commendatur; nos v. acetum pro-  
phylacticum c. sero lactis edulcoratum illi  
præferimus.

Spec. 3.