

H.

DISSE

DISSERTATIO

DE

MORBIS

VIARUM LACRIMALIUM

COGNOSCENDIS ET CURANDIS.

CUJUS
PARTEM PRIOREM,
CONS. FAC. MED. ABOËNS.
PRÆSIDE

DOCT. JOSEPHO PIPPINGSKÖLD
CHIR. ET ART. OBSTETR. PROFESSORE PUBL. ET ORD. ASS.
IMP. COLL. MED. IENN. REG. ACAD. SCIENT. HOLM.
NEC NON IMP. SOC. OEC. FENN. MEMBRO.

PRO GRADU DOCTORIS
PUBLICÆ DEFERT CENSURÆ
NICOLAUS ABRAHAMUS URSIN,
PH. M. MED. LICENT. STIP. BREM. ET CANCELLISTA IMP. COLLEGII
MED. FENNICI.

In Audit. Medico d.XII. Maji MDCCXIII,

Horis a. & p. m. solitis.

ABOËS, TYPIS FRENCKELLIANIS.

EXPLICATIO TABULÆ.

FIG. I.

Imaginem oculi humani dextri partiumque huic vicinarum exhibet.

- a Pars suprema Sacci lacrimalis.
- b Pars ejusdem infima vel principium Ductus nasalis.
- c Tendo musculi orbicularis oculi, partem aliquam Sacci transverse obtegens.
- d Canalis lacrimalis superior.
- e Canalis lacrimalis inferior.
- f Caruncula lacrimalis.
- g Pars musculi orbicularis ab insertionibus soluta & reflexa, ut situs naturalis Sacci melius appareat.

FIG. II.

Plumbeum quoddam instrumentum debita magnitudine delineatum.

DE
MORBIS
VIARUM LACRIMALIUM
COGNOSCENDIS ET CURANDIS.

PROOEMIUM.

Pernoscenti cuique tenuem viarum lacrimas ex oculis in narum interiora deferentium texturam, arctissimum earum cum partibus vicinis conexum, mirumque consensum, haud difficulti appareat negotio, illas variis morborum generibus esse obnoxias. Easdem affirmat quoque experientia, idiopathicis non solum affici morbis, sed etiam sympathicis quam plurimis premi molestiis. Quæ viarum lacrimalium vitia, indole & natura diversissima, antiquiores Artis Chirurgicæ Scriptores in unum, *Fistulam idem lacrimalem* appellantes, redegerunt.

A Qui,

* Every obstruction to the passage of the tears from the eye to the nose, is commonly, though improperly, denominated a *Fistula lachrymalis*. A System of Surgery by B. BELL, 1783. Vol. III, p. 469.

Qui, ut Anatomicæ & Physiologicæ harum partium cognitionis fere expertes,² nec earundem noxas rite distingvere & dignoscere, neque aptam iis mendendi rationem proponere valuerunt.

Pa-

² Præpostoræ de secretione lacrimarum adjungamus exempla opinionis, quam antiquorum quidam, et si Anatomia haud ignari, habuerunt.

"Ad oculos ipsos ex faucibus egrediens venio, in quibus primum prætermisere Anatomici duo foramina parva in angulo interno positæ, quorum, unum est in palpebra superiori, alterum in inferiori, in viventibus adhuc hominibus, si quis inspicere voluerit apparentia, quæ foramina habent meatus qui sub caruncula encanthidos vel epicanthidos dicta uniuntur in quendam communem sinum in narium cavitatem desinentem per canalem proprium in osse squamofo, quod internum angulum occupat insculptum."

"Per hos meatus major lacrimarum pars, ut ego in flentibus mulierum observavi, ad oculos emanat."

FALLOPIUS.

"Per pusillum utriusque palpebræ foramen lacrimæ naturaliter effluunt."

FABR. AB AQUAPENDENTE.

"Lacrimæ veniunt a foramine quodam parvo, & quasi insensibili in fine pilorum."

GUIDO.

5

Parum igitur utilitatis in cognoscendis & curandis hisce morbis attulerunt HILDANUS,³ STAHL,⁴ MELL⁵ aliique ejusdem temporis plures, qui de hac materia pertractanda bene mereri studuerunt.

Diligentiores paullo huic rei explanandæ operam dederunt Cl. Viri ANEL,⁶ HEISTER,⁷ WOOLHOUSE,⁸ PLATNER,⁹ S. YVES,¹⁰ LAMORIER,¹¹
A 2 SCHO-

³ Observationum centuriæ V. Basil. 1606 & Lugd. 1641. 4.

⁴ Dissertatio de Fistula lacrimali. Halæ 1702.

⁵ Delle Fistole lacrymale. Venet. 1717. 8.

⁶ Methode pour guérir les Fistules lacrymales. Turin 1713. 4.

Discours apologetiques pour la nouvelle Methode de guérir les Fistules Iacrymales. Turin 1714. 4.

⁷ De nova methodo sanandi fistulas lacrymales. Altorf. 1716, 4 cum tab. æn.

^{8. 9} De fistula lacrymali. Lips. 1724. 4.

¹⁰ Nouveau traité des maladies des yeux. Paris 1722. 12.

¹¹ Mem. de l' Acad. des Sc. a. 1729.

SCHOBINGER,¹² J. L. PETIT,¹³ HUNAULD,¹⁴ MON-
RO,¹⁵ DE LA FOREST,¹⁶ MEJAN,¹⁷ CABANIS,¹⁸
GUE-

¹² De fistula lacrymali, Basil. 1730. 4.

¹³ Mem. de l' Acad. des Sc. a. 1734.

Traité des maladies chirurgicales & des operations, qui
leur conviennent. Ouvrage posthume. Tom. I. pag. 289 —
376- a Paris 1774.

¹⁴ Philos. Transact. Vol. XXXIX. a. 1735.

¹⁵ Medical essays and Observ. by a Soc. of Edinb. Vol. III.
The works of ALEX. MONRO, published by his Son
ALEX. MONRO. Edinburgh 1781.

¹⁶ Nouvelle methode de traiter les maladies du Sac lacry-
mal, nommés communément Fistules lacrymales. Par
M:r de la FOREST.

Memoires de l' Academie Royale de Chirurgie. Tom.
V. a Paris 1753. pag. 55 — 150.

¹⁷ Nouvelle methode de traiter la fistule lacrymale; par
M:r MEJAN.

Mem. de l' Acad. R. de Chir. I. c.

¹⁸ Dissertation de M:r CABANIS, dans laquelle il propose
des instrumens nouveau pour pratiquer avec plus de fa-
cilité quelques operations, que cette maladie exige.

Mem. de l' Acad. R. de Chir, I. c.

7

GUERIN, LOUIS,¹⁹ BORDENAVE,²⁰ WARNER,²¹
Z. VOGEL,²² PALLUCCI,²³ A. PETIT,²⁴ CHESEL-
DEN,

¹⁹ Reflexions sur l' operation de la Fistule lacrymale. Par
M:r LOUIS. Mem. de l' Acad. Royale de Chir. l. c.

²⁰ Examen des reflexions critiques de M. MOLINELLI, in-
férées dans les Memoires de l' Institut de Bologne, con-
tre le Memoire de M. PETIT, sur la Fistule lacrymale,
inséré parmi ceux de l' Academie Royale des Science de
Paris. A. 1734, par M. BORDENAVE.
Mem. de l' Acad. R. de Chir. l. c.

²¹ Observ. Chirurg. Paris 1757.

²² Anatomische, Chirurgische und Medicinische Beobach-
tungen und Untersuchungen. Rostock 1759, 2. pag. 269
— 295.

²³ Methodus curandi fistulam lacrymalem. Wienn. 1762.

²⁴ A. RIVARD & LE PREUX Qv. Med. & Chir. An Impedi-
tis lacrymarum viis, parari debeat lacrymis artificiale
iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum inter
superficiem internam palpebrae & oculi globum deprehen-
ditur? Paris 1766.

8

DEN, LE DRAN,²⁵ MEZGER,²⁶ AB ACREL,²⁷ HEN-
KFL,²⁸ BLIZARD,²⁹ CHOPART, DESAULT,³⁰ POTT,³¹
A. F. VOGEL,³² LOBSTEIN, SCHULZE,³³ WATHEN,³⁴
SHA-

²⁵ The operations in Surgery of M. LE DRAN, Translated by M. GATAKER. With remarks &c. by M. CHESELDEN. London 1763. pag. 356—362.

²⁶ Curationum Chirurgicarum, quæ ad fistulam lacrymalem hucusque fuerunt adhibitæ, historia critica. Monafer. 1772.

²⁷ Chirurgiska Händelser. Andra upplagan 1775, Stockholm.

²⁸ Chirurgischen Operationen. Berlin 1776.

²⁹ A new method of treating the Fistula lacrymalis. London 1778.

³⁰ Traité des Maladies Chirurgicales & des Operations, qui leur conviennent; par M. M. CHOPART & DESAULT. Paris 1779.

³¹ The chirurgical Works. London 1779. Observations on that disorder of the corner of the eye commonly called fistula lacrymalis. Vol. I. pag. 291—370.

³² Chirurgische Wahrnehmungen. Erste Sammlung. Lübeck 1778. Zweyte Sammlung 1780.

³³ De fistulam lacrymalem sanandi methodis. Argentor. 1780.

³⁴ A new and easy method of applying a tube for the fistula lacrymalis. London 1781.

SHARP,³⁵ PELLIER,³⁶ POUTEAU,³⁷ B. BELL,³⁸
JURINE³⁹ & LAUR. NANNONI.⁴⁰

Selectis editis observationibus, hujus generis ægritudines respicientibus, quidam allatorum Auctorum, indolem earum atque naturam satis bene illustrarunt; alii, morbis ejusmodi laborantes ægritudine levare fategerunt novis inveniendis instrumentis & curandi artificiis, quorum pleraque, et si ab Inven-

³⁵ A critical enquiry into the present State of Surgery. London 1761.

A treatise on the operations of Surgery. The tenth edition. London 1782. pag. 182.

³⁶ Recueil de memoires & d^e observations tant sur les maladies, qui attaquent l^e Oeil, & les parties, qui l^e environnent, que sur les moyens de les guerir. Par M. G. PELLIER de QUENGSY, Fils, Montpellier 1783.

³⁷ Oeuvres posthumes. Tome troisième, à Paris 1783.

³⁸ L. C.

³⁹ Nouvelle methode de traiter la fistule lacrymale. Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie. Oct.-Dec. 1791. à Paris.

⁴⁰ Trattato delle materie chirurgiche. T. I.

ventoribus magnopere laudata, ab experientia tamen, ut minus idonea, quin etiam noxia, dudum sunt rejecta.

Recentioris autem nostrique ævi & Medicis & Chirurgis, clariorem in hanc rem spargere lucem, reservatum fuit. In his eminent Cel. Viri JANIN,⁴¹ A. G. RICHTER,⁴² KORTUM,⁴³ CALLISEN,⁴⁴ SCARPA & LÉVEILLÉ.⁴⁵ Quorum ex scriptis facillime certatur;

⁴¹ Mémoires & observations anatomiques, physiologiques & physiques sur l' oeil & sur les maladies, qui affectent cet organe; avec un précis des opérations & des remèdes, qu'on doit pratiquer pour les guérir. Lyon & Paris 1772.

⁴² Observ. Chirurg. Fasc, III. Cap. 2.

Anfangsgrunde der Wundarzneykunst. Zweyter Band. Göttingen 1786.

⁴³ Medicinisch - Chirurgisches Handbuch der Augenkrankheiten. Erster Band, Vierter abschnitt. Lemgo 1791.

⁴⁴ Systema Chirurgiae hodiernæ. Pars posterior. Hafniæ 1800.

⁴⁵ Traité pratique des maladies des yeux. Traduit de l' Italien sur le manuscrit, sous les yeux de l' Auteur, (SCARPA) & augmenté de notes par J. B. F. LÉVEILLÉ. Tome premier. a Paris 1802.

nitur, Illos viarum morbis lacrimalium succincte definiendis, causis eorum accurate explicandis, signis diagnosticis & prognosticis dilucide determinandis, modisque medendi, ad Anatomiae præcepta & Physiologiæ, proponendis, palmam ceteris sere omnibus præeuntibus hujus rei Scriptoribus, præripuisse. Quam ob causam perfectior ejusdem cognitio, horum in primis Virorum diligentiae, industriæ & sagacitati est attribuenda.

Quum etiam nobis & in Nosocomiis publicis & in privata praxi data fuerit occasio, læsas & vitias lacrimarum vias multoties inspiciendi, simulque sæpen numero experiundi illas curatu fuisse valde difficiles, non inutile esse duximus, Tironum in Arte Chirurgica gratia, hodiernam partibus hisce morbos medendi rationem, ab inclitisimis temporis nostri Viris receptam & experientia approbatam breviter exponere nostrasque addere qualescumque observationes.

Te vero, Lector candide! dissertationem quandam, constitutionum tenore edituri rogamus, ut a sum nostrum æquo velis & bono excipere judicio.

Vias, per quas lacrimæ ab oculis in nares internas defluxuræ sunt, constituunt *Canales lacrimales*, *Saccus* ejusdem nominis & *Ductus nasalis*. Quorum partium structuram, situm & functiones, ut a quovis plenius percipi & comprehendendi possint, breviter sumus descripturi.

Canales lacrimales sunt ductus duo subtilissimi, canthum oculi majorem amplectentes, quorum uterque orificio gaudet externo, ad finem tarsi interiorem, in margine utriusque palpebræ conspicuo. Utrumque orificium, ab Anatomis *punctum lacrimale* nuncupatum, papillæ insidet rotundæ, verrucæ minutissimæ in centro perforatæ quam maxime simili. Papilla superior, inferiore est paullo longior.

Canales ipsi in facie palpebræ posteriore latentes, & membrana hujus interna tantummodo vellati, dissimiliter proserpunt. Superior⁴⁶ enim parum adscendit, & ad angulum rectum flexus, fere transversim commissuram versus palpebrarum internam properat. Inferior⁴⁷ autem, cuius diameter duplo major est superioris, paullulum descendit, formatoque

⁴⁶ Fig. I. d. ⁴⁷ Fig. I. e.

que angulo, oblique sursum tendit. Ambo ad se invicem accedentes, pone tendinem⁴⁸ musculi orbicularis, in unum angulo conjunguntur acuto ductum, septo in initio quidem, divisum, communi tamen ostiolo anteriorem & superiorem -- haud summam -- Sacci lacrimalis partem, perforantem. Superficies Canalium interna est laevissima, fere alba & minimis adspersa poris.

Receptaculum fulco osseo, e fossa ossis ungvis & processu frontali maxillæ superioris conformato, firmiter annexum, in quo lacrimæ ope Canalium ex oculis colligendæ sunt, *Saccus*⁴⁹ nominatur *lacrimalis*. Figura est ovali, longitudine dimidii circiter pollicis & pennæ columbinæ crassitie. Situs ejus est obliquus, ex obliquitate fossæ Ossis ungvis pendens, ita ut antrorum & extrorum progrediatur. Musculo obtectus est orbiculari⁵⁰ & hujus tendine. De cetero ipse Saccus ex duabus distinctis constat membranis, exteriore tenui & alba, interiore vasculosa, rubra & pulposa, continuatione, ut videtur, membranæ pituitariae.

B 2

Sac-

⁴⁸ Fig. I. c. ⁴⁹ Fig. I. a. b. ⁵⁰ Fig. I. g.

Saccus lacrimalis sensim contractus & comple-
tum osseum canalem ingressus, nomine insignitur
Ductus Nasalis,⁵¹ qui hoc in loco, angulo facto,
parum retrovehitur. Aliqua parte antri HIGMORE
tectus, deorsum & retrorsum ad nares progradientur
& sub osfe spongioso inferiore, orificio oblique re-
fecto, terminatur. Canali huic osfe Ductus nasalis
firmissime adhaeret. Intus autem membrana rubra,
vasculosa & succulenta, Schneiderianæ æmula,⁵²
vestitur, quæ plica semilunari, libera, faciem val-
vulae exhibente & aliquam orificii inferioris partem
claudente finitur. In media fere Ductus parte, inæ-
qualis & paullo prominens observatur circulus sive
annulus, vicem sphincteris supplens, primo a CL.
JANIN bene descriptus.

Præmissa anatomica harum partium descriptio-
ne, singularem illisque proprium, collectas in ocu-
lis.

⁵¹ Fig. I. b.

⁵² The membrane which lines this sacculus and duct, is
in its structure much like to the membrana pituitaria-
narium, from the surface of which a clear viscid mucus
is secreted, and by which the sacculus and passages are
constantly moistened and kept pervious. Port. I. c.
pag. 306.

lis lacrimas absorbendi & ad cavum narium defērendi modum, de quo Naturæ Scrutatores nimis valde disputerunt, paucis quoque sumus exposituri.

Figuram Canalium lacrimalium & nexus eorum cum Sacco, hujusque cum Ductu nasalí respiciens lacrimas tamquam per siphonem ex oculis evehi Cel. J. L. PETIT existimavit.

Cl. MOLINELLI, habito miræ horum Canalium subtilitatis respectu, eos lacrimas vasorum more capillarium exantlare proposuit.

Qui Cel. Viri, lacrimas per vias suas, passivo & inerti modo, absque vi quadam adjuvante viva, his insita, transire rati sunt.

Pluribus autem experimentis a **Cl. JANIN** institutis, compertum est, non solum orificia punctorum lacrimalium alterna constringi vice & relaxari, sed etiam Canales ipsos, Saccum & Ductum nasalem, motu vivo & vermiculatō gaudere. Quamquam quidem certum est, veras fibras musculares in tenuissimis his partibus a nemine detectas fuisse; easdem tamen infitiandum non est, corporum actuale moventium exhibere speciem. Quis est, qui non

viderit, puncta lacrimalia, specillo leviter tacta, vicissim contrahi & dilatari? Ex quo concludere licet, ista sphincteribus esse instructa subtilissimas. Cuique vicinas has attente inspicienti partes, facile apparet, Canales lacrimales eorumque orificia, clausis palpebris, protendi & elongari, iisdem vero aperitis, retrahi brevioresque reddi, quod sine fibris muscularibus in longitudinem dispositis fieri nequit. Sæpe quoque vidimus, canales hos, licet Ductus nasalis fuerit obturatus & Saccus humoribus repletus tumidusque, officio tamen suo fungi, lacrimas in hunc continue deferendo. Certissimum activi illorum motus indicium.

Eiusdem quoque indolis & naturæ Saccum esse lacrimalem, experimentis est confirmatum.

Quibus igitur cognitis, functiones partium, absorbendis & evehendis lacrimis dicatarum, haud difficile explicantur. Lacrimæ nimirum versus canthum majorem consuetis propulsæ nictationibus, & in spatio triangulari curvilineo, inter tumidum palpebrarum limbum & globum oculi reliquo, collectæ, ab aperitis punctis Canalium primo excipiendæ & deinde motu horum vermiculari in Saccum lacrima-

malem impellendæ sunt. Quæ nonnullis horæ minutis ibidem detentæ, &, sphinctere Ductus nasalis laxato, per hunc transmissæ, in narium interiora tandem diffunduntur.

Sed hæc hactenus.

Progrediamur ad explanandos viarum lacrimalium morbos, qui in tres dispesci posunt classes, Canalium puta lacrimalium, Sacci ejusdem denominationis & Ductus nasalis. Primum igitur exponendi sunt

MORBI CANALIUM LACRIMALIUM.

Papillæ cum orificiis vel punctis Canalium obnoxiae esse solent:

I. INFLAMMATIONI. Præter violentias externas iis illatas, phlogofin excitantes, Ophthalmiæ etiam ex miasmate quodam, scrophuloso in primis & syphilitico ortæ, afficiunt papillas, quarum morbos a conditio rubore, tumore & pruritu saepe intolerabili dignoscitur. Tarsi palpebrarum plerumque simul sunt rubri, tumidi & dolentes. Repri- mendæ

mendæ papillarum inflammationi cura morbi pri-
marii suffectura est. Aquæ simul ophthalmicæ
discutientes & involventes,⁵³ pluries de die ocu-
lis instillandæ sunt, ut humores acres ibi collecti
attenuentur.

II. VULNERATIONI. Papillas punctorum vario mo-
do vulneri inopinate infligi posse notum est. In
tumoribus quoque oculi & palpebrarum extir-
pandis, nisi debita adhibetur cautio, facile fauci-
antur. Quibus quocumque modo vulneratis, col-
lyriis antiphlogisticis⁵⁴ inflammatio præcavenda
est, ne parietibus vulnusculi agglutinatis, orificia
Canalium oblitterentur.

III. EXULCERATIONI. Prægressis harum partium
inflammationibus, vulnerationibus & erosionibus,
a quocumque morbi genere oriundis, iisdemque
neglectis, papillæ punctorum ulcere corripiuntur,
quo,

⁵³ E. gr. Mucilaginis seminum Cydoniæ uncia & Campho-
ræ grana duo mixta cum aquæ Rosarum unciis duabus.

⁵⁴ E. c. Granis sex Vitrioli albi in aquæ Rosarum unciis
duabus solutis, additis Spiritus Rosmarini drachmis dua-
bus.

quo, nisi medela^{ss} indolem caussarum respicien-
te, illi cito occurritur, facillime corroduntur.
Quibus exesis, Canarium orificia lacrimas ex o-
culis excipere non valent. Ex quo, cum papillæ
restitui nequeunt, Epiphora nascitur irremediabi-
lis, cui siccitas lateris narium internarum affecti
adjuncta est.

IV. CONTRACTIONI SPASTICÆ. Papillæ punctorum
lacrimalium, quocumque modo diutius irritatæ,
tam sensibiles evadunt, ut, accedente graviori sti-
mulo, lumina eorum constringantur. A punctis
coarctatis indoles morbi facili negotio cognosci-
tur. Oculi natantes hunc comitant, punctorum
C clau-

^{ss} Ulceratis papillis punctorum sanandis; remedia balsami-
ca & exsiccantia proficere solent: Colata scilicet solutio
Myrræ in decocto Salviae. Tenuis etiam solutio Lapi-
dis Ophthalmici S. Yves. Hic lapis, divinus quoque di-
ctus, ex Vitrioli de Cypro, Nitri purissimi & Aluminis
crudi aqua uncia componitur. Quibus optime pulveratis
& in vase vitreo, calore balnei arenæ liquefactis, Cam-
phoræ tritæ drachma semis addatur. Mixta & refrigerata
massa servetur. Quædam hujus grana in aquæ Rosarum
vel Sambuci uncia soluta, collyrium detergens eximum
præstant.

clausorum sequelæ. Spasmodicis remediis interne sumendis & emollientibus ^{et} externis adhibendis papillarum orificia celeriter relaxanda sunt, ne interveniente concrescant inflammatione.

V. CONCRETIONI. Inflammatas & vulneratas se invicem tangentes partes, lymphæ ope coagulabilis, e superficie harum exsudantis, facile conglutinari, cuique, cujus interest, ignotum esse nequit. Puncta etiam lacrimalia, vulnere & erosione affecta coalescere, experientia docet. Quo in morbo, orificia punctorum, membrana tenerima & albida obducta videntur. Quod vitium interdum etiam est congenitum. Nato hoc impedimento, oculorum rivuli lacrimis referti sunt, iisque immaDESCUNT perpetuo defluentibus genæ. Patentibus salvisque Canalibus lacrimalibus, orificia punctorum aperienda sunt, adventitiam acu acuta membranulam perforando, & ut aperta remaneant, cantho oculi majori collyria leniter adstringentia pluries quotidie guttatum sunt immittenda.

VI.

*⁶ Decocito Malvæ oculi lavandi sunt.

*⁷ Composita e. g. ex granis aliquot Aluminis vel Sacchari Saturni in aqua Rosarum uncia solutis.

VI. ATONIÆ. Fibrarum ostiola punctorum constrictarum infirmitas & resolutio, rarius est idiopathica, saepius autem consensuales. Illa ex ruddiori specillorum & setaceorum per puncta trajectorum usu, haec ex Paralyssi & debilitate partium adjacentium originem dicit. Puncta in utraque specie sunt hiantia, deficiente omni se contrahendi vi & nisu. Quibus ab officio suo abductis, oculi natant lacrimis, quæ perpetim supra genas destillant. Irritantibus & nervinis remediis⁵⁸ scintillisque electricis, fibrarum irritabilitas restituenda est.

VII. PERPESSIONI quorundam aliorum morborum. Qui in primis ab officio lacrimis absorbendis praestando impediunt puncta, sunt quedam palpebrarum & canthi interni vitia, ut Trichiasis, Aencyblepharum, Symblepharum, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, Encanthis, Rhyas, Anchilops, Ægilops aliique, tumoribus tunicatis, carnosis & aquosis, partes vicinas infestantibus, haud exceptis. Quorum igitur inevitabiles sunt

⁵⁸ E. g. Aquæ Fœniculi uncia, Vitrioli albi grana quat tuor & Spiritus vini camphorati drachma.

comites, lacrimatio continua & ariditas narium internarum.

Commemoratis punctorum eorumque papillarum morbis, diversas quoque paucis evolutnri sumus Canalium ipsorum, quibus coripi solent noxas. Hæ sunt:

I. INFLAMMATIO, sequela vel violentiæ Canalibus illatæ, ut frequentioris & durioris explorationis ope specillorum Anelianorum factæ; vel acrimoniæ cujuscumque indolis, lacrimis mixtæ & in eos inductæ, haud spernenda. Linea cutis exter- nae rubra, cursu Canalis sequente, hoc detegitur malum. Discutientibus⁵⁹ medicamentis angulo oculi majori immittendis, iisdemque partibus externis simul apponendis, inflammatio cele- riter resolvenda est, ne parietes Canalis invicem agglutinentur. Complicatarum etiam specierum eura minime est omittenda.

II. EXULCERATIO. Prægressa & male tractata Ca- nalium inflammatione, a quacumque causa orta,

pa-

⁵⁹ E. c. Aquæ Saturninæ & Rosarum portiones anaticæ in- ter se mixtæ.

parietes eorum facile ulcerari, compertum est. Represæ per puncta lacrimæ, in leviore casu pure albido, in graviore luteo sunt mixtæ, indicium illorum fidissimum exulcerationis, quæ in Saccum etiam lacrimalem proserpere potest, nisi collyriis detergentibus ^{so} illi cito medeatur.

III. CONSTRICTIO SPASTICA. Erethismus fibrarum Canarium interdum tam vehemens est, ut cava-
tes eorum plane coarctentur, quo transitus lacri-
marum per Canales in Saccum ex toto impedi-
tur. Puncta eorum plerumque simul sunt contra-
cta. Spasmo laxando eadem adhibenda est cura,
quam orificiis papillarum, spastico hocce morbo
vexatis remittendis, proposuimus.

IV. CONGLUTINATIO. Parietes nimirum Canarium
interni, accidente quadam inflammationis & ul-
cerationis specie adeo concrescere queunt, ut ca-
vitates eorum evanescant. Magni est momenti &
frequens vitium, quod punctis simul concretis fa-
cile,

^{so} Collyrium e. g. ex Aceti Saturnini drachma, Aquæ Hys-
sopi uncii duabus, Lapidis ophthalmici granis sex &
Spiritus vini rectificati drachma semis compositum.

cile, his vero apertis ægre dignoscitur. Cujus tamen indolem & naturam gravis Epiphora, Sac- ci lacrimalis collapsus & molesta narium internarum siccitas indicant. Si recens est conglutinatio & imperfecta, specillo obtuso subtilissimo, per punctum in Canalem inferendo, eam divellere valamus. Quod inveteratae & totam ejus cavitatem occupanti removendæ, frustra adhibetur. Cui destruendæ Canalem stilo tenui acuto transfigere, eumque solutionibus leviter adstringentibus injiciendis apertum conservare nonnulli proposuerunt. Sed faustæ vix inititum experientiæ. Quis est, quin noscat, mucronatum hoc instrumentum facillime de recta declinare via, &, si quando recta progrederetur, nihil impedire, quo minus Canalis celeriter denuo concrescat. Quibus cognitis, plures eidem medendi rationes ab Artis peritis excogitatæ sunt. Cel. MONRO, ut nova svadens lacrimis via ab oculis profluxuris aperiatur, sequentem hujus pandendæ præscripsit modum: Inciso Sacco lacrimali, specillum acutum justæ crastitiei, filo sericeo tenuissimo annexum, per punctum in Saccum trajiciendum est & e vulnere Sacci educendum. Filum autem ibidem tam diu relin-

relinquendum, donec nova, eodem hinc inde quotidie paullulum trahendo, via prorsus calluerit. Cui quoque proposito obtinendo, Cl. BELL loco fili ferici, plumbeo & Cl. CHOPART cereolis usi sunt. Quæ novum lacrimis transitum parandi methodus, Cl. LÉVEILLÉ non arridet; quemcumque existimat, obstructis ab omni parte Canalicibus, eorum restituendorum conatum, irritum esse. Hic autem artificialem defluentibus lacrimis viam, media in parte, inter commissuram palpebræ inferioris & punctum hujus lacrimale faciendam esse indicat. Definito itaque loco, scalpello recto & gracili, in Saccum usque penetrato, chorda vulneri immissa in cavum narum inducenda est; interjectis quattuor vel quinque diebus, chorda alterna luce mntanda, dum inflammatio vulneris evanuerit. Qua represa, interiora Sacculi & novi canalis cauterio apto vel caustico lumen inurenda sunt. Quo facto, chorda in ulcus iterum introducenda est, atque eschara remediis emollientibus soluta & pure bono iisdem promoto, alterno die commutanda, donec novus canalis callo obductus & omni coarctandi facultate privatus fuerit. Talem eum esse oportet, quem
 fini

fini intento optime responsurum fore, Cl. Vir ratus est.⁶¹

Qui-

⁶¹ Ut operandi modus a Cl. LÉVEILLÉ oblatus melius comprehendatur, ipsa Ejus verba prolaturi sumus, Sic se habent: Voici l' operation que je proposerai; elle me paroît devoir parfaitement répondre à mon intention. A l'aide d'un bistouri très-étroit, on pratiquera une petite incision entre la commissure interne de la paupière, inférieure, & l' endroit où doit exister le point lacrymal; dans ce repli qui distingue la caroncule, des tégu-mens de la paupière. Après avoir pénétré dans le sac, on introduira une corde à boyau, à mesure que l'instrument sera retiré; cette corde, enfoncee très-profoundément jusque dans le nez, sera fixée sur les côtés de la racine du nez, au moyen d'un morceau de taffetas d'Angleterre, qui retiendra un fil attaché à l' extrémité supérieure de cette même corde. Pendant les premiers jours, le Chirurgien emploiera avec discernement les remèdes généraux & les topiques convenables pour l' opposer aux progrès d'une inflammation inévitable. On laissera, au moins quatre ou cinq jours, ce corps étranger dans le sac & le canal nasal, sans en être retiré; puis, ce temps écoulé, on le renouvellera tous les deux jours, jusqu'à ce que la suppuration soit bien établie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni inflammation ni engorgement. Si, dans ce cas, on supprime la corde à boyau, l' ouverture ar-

Quibus viarum lacrimis proferendis artificiose
aperiendarum modis inter se collatis, utrumque gra-
D vibus

tificielle se fermera, comme celle faite pour l'opération de la fistule lacrymale. Le traitement deviendra absolument inutile. Je conseillerai donc d'effectuer, à cette époque, une perte de substance, en portant dans l'ouverture occupée par la corde à boyau, le bouton rougi d'un stylet, semblable à celui dont on se sert pour sonder les plaies. De cette manière, on cautérisera les parois membraneuses du sac, le tissu cellulaire & la peau qui le recouvre à l'endroit que nous avons indiqué pour l'incision. Je préférerois encore porter, avec des pinces ou avec le porte-pierre, un morceau de nitrate d'argent fondu, taillé en crayon, & assez long pour pénétrer jusqu'aus le sac. Ainsi, on cautériseroit également les parois du nouveau conduit lacrymal. Cette seconde opération achevée, on réintroduira la corde à boyau, comme auparavant; on provoquera la chute des escarres, en établissant une bonne suppuration par l'usage des emollients. La plaie réduite à cet état désiré, la corde à boyau sera de nouveau chancée tous les deux jours; des injections d'eau d'orge miellée seront faites à chaque pansement; enfin, la cicatrice se fera sur ce même corps étranger, qui doit toujours être d'une moyenne grosseur, parce qu' étant supprimé, l'ouverture qui le recevoit, grande d'abord, le rétrécit nécessairement un peu.

vibus implicitum esse difficultatibus, non est infitandum. Quem tamen Cl. LÉVEILLÉ retulit, rudioris est indolis & ad texturam situmque partium operationem subiturarum, aut vix aut omnino non perfici potest.

Experimentis hac in re, etiam a nobis factis, ad consentiendum cum illis ducimur, qui artificiosas ejusmodi vias, quacumque apertas methodo, vicem Canarium lacrimalium non efficere contendunt. Decisa etiam est res, lacrimas ex oculis passivo modo haud excipi & proferri, sed activo absolvi, motu scilicet Canarium vermiculari, fibris eorum muscularibus vel saltem his analogis cito. Medentes igitur consultius agunt, ægris incommoda Epiphoræ perferre consulendo, quam crudelibus artificiis eos inutiliter cruciando.

V.

Il n'y a plus d'oblitération à craindre, &, dans cet état des parties, le praticien est assuré d'avoir établi avec avantage une route artificielle des-larmes dans la fac lacrymal, dans le canal nasal, d'avoir ainsi supplié au défaut des points lacrymaux & de leurs conduits; enfin, il n'y aura plus d'écoulement des larmes sur la joue, L. c. p. 113.

V. INERTIA VIRIUM MOTRICIUM. Canarium lacrimalium atonia plerumque est Ptoleos paralyticæ comes & simul complicata cum debilitate fibrarum orificio papillarum contrahentium. Ab ostiolis punctorum hiantibus & lacrimis supra genas defluentibus hoc cognoscitur vitium, quod pariter sanatur ac orificio papillarum resoluta & debilitata.

VI. COMPRESSIO illis a varii generis partium vicinarum noxis allata. Quas inter tumores cantho oculi majori obvii referendi sunt. Lumina Canarium ab his adeo comprimi possunt, ut lacrimis descensus in Saccum prorsus denegetur. Causis comprimentibus ad regulas Artis removendis, lacrimarum transitus restituitur.

Morbis Canarium lacrimalium qualitercumque pertractatis, progrediendum nobis esset ad ægritudines Sacci lacrimalis & Ductus nasalis explicandas, quarum autem expositionem fonticas ob causas in aliud tempus differre coacti sumus.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
999
1000

Fig. 1




Fig. 2

