

20

DISSERTATIO ENTOMOLOGICA
INSECTA FENNICA
ENUMERANS.

CUJUS PARTICULARAM OCTAVAM

CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. ABOËNSIS
PRÆSIDE

CAROLO REGINALDO SAHLBERG
*Phil. & Med. Doct. Oecon. & Hist. Natur. Prof.
Publ. & Ord. Collegii Imp. Med. Assess. Societt. Imp.
Nat. Studios. Moscov. & Nat. Scrut. Lips. nec non
Soc. Imp. Oecon. Fenn. Membro.*

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT
PRO LAUREA

WILHELMUS FRIDERICUS BRUMMER
Aboënsis.

In Auditorio Philosophico die 18 Dec. 1822.

h. p. m. s.

ABOÆ, Typis FRENCKELLIORUM,

Theses.

I.

Quemadmodum plures Insectorum species, externa forma valde quidem dissimiles, in unum interdum genus, de illarum proprio in Systemate loco dubius, contrusit Cel. a LINNÉ; ita quoque in Ordinem, quem *Aptera* appellavit, animalcula collecavit, tam partium internarum structura, quam exterioro habitu, mirum in modum a se invicem discrepantia.

II.

Quo igitur factum est, ut hicce imprimis Insectorum Ordo, a Linnæo constitutus, ex methodo FABRICII, instrumenta cibaria accuratissime examinantis, in plures dissolveretur ordines.

III.

Mutationes inter, quas recentiori ævo subiit Systema Entomologicum, vel si malueris, totum Systema Zoologicum, maximi profecto est momenti, quod animalia, quæ *Crustaceorum* nomine propriam Classem jam constituunt, e tota Insectorum cohorte, a Celeberrimis Gallorum Entomologis jure, ut opinamur, sublata sint.

IV.

Neque suis caret rationibus consilium a Cel. LAMARCK primo captum, atque dein etiam a Cel. LATREILLE repetitum, *Araneides* a Classe Insectorum sejungere.

V.

Qui enim Araneidum & Insectorum attente contulerit fabricam internam, non potest non perspicere, hæcce animalcula valde a se invicem differre.

4. *P. crenatus*: obscure testaceus pubescens, thorace gibbo submutico, elytris crenato-striatis immaculatis.

Schönh. *Synon.* 2. 109. 7.

Habitat in ligno sicco & domibus, rarius.

Familia X. Cucujipes.

Caput porrectum, exsertum. Antennæ subfiliformes. Corpus oblongum, sæpe elongatum, valde depresso.

CUCUJUS.

Palpi quatuor subæquales, articulo ultimo paulo crassiori obconico, apice truncato. Ligula brevis bifida, lacinias linearibus distantibus. Antennæ moniliformes. Tarsorum articulus primus minutus inferus stipuliformis. Corpus deplanatum.

1. *C. depressus*: niger subnitidus, capite thoracis dorso elytrisque rufis, thorace utrinque denticulato, supra bisulcato.

Schönh. *Synon.* 3. 52. 4.

Habitat sub cortice arborum emortuarum rarissime.

Obs. Articulos tarsorum posticorum in altero sexu, forte masculo, hujus & sequentis speciei, quatuor tantum esse, observarunt Gyllenhal & Schönherr. Ad Tetramera retulit hanc familiam Latreille.

2. *C. dermestoides*: fuso-ferrugineus punctulatus, pedibus rufo-testaceis, thorace utrinque quadridentato, foveolis duabus obsoletis, scutello brevissimo transverso, elytris stria suturali valde impressa.

Schönh. *Synon.* 3. 54. 11.

Habitat in truncis arborum, præsertim Abietis, nuper cæsis, minus frequens.

3. *C. muticus*: niger nitidus subtiliter punctulatus, antennis pedibusque piceis, thorace tenuiter marginato subquadrato bistriato, elytris striis quatuor subtiliter impressis.

Schönh. *Synon.* 3. 54. 12.

Habitat sub cortice arborum rarius; ad Wasam *D. Wasastjerna*; in Parœcia Sastmola *D. Mannerheim*; in Yläne *ipse*.

4. *C. testaceus*: rufo-testaceus nitidus immaculatus, subtilissime punctulatus, thorace subquadrato immarginato mutico, obsolete bistriato, elytris substriatis.

Schönh. *Synon.* 3. 55. 17.

Habitat sub cortice arborum ad Wasam rarissime; *D. Wasastjerna*.

DENDROPHAGUS.

Palpi quatuor breves inæquales; antici in medio crassiores, articulo ultimo conico subacuminato; postici brevissimi clavati. Antennæ fili-

formes, longitudine fere corporis. Tarsorum articulus primus minutus, inferus. Corpus oblongum deplanatum.

1. *D. crenatus*: nigro-piceus depresso, antennis pedibusque rufo-testaceis, elytris brunneis crenato-striatis, thorace profunde punctato, dorso impresso obsolete bisulcato, lateribus sinuatis.

Schönh. Synon. 3. 58. 1.

Cucujus crenatus. Payk. Faun. Sv. 2. 168. 4.

Habitat sub cortice arborum, passim minus frequens.

Familia XI. Clerii.

Antennæ subclavatae, articulo saltem ultimo crassiore. Caput exsertum, latitudine thoracis. Thorax elongatus, postice angustior. Corpus elongatum, subcylindricum. Tarsorum articulus primus minutus, quartus bilobus.

CLERUS.

Palpi anteriores filiformes, posteriores longiores securiformes. Ligula porrecta membranacea bifida, laciniis brevibus rotundatis distantibus. Antennæ moniliformes, clava triarticulata extorsum crassiori, articulo ultimo magno, oblique acuminato.

1. *C. formicarius*: pilosus rufus, capite pedibus-

que nigris, tarsis rufescentibus, elytris nigris, basi rufis, fasciisque duabus albis.

Schönh. *Synon.* 2. 43. 5.

Var. b. Minor, pectore nigro, pedibus vel totis vel ad partem rufescentibus.

Gyllenh. *Ins. Svec.* 1. 311. 1. var. b.

C. femoralis Dejean. *Catal. de Coleopt.* p. 41.

Var. c. Pectore pedibusque nigris.

Habitat in truncis arborum & lignis nuper cæsis, præsertim Pini & Abietis, frequens. Var. c. rarissima.

NOTOXUS.

Palpi quatuor magni securiformes. Ligula membranacea bifida, lacinias longioribus porrectis, ciliatis, obtusis. Antennæ extrorsum crassiores, articulo ultimo majore, oblique acuminato.

x. *N. mollis*: elongatus pubescens fuscus, elytris fasciis duabus apiceque pallidis, abdome rufescente.

Schönh. *Synon.* 2. 52. 3.

Habitat in Fennia australi rarissime.

TILLUS.

Palpi inæquales, anteriores filiformes, posteriores securiformes. Ligula membranacea inter palpos porrecta, integra. Antennæ serratae, extrorsum crassiores.

1. *T. elongatus*: linearis-elongatus, villosus ater,
elytris punctato-striatis, nigro-cerulescentibus.

Femina: Thorace supra rubro.

Schönh. Synon. 2. 45. 1.

Habitat in Fennia australi rarissime. Borgoæ;
D. Savenius; ad Korsnäs in Parœcia Piikis
D. Tams.

Familia XII. Malacodermi.

Antennæ filiformes, sœpe serratæ. Corpus elongatum molliusculum, præsertim elytra. Thorax brevior marginatus semicircularis aut subquadratus. Tarsi evidenter 5-articulati, primo plerumque reliquis longiori.

LYMEXYLON.

Palpi antici porrecti; in mare articulo penultimo magno, appendiculo ovato fisso, ultimo ovato acuto; in femina subfiliformes truncati. Antennæ breves filiformes, articulo ultimo acuto.

1. *L. dermestoides*: cylindricum pubescens, thorace brevi transverso, antennis thorace brevioribus, serratis.

Femina: testacea, oculis, alis pectoraque nigris.

Mas.: niger, elytris testaceis apice nigris, pedidus pallidis.

Hylecætus dermestoides. Schönh. *Synon.* 3. 44. 1.

Var. b. *Mas:* totus niger, pedibus anticis pallidis.
Schönh. *l. c. var. β.*

Var. c. *Femina:* testacea, oculis, apice elytrorum,
alis pectoraque nigris.

Habitat in truncis *Quercus*, *Betulæ* & *Abietis*
rarius.

Obs. Var. c. *Feminæ* varietatis a omni punto simillima,
sed apex elytrorum niger.

2. *L. flabellicornis:* nigrum pubescens, elytris
rufis apice nigris, antennis flabelliformibus pedi-
busque rubris, femoribus posticis fusco-nigris.

Hylecætus flabellicornis. Schönh. *Synon.* 3. 46. 2.

Habitat in Tavastia rarissime.

LAMPYRIS.

*Palpi quatuor subclavati; anteriores articulo ul-
timo conico subulato. Maxilla bifida. Labium
corneum, integrum. Antennæ filiformes com-
pressæ, apice acuminatæ. Caput parvum
occultatum.*

1. *L. noctiluca:* elongata deppressa, supra fusca,
thoracis limbo cinereo, elytris rugoso-punctatis
lineis tribus obsolete elevatis.

Femina: aptera.

Schönh. *Synon.* 3. 59. 1.

Habitat in graminosis subhumidis, passim non infrequens; Femina noctu luce phosphorea fulgens. Mas raro investigatur.

2. *L. splendidula*: elongata depressa supra fusca, thorace antice lunulis duabus fenestrato-pellucidis, elytris crebre punctatis, lineis tribus elevatis obsoletis.

Femina: aptera.

Schönh. Synon. 3. 61. 2.

Habitat in Finlandiae pratis rarissime.

LYCUS.

Os productum, subrostratum. Palpi quatuor inaequales, articulo ultimo majore, oblique truncato, subsecuriformi. Maxilla & ligula simplices. Antennæ filiformes compressæ, thorace longiores. Corpus elongatum depresso. Thorax parvus marginatus.

1. *L. sanguineus*: ater nitidus, thoracis canaliculati lateribus elytrisque sanguineis, his obsolete striatis pubescentibus.

Schönh. Synon. 3. 74. 32.

Var. b. Thorace toto nigro, elytris obscuris.

Schönh. Synon. 1. c. var. β.

Habitat in floribus & in truncis Pini Abietisque frequens; var. b. in Bothnia Orientali rarissime capta.

2. *L. Aurora*: niger holosericeo-pubescens, thoracis foveolati lateribus costisque elevatis rubris, disco fusco, elytris sanguineis, costis disci quatuor elevatis, interstitiis reticulatis.

Schönh. Synon. 3. 76. 36.

Habitat in pratis sylvaticis & in truncis arborum putrescentibus minus frequens; in Provinciis borealibus frequentior.

3. *L. affinis*: niger holosericeo-pubescens, thorace foveolato, elytris sanguineis, costis disci quatuor rugisque crebris transversis elevatis.

Schönh. Synon. 3. 76. 38.

Habitat in pratis & sylvis rarius.

4. *L. minutus*: ater holosericeo-pubescens, thorace foveolato, articulo antennarum ultimo testaceo, elytris sanguineis, costis disci quatuor elevatis, interstitiis reticulatis.

Schönh. Synon. 3. 75. 35.

Habitat in floribus & truncis arborum emortuarum minus frequens.

DASYTES.

Palpi inaequales, extrosum crassiores, apice oblique truncati. Ligula membranacea elongata cylindrica, apice rotundata integra. Antennae filiformes, thorace longiores, saepius serratae. Corpus linearis-elongatum. Thorax brevis marginatus, vix elytris angustior.

1. **D. obscurus:** elongatus nigro-subviolaceus hirtus, thorace brevi, elytris subtiliter rugoso-punctatis, antennis obtuse serratis, maris elongatis.

Schönh. Synon. 3. 14. 14.

Habitat in frondibus Abietis & in floribus, minus frequens.

2. **D. niger:** oblongus niger hirtus, tenue punctulatus, thorace sulculo longitudinali utrinque impresso, antennis obtuse serratis.

Schönh. Synon. 3. 12. 9.

Habitat in floribus frequens.

3. **D. rufitarsis:** elongatus nigro-cærulescens subglaber, thorace elytrisque parcus sed profunde punctatis, antennis profunde & acute serratis, basi tarsisque rufescens.

Habitat ad Wasam rarissime, **D. Wasastjerna.**

Descr. **D. obscuri** latitudine, sed paulo longior. Caput exsertum æneo-cærulescens, thorace angustius, punctatum subpilosum, foveolis inter oculos duabus, tertioque in vertice magis obsoleto, impressis. Oculi nigri. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigrae cinereo-pubescentes, profunde serratae, dentibus elongato-triangularibus acuminatis; articulis ad basin tribus rufescens. Thorax longitudine dimidio latior, antice truncatus lateribus & postice rotundatus tenuissimeque marginatus, supra modice convexus æqualis, distinete punctulatus, nigro subcæruleus, ad latera pilosus. Scutellum nigro-cærulescens rotundatum punctulatum. Elytra thoracis medio vix latiora sed quintuplo longiora, apice rotundata, supra convexa humeris elevatis, nigro-cærulecentia nitida, ad margines subpilosa, parce & profunde punctata. Corpus nigro-cæruleum punctulatum subpubescens. Pedes elongati pilosi nigri, tarsis rufoferrugineis.

4. **D. tarsalis:** oblongus virescenti-cærulescens

hirtus, fronte trifoveolata, elytris profunde punctatis, antennis profunde & acute serratis, basi tarsisque piceo-ferrugineis.

Habitat in floribus rarissime; ad Wasam D. *Wasastjerna*; in Yläne ipse.

Descr. Magnitudine D. floralis. Caput thorace angustius virescenti cæruleum, hirtum punctatum, foveolis vel sulculis tribus, duabus interocularibus, tertio verticali, sat profunde impressis. Oculi nigri. Antennæ nigrae, vix dimidi corporis longitudine, profunde & acute serratae, dentibus elongato-triangularibus; articuli tres ad basin piceo-ferruginei. Thorax viridi-cæruleus hirtus nitidus, postice lator, antice truncatus, lateribus parum dilatatus, angulis posticis rotundatis, supra modice convexus æqualis, cæbre punctulatus. Scutellum viridi-cærulescens rotundatum, tenuissime punctulatum. Elytra thorace quadruplo longiora, apice rotundata, supra convexa humeris elevatis, viridi-cærulescens nitida pilosa, profunde & parcus punctata. Corpus viridi-cæruleum subtilissime punctulatum pubescens. Pedes viridi-cæruleentes, tarsi piceo-ferrugineis.

Obs. Quamvis D. florali magnitudine, antennarum structura elytrorumque punctura valde similis, ab eo tamen differt colore, fronte foveolata, thoracisque lateribus minus rotundatis, atque diversa species mihi videtur. A præcedente, corpore minus elongato, colore, pubescutia & foveola verticali profundius impressa distinguitur.

5. D. *floralis*: oblongus niger hirtus punctatus, thorace æquali non impresso, antennis profunde & acute serratis, tibiis tarsisque fusco-piceis.

Schönh. *Synon.* 3. 13. 10.

Habitat in floribus rarius.

6. D. *nigricornis*: oblongus supra viridi-æneus pubescens elytris profunde punctatis, antennis obtuse serratis, basi tibiis tarsisque testaceis.

Schönh. *Synon.* 3. 15. 22.

Var. b. *Nigrescens*.

Habitat in frondibus **A**bietis tempore vernali,
minus frequens. Var. b. ad Wasam rarissime,
D. *Wasastjerna*.

7. **D.** *flavipes*: linearis elongatus, nigro-virescens
hirtus tenue punctulatus, antennarum basi tibiis
tarsisque testaceis.

Schönh. *Synon.* 3. 13. 13.

Habitat in floribus, passim sat frequens.

8. **D.** *linearis*: filiformi-elongatus virescens opacus
punctatissimus, thorace elongato, subcanaliculato,
abdomine æneo nitido.

Schönh. *Synon.* 3. 16. 25.

Habitat in floribus, præsertim in viciniis maris,
passim.

C A N T H A R I S.

Palpi quatuor, articulo ultimo securiformi. Maxilla bifida. Labium integrum. Antennæ filiformes. Tarsorum articulus quartus bilobus. Elytra abdomen obtegentia.

Sect. 1. Elytris nigricantibus.

1. **C.** *fusca*: nigra, thorace punctato rufo, macula nigra margini antico contigua, abdominis limbo rubro, pedibus nigro-fuscis.

Schönh. *Synon.* 2. 60. 1.

Var. b. Femoribus anterioribus basi rufis.

Schönh. *Synon.* 1. c, var. β.

Habitat in plantis variis frequens.

2. *rustica*: nigra, thorace punctato rufo, macula disci nigra marginem anteriorem non attingente, abdominis limbo femoribusque omnibus rufis, his apice nigris.

Schönh. *Synon.* 2. 61. 2.

Var. b. Thorace toto rufo immaculato.

Habitat in plantis ubique frequens. Var. b. in Parœcia Lemo a D. *Mannerheim* rarissime lecta.

3. *C. dispar*: nigra, thorace lævi rufo immaculato, abdominis limbo pedibusque rufis, genubus tibiisque posticis nigris.

Schönh. *Synon.* 2. 61. 3.

Habitat in Fennia australi rarius.

4. *C. pellucida*: nigra, thorace lævi abdomineque totis rufis, pedibus rufis, tibiis posterioribus nigris.

Schönh. *Synon.* 2. 65. 18.

Var. b. Femoribus apice abdomineque basi nigris.

Schönh. *Synon.* 1. c. var. β.

Habitat in floribus passim.

5. *C. nigricans*: fusco-nigra, pubescens, ore, antennis, thoracis abdominisque limbo atque pedibus flavo-testaceis, tibiis posticis fuscis.

Schönh. *Synon.* 2. 65. 17.

Var. b. Thoracis disco, aut macula parva nigra,
aut toto pallide rufo.

Schönh. *Synon.* l. c. var. β.

Var. c. Tibiis posticis rufescētibus.

Schönh. *Synon.* l. c. var. γ.

Var. d. Antennarum articulis quinque primis
fuscis, elytris vitta elongata rufescēte, tibiis
posticis rufis.

Not. Varietati c magnitudine & statura simillima. Antennæ,
articulo primo ad basin rufescēte, apice nigro, sequentibus
quatuor nigro-fuscis, reliquis rufo-testaceis. Elytra nigra
pube densa cinerea testa, vitta prope ad basin incipiente &
in medio evanescēte, nec suturam nec marginem attingente
rufo-testacea. Pedes testacei, femorum posticorum apice
fusco. An diversa species?

Habitat in fruticibus & plantis frequens. Var.
b. & c. rarius obveniunt. Var. d. rarissime;
ad Wasam, D. *Wasastjerna*; in Fennia au-
strali, ipse.

6. C. obscura: elongata nigra, thoracis lateribus
summoque abdominis margine rufo-pallidis, pe-
dibus totis nigris.

Schönh. *Synon.* z. 64. 15.

Habitat in fruticibus & plantis frequens.

7. C. Lapponica: linearis elongata pubescens ni-
gra, ore, antennarum basi pedibusque pallidis,
thorace angustiori subquadrato, dorso carinato.

Gyll. *Ins. Sv.* z. *Add. XV.*

Habitat in Lapponia rarius; D. *Sanmark*.

8. *C. elongata*: linear-i-elongata nigra, antennarum tibiarumque basi testacea, thorace longiori subquadrato.

Schönh. Synon. 2. 66. 29.

Habitat in frondibus Abietis passim.

9. *C. paludosa*: linear-i-elongata nigra, mandibulis, antennarum tibiarumque basi pallidis, thorace breviore subtransverso.

Schönh. Synon. 2. 67. 30.

Habitat in graminibus paludum minus frequens.

10. *C. atra*: linear-i-elongata fusco-nigra, antennarum basi tibiis totis femorumque apice pallide luteis, thorace breviore subtransverso.

Schönh. Synon. 2. 67. 31.

Habitat in fruticibus & plantis sat frequens.

11. *C. thoracica*: rufo-testacea, vertice antennarum apice elytrisque nigris, pectore piceo.

Schönh. Synon. 2. 67. 34.

Var. b. Pectore etiam testaceo.

Schönh. Synon. l. c. var. β.

Habitat in frutetis rarius.

12. *C. fulvicollis*: nigro-fusca, ore, antennarum basi, thorace, abdominis margine, ano pedibusque pallidis.

Schönh. Synon. 2. 70. 50.

Var. b. Thoracis disco fuscescente.

Habitat in floribus & frutetis Fenniae australis,
haud infrequens.

Sect. 2. Elytris pallescentibus.

13. C. alpina: supra testacea, vertice attenuato nigro, thorace punctulato nigro-maculato transverso postice subemarginato, utrinque unidentato.

Schönh. Synon. 2. 64. II.

Var. b. Supra dilute fusca, elytris pallidioribus, femoribus nigro-fuscis.

Schönh. Synon. l. c. var. β.

Var. c. Thorace testaceo immaculato.

Habitat in pratis sylvaticis passim. Var. c. rarius obvenit.

14. C. livida: rufo-testacea, thorace laevi rotundato immaculato, macula frontali, pectore, abdominis basi, genubus tibiisque posticis nigris.

Schönh. Synon. 2. 62. 4.

Cantharis dispar, Mas. Payh. Faun. 1. 260. 3.

Habitat in hortis & frutetis passim minus frequens.

Obs. An Cantharis a D. Mannerheim in Parœcia Lemo capta, ab hac specie, cui ceteroquin haud dissimilis videtur, magnitudine multo minore atque pedibus totis rufo-testaceis diversa, varietas tantum sit C. livida, vel an distinctam constitutam speciem, ex unico specimine dijudicare non possum.

15. *C. assimilis*: brevior, supra testacea; vertice antennisque nigris, subtus nigra, femorum basi tibiisque anticis testaceis.

Schönh. Synon. 2. 63. 8.

Var. b. Mas: thorace rufo-testaceo immaculato; pedibus totis nigris.

Schönh. Synon. l. c. var. β.

Ver. c. Mas: thoracis disco pedibusque totis nigris.

Schönh. Synon. l. c. var. γ.

Habitat ad littora lacuum & fluviorum in fruticibus & gramine, apud nos rarius.

16. *C. liturata*: supra testacea, thorace postice litura angulata nigra, abdominis lateribus, anno pedibusque testaceis, femoribus nigro-lineatis.

Schönh. Synon. 2. 63. 9.

Var. b. Pedibus nigro-fuscis, genubus testaceis.

Schönh. Synon. l. c. var. β.

Var. c. Duplo minor & ultra.

Schönh. Synon. l. c. var. γ

Habitat in floribus & plantis frequens.

17. *C. clypeata*: supra pallida, vertice thoracisque macula discoidali antice angustata nigra, pedibus pallidis, posticis infuscatis.

Schönh.