

PERICULUM ENTOMOGRAPHICUM,  
SPECIES INSECTORUM

NONDUM DESCRIPTAS

PROPONENS,

---

QUOD

VENIA FACULT. PHILOS. ABOËNSIS AMPLISS.

PRÆSIDE

CAROLO REGINALDO SAHLBERG,

*Phil. & Med. Doct., Oecon. & Hist. Nat. Profess.  
Publ. & Ord., Collegii Imp. Med. Assess., Societ. Imp.  
Nat. Studios. Moscov. & Nat. Scrut. Lips. nec non  
Soc. Imp. Oecon. Fenn. Membro,*

PUBLICÆ CENSURÆ SUBMITTIT

PRO LAUREA

WILHELMUS FORSSMAN.

*Stipend. Publicus, Nylandus.*

In Auditorio Philos. die XIII Junii 1823.

h. p. m. s.

P. II.

PERICULUM ENTOMOGRAPHICUM

SPECIES INSECTORUM

NONNUM BRESORIATA

PROFONENS

Quo

VENIA FACULT. PHLOS. ABOGATA AMPLISS.

PRÆSIDIO

CAROLO REGINALDO SAHLBERG

Phil. et Med. Doct., Orator Publicus, Prof. Publi. et Ord. Collegii Imp. Med. Austriac. Societ. Imp. Med. Scientiar. Maxon. et Nat. Scientiar. Imp. et Civitatis Vindobon. Soc. Imp. Econ. Austriac. Membr. Honor. etc.

PROFESSORIS

PRO LAUREA

WILHELMUS FORSSMANN

In Auditorio Philos. die XIII Junii 1850  
propterea quod in hunc mundum natus est  
et eximie talibus rebus se occupavit  
et in hunc mundum natus est  
et eximie talibus rebus se occupavit  
et in hunc mundum natus est  
et eximie talibus rebus se occupavit

Thorax transversus, longitudine duplo fere latior, antice parum angustatus, late emarginatus, postice bisinuatus, angulis omnibus acutis, lateribus nonnihil rotundatus, anguste marginatus, supra niger, subnitidus, convexus, punctulatus, punctis versus latera crebrioribus confluentibus, linea in dorso lævi angusta, obsoleta; punctum in femina utrinque profunde impressum.

Scutellum minutum, breve, rotundatum, nigrum, subnitidum, subtilissime punctulatum.

Elytra thorace vix latiora, at fere triplo longiora, ante apicem rotundata subsinuato-angustata, supra nigra, nitida, modice convexa, anguste marginata, profunde punctato-striata, interstitiis planis subtilissime punctulatis.

Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum.

Pedes nigri, nitidi, punctulati; tarsi subtus flavo-pilosi.

Obs. An hæc eadem sit ac Ten. auriplantis *Hoffm.* dijudicare haud valemus.

## 11. HELOPS OPACUS.

H. Oblongus, niger, supra opacus, subtus nitidior, thorace sulco transverso ad basin leviter impresso, elytris punctato-striatis, punctis profundis.

Habitat in Brasilia. D. *Christofferson.*

H. Morioni affinis, sed differt thorace magis opaco, elytris minus profunde striatis, atque magnitudine minori. Longitudine 9 linearum. Tab. 1. f. 7.

Caput ovatum, atrum, opacum; frons punctis profundioribus quibusdam impressis; clypeus subtruncatus, impressione semicirculari a fronte distinctus, subtilissime punctulatus. Oculi laterales, transversi, parum prominuli, brunnei. Antennæ longitudine capitis cum thorace, sub angulo capitis ante oculos parum elevato insertæ, moniliformes, nigræ; Articulus 1:us apice incrassatus; 2:us brevissimus, nodosus, 3:us insequentibus duplo longior; 4:us - 10:us breves, compressiusculi, ad basin utrinque foveolati; ultimus ovatus.

Thorax longitudine paullo latior, antice parum angustatus, angulis nonnihil deflexis, lateribus parum rotundatus, tenue marginatus, basi subbisinuatus, supra niger, opacus, convexus, punctis in medio quibusdam tenue impressis, linea ad ipsam basin transversa elevata, atque ante illam sulco itidem transversim leviter impresso.

Scutellum minutum, apice rotundatum, nigrum, opacum, læve.

Elytra thorace quadruplo longiora & dimidio latiora, angulis humeralibus rotundatis, posterius sensim angustata, apice acuta, supra nigra, opaca, modice convexa, punctato-striata, striis leviter, punctis vero distinctius impressis, interstitiis lævibus.

Corpus subtus nigrum, nitidum, pectore lateribus punctato, striisque obsolete ad angulos posticos confluentibus; abdominis segmenta medio punctulata, ad latera rugosa.

Pedes nigri, nitidi, subtiliter punctulati, femoribus compressis, tibiis parum incurvatis, tarsis subtus ferrugineo-pilosis.



## 12. ALLECULA PICEA.

A. Ferrugineo-picea, creberrime punctulata, capite, antennis, apice femorum abdominisque fusconigris, elytris leviter punctato striatis.

Habitat in Sierra Leona. D. *Afzelius*.

A. fuscule magnitudine & habitu valde affinis, sed differt colore antennarum & striis elytrorum levius impressis. Lin.  $2\frac{1}{2}$  longa.

Caput porrectum, versus os angustatum, confertissime punctulatum, sulco inter antennis transverso profunde impresso, nigrum, summo margine clypei oreque rufo-piceis. Oculi laterales, magni, valde prominuli, nigri. Antennæ longitudinem corporis dimidiam æquantes, sub margine capitis ante oculos insertæ, filiformes, nigræ, articulo primo piceo, secundo brevissimo, tertio fere cylindrico, insequentibus compressiusculis, apice parum dilatatis, ultimo ovali-oblongo.

Thorax basi longitudine dimidio fere latior, antice angustior, subtruncatus, mox deinde angulis anticis & lateribus circulariter rotundato dilatatus, basi truncatus, angulis posticis rectis, supra parum convexus, confertissime punctulatus, ferrugineo-piceus, disco parum infuscato.

Scutellum minutum, rotundatum, rufo-piceum, subdepressum, tenue punctulatum.

Elytra thorace paullo latiora triploque longiora, posterius attenuata, apice rotundata, supra modice convexa, rufo-picea, subnitida, leviter punctato-striata, interstitiis creberrime punctulatis.

Corpus subtus rufo-piceum, nitidum, subtilissime punctulatum, segmentis abdominis tribus ultimis fusco-nigris.

Pedes elongati, rufo-picei, nitidi, punctulati, femoribus apice infuscatis, crassiusculis.

### 13. ALLEGULA LIVIDA.

A. Testaceo-livida, creberrime punctulata, pubescens, oculis approximatis nigris, antennis fuscis, basi testaceis, thorace brevi, elytris punctato-striatis.

Habitat in Sierra Leona. D. *Afzelius*.

Longitudine 2 linearum, præcedente, cui statura similis, paullo minor.

Caput porrectum, versus os angustatum, confertissime punctulatum, subpubescens, stria ante oculos impressa, transversa. Oculi magni, oblongoreniformes, valde prominuli in fronte approximati, nigri. Antennæ sub margine capitis elevato insertæ, dimidio corporis longiores, filiformes, pubescentes, fuscescentes; articulo primo apice incrassato, secundoque minutissimo, ferrugineo-testaceis, reliquis, præter basin tertii, fuscis.

Thorax brevis transversus, longitudine plus quam duplo latior, antice angustior, subtruncatus, angulis anticis lateribusque circulariter rotundato-dilatatus, basi subtruncatus, angulis posticis rectis, supra modice convexus, subtiliter punctulatus, pubescens, ferrugineo-testaceus.

Scutellum minutissimum, subtriangulare, testaceo-lividum, tenuissime punctulatum.

Elytra thorace vix latiora sed quadruplo & dimidio longiora, posterius angustata, apice subacuta, supra modice convexa, livido-testacea, pubescentia, punctato-striata, interstitiis crebre punctulatis.

Corpus subtus livido-testaceum, nitidum, punctulatum, subpubescens.

Pedes elongati, livido-testacei, aubnitidi, pubescentes; femoribus versus apicem superne rotundato-incrassatis.

14. *CYCLODERES CATARRHACTUS*. Schönherr.

*C. oblongo-ovatus*, æneo-fuscus, pilosus, cinereo-squamosus, thorace fusco, lineis duabus albidis, elytris macula postica nuda, ænea, albo-interrupta.

Habitat in Lusitania.

Curculioni *Robiniaë* habitu affinis, sed duplo fere major. 5 lineas longus. Tab. 2. f. 10.

Caput mediocre, subdeflexum, rugosum, nigrum, squamulis griseis sat crebris atque pilis longis erectis fuscis parcis obsitum. Oculi laterales, globosi, valde prominuli, nigri. Rostrum breve capiti contiguum, eoque paullo angustius, subhorizontale, crassiusculum, supra planum, rugosum, squamis griseis, pilisque parce adpersis obsitum, sulculo longitudinali abbreviato exaratum. Antennæ in apice rostri sitæ, fractæ, thoracis basin vix attingentes, nigræ, pilosæ, squamulis cinereis adpersæ; articulo primo (scapo) longissimo, 7 insequentes æquante, apice incrassato, 2:0 cæteris quoque longiore, obconico, 3:0 - - ; 8:0 minutis pilosis



globosis, ultimis quatuor clavam oblongo-ovatum, fuscam, opacam efficientibus. Canalicula antennalis infraocularis, obliqua.

Thorax capite brevior, antice posticeque truncatus, angustatus, vix capite latior, in medio, lateribus rotundatis, gibbosis, valde dilatatus, supra parum convexus, rugosus, niger, squamulis griseofuscis tectus, lineis duabus longitudinalibus albidosquamosis, pilis longis erectis rarioribus vestitus.

Scutellum nullum.

Elytra ovata, thorace quadruplo longiora & duplo fere latiora, basi angustiora, mox deinde humeris rotundatis dilatata, posterius iterum angustata, apice summo parum reflexo, supra valde convexa, punctato-striata, ænea, cinereo-squamosa, lineola humerali & macula prope apicem utrinque obliqua, puncto niveo-squamoso interrupta, denudatis, fusco-æneis, pilis longis cinereis fuscisque, parce sparsis, undique vestita.

Corpus subtus fusco-æneum, squamis fuscis cinereisque atque pilis erectis albidis parcioribus obsitum.

Pedes mediocres, nigro-ænei, squamis pilisque albidis vestiti, femoribus muticis.

### 15. ARTIPUS CORYCÆUS. *Schönherr.*

A. oblongus, densissime albedo-squamosus, ore oculisque nigris, fronte rostroque canaliculatis, thorace punctato, elytris punctato-striatis.

*Sitona corycæa.* *Dejean Catal. de col. pag. 94.*



Habitat in Insula Americæ, St. Barthelemy.  
D. *Forström*.

Habitu & magnitudine *Curc. canino* haud dissimilis. Longitudo 3 linearum.

Caput breve, dense albido-squamosum; frons depressa, punctulata, macula inter oculos parva fusco-nigra, a qua incipit sulcus tenuis sed profundus, ad apicem rostri continuatus. Oculi laterales, rotundati, nigri, parum prominuli. Rostrum brevissimum, subhorizontale, capiti contiguum, dense albido-squamosum, apice late bifurcatum, lacinis acutis interne ciliatis. Os nigrum. Antennæ fractæ, ad apicem rostri sitæ, capite cum thorace breviores, albido-squosæ; articulo primo longissimo, pone oculos extenso, apice crassiori; insequentibus brevibus, secundo tamen & imprimis tertio cæteris paullo longioribus; ultimis quatuor valde coarctatis, clavam oblongo-ovatum fuscam constituentibus. Canalicula antennalis infra oculos flexa.

Thorax æque longus ac latus, antice posticeque truncatus, lateribus subrectis cylindricus, dense albido-squamosus, punctis tenuiter & non crebre impressis; sulculus in medio dorsi, antice posticeque abbreviatus, valde obsoletus.

Scutellum minutissimum, punctiforme, rotundatum, dense albido-squamosum.

Elytra thorace dimidio latiora & plus quam triplo longiora, apice acuminata, supra convexa humeris prominulis, sutura apicis carinata, dense albido-squamosa, punctato-striata; in interstitiis setulæ quædam minutissimæ griseæ oculo armato conspiciuntur.

Corpus subtus squamis densis albidis undique obtectum.

Pedes mediocres, dense albido-squamosi; femoribus muticis, punctulatis, tibiis pilosis.

16. CHLOROPHANUS FALLAX. *Schönherr.*

C. oblongus, squamulis læte virescentibus tectus, vertice, thoracis medio elytrorumpue plaga suturali antica obscurioribus, mandibulis exsertis rufis, rostro carinulato, elytris apice submucronatis.

Habitat in Hungaria. D. *Megerle.*

Magnitudine & statura Curc. viridis. Longitudo  $4\frac{1}{2}$  linearum. Tab. 2 f. 9.

Caput mediocre, nigrum, squamulis viriditinentibus tectum, pubescens, vertice ob raritatem squamulorum obscuriori. Oculi laterales, ovati, parum prominuli, nigri. Rostrum subhorizontale, capiti contiguum, ejusque longitudine, sed paullo angustius, apice bifurcatum, laciniis subacutis interne ciliatis, squamulis viridibus obtectum, longius pubescens, supra depressum, carinula, in fronte incipiente & ad apicem usque decurrente, subnuda nigrescente elevata. Mandibulæ exsertæ, longitudine scapi antennarum, lanceolato-subulatæ, rufescentes. Antennæ prope ad apicem rostri sitæ, fractæ, crassiusculæ, thoracis medium attingentes, fuscæ, tenuiter virescenti-squamulosæ, pilosæ; articulo primo longitudine tres insequentes æquante, apicem versus sensim incrassato; 2:0 breviori, obconico; 3:0 angustiori, sequentibus quinque extrorsum paulatim crassioribus brevissimis, longiori; ulti-

ultimis quatuor coarctatis, clavam ovatam formantibus. Canalis antennarum brevior, deflexa.

Thorax rostro cum capite longior, antice angustior, truncatus, lateribus parum rotundatus, basi latior, bisinuatus, supra squamulis viridibus obtectus, in medio rarius squamosus obscurior, modice convexus, lineola in dorso, a basi ad medium usque extensa, obsolete elevata carinulatus.

Scutellum elongatum, triangulare, obscure viridi-squamosum, pubescens.

Elytra thorace dimidio latiora sed quadruplo fere longiora, cylindrica, apice acuminata, submucronata, modice convexa, humeris prominulis, striata, tenue pubescentia, squamulis viridi-nitentibus obtecta, plaga suturali a basi pone medium extensa obscuriori, sutura apicis albescenti-pilosa.

Corpus subtus squamis viridibus densissime vestitum.

Pedes mediocres, nigri, dense viridi-squamosi, pilosi, compressiusculi; femora mutica; tibiæ apice ferrugineæ; tarsi subtus ferrugineo-pilosi.


17. PHAOPS THUNBERGII. Schönherr.

P. oblongus, rufescens, densissime viridi-squamosus, superciliis, thoracis elytrorumque marginibus, lineisque duabus dorsalibus, horumque sutura argenteis, elytris punctato-striatis.

*Brachyrrhinus Thunbergii.* Billberg Enum. Ins. suz Collect.

Habitat in America.





Præcedenti magnitudine æqualis, 5 lineas longus. Tab. 2. f. 7.

Caput mediocre, squamulis viridi-nitentibus dense tectum, lineola supra oculos argenteo-squamosa; frons depressa, sulculo in medio abbreviato tenui impresso. Oculi laterales, ovato-subrotundi, parum prominuli, nigri. Rostrum capiti contiguum, subhorizontale, crassiusculum, capite vix longius, apice bifurcatum, laciniis acutis, interne ciliatis, squamulis viridi-nitentibus dense tectum, supra planiusculum, carinula longitudinali parum elevata, nuda, rufo-brunnea. Antennæ ad apicem rostri insertæ, fractæ, thoracis basin fere attingentes, rufescentes, griseo-pilosæ; articulus 1:us longissimus, basi subnudus, apice incrassatus, densius viridi-squamosus; 2:us & 3:us insequentibus longiores; 4:us - - 8:us brevissimi; quatuor ultimi coarctati, clavam oblongam efficientes. Canalicula antennalis infra oculos deflexa.

Thorax longitudine capitis cum rostro, antice subsinuato-truncatus, angustior, posterius sensim dilatatus, lateribus subrectis, basi bisinuatus, rufescens, squamulis viridi-nitentibus tectus, margine laterali utrinque lineisque duabus dorsalibus argenteo-squamosis, convexus, medio tenuissime subcanaliculatus, in interstitiis inter lineas laterales & dorsales argenteas profundius sed parce punctatus, antice rarius squamosus ut rubedo perluceat.

Scutellum minutum, subrotundum, planum, squamulis cinereo-albidis tectum.

Elytra thorace quadruplo longiora, basi ejusdem latitudine, mox vero ad humeros prominulos angulatim dilatata, thoraceque dimidio latiora, cy-

lindrica, postice angustata, apice subacuta, supra valde convexa, posterius magis gibbosa, punctato-striata, squamulis viridi-nitentibus vestita, sutura, interstitio inter strias secundam & tertiam latiori & parum elevato, lineaque laterali argenteo squamosis.

Corpus subtus rufescens, parcius viridi-squamosum, griseo-pilosum; segmento anali medio longitudinaliter subnudo.

Pedes mediocres, rufi; femora supra densissime, subtus parcius viridi-squamosa, subpilosa, crassiuscula, mutica; tibiæ hirsutæ, squamulis raris virescentibus adpersæ, anticæ antrorsum densius viridi-squamosæ, ad apicem incurvatæ; tarsi valde pilosi, supra parcius viridi-squamosi.

### 18. PHAOPS ALBUGO. *Schönherr.*

P. oblongus, niger, densissime niveo-squamosus, oculis nigris, capite thoraceque leviter canaliculatis, elytris lacunosis, ad basin supra thoracem parum protractis.

Habitat in Brasilia. D. *Kreuger.*

Præcedente paullo major,  $5\frac{1}{2}$  lineas longus. Tab. 2. f. 8.

Caput mediocre, nigrum, squamulis niveis densissime tectum, macula pone oculos utrinque parva subnuda, supra planiusculum, sulculo in fronte tenuiter impresso, ad apicem rostri continuato. Oculi laterales, ovato-subrotundi, parum prominuli, nigri. Rostrum capiti contiguum, eodemque vix longius, sed paullo angustius, crassiusculum, sub-

rectum, apice bifurcatum, laciniis acutis, margine interno ciliatis. Antennæ ad apicem rostri insertæ, fractæ, nigræ, tenuiter albido-squamosæ, pilosæ, thoracis basin vix attingentes; articulo primo longissimo, apicem versus incrassato; 2:0 & 3:0 insequentibus paullo longioribus; 4:0 - - 8:0 brevissimis obconicis; ultimis quatuor coarctatis, clavam oblongam formantibus. Canalis antennarum infra oculos incurvata.

Thorax antice truncatus, angustior, lateribus parum rotundatis sensim dilatatus, basi thorace duplo latior, bisinuatus, angulis posticis subacutis, supra convexus, squamulis niveis densissime tectus, canalicula vel lineola angusta, longitudinali, impressa, nuda, plagaque obsoleta, utrinque longitudinali rarius squamosa, obscuriore.

Scutellum minutum, rotundatum, planum, squamulis niveis dense tectum.

Elytra thorace quintuplo longiora, basi eodem vix latiora, sed mox ad humeros valde prominulos acutos dilatata, cylindrica, apice angustata, rotundata, ad basin lobulo supra thoracem nonnihil producta, antice parum convexa, posterius gibbosa, foveolis impressis lacunosa, squamis niveis densissime obiecta, punctis subtilissimis vel poris perforatis hinc inde sparsis, ad marginem vero summum in duas series dispositis, denudatis.

Corpus subtus nigrum, niveo-squamosum; segmentis posterioribus abdominis obscurioribus; segmento anali pilis griseis densius obsito.

Pedes mediocres, nigri, niveo-squamosi; femora mutica subpilosa; tibiæ longius pilosæ, antice



apice valde arcuatæ, intermediæ parum incurvatæ, posticæ rectæ.

19. *PLATYOMUS NODIPENNIS.* Schönherr.

*P. niger*, squamis supra ferrugineis, subtus virescentibus dense obtectus, thorace carinato, transversim sulcato, elytris punctato-striatis, tuberculis inæqualibus prominentibus, apice obtuse mucronatis.

Habitat in Brasilia. D. *Christoffersen*.

Longitudo 9 linearum. Tab. 2. f. 6.

Caput mediocre, nigrum, squamulis supra ferrugineis, subtus pallidioribus nonnihil virescentibus, densissime obtectum; frons plana, lineola inter oculos longitudinali impressa. Oculi laterales, globosi, valde prominuli, nigri. Rostrum capitis longitudine & latitudine, eidemque contiguum, subrectum, apice parum incrassatum, emarginato-sinuatum, squamulis ferrugineis, in apice paullo pallidioribus, dense vestitum, supra fovea magna longitudinaliter lateque excavatum, lateribus valde elevatis. Antennæ ad apicem rostri insertæ, thoracis basin attingentes, fractæ; articulus primus longissimus, incrassatus, recurvatus, niger ferrugineo-squamosus; 2:us brevis, obconico-nodosus, tresque insequentes cæteris longiores, versus apicem gradatim breviores, obconici, 6:us 7:us brevissimi, 8:us paullo crassior, omnes griseo-pilosi; ultimi quatuor coarctati, clavam oblongo-ovatum acuminatam nigram formantes.

Thorax antice truncatus, capite vix latior, posterius parum dilatatus, lateribus subrectis, basi bi-

sinuatus, supra densissime ferrugineo-squamosus, convexus, punctis profundioribus quibusdam impressis, inæqualis, dorso carinato margine antico, tuberculo laterali atque mox pone hoc carinula transversa adeo elevatis, ut transversim sed abrupte sulcatus appareat thorax.

Scutellum minutum, subtriangulare, immersum, foveolatum, pallido-squamosum.

Elytra thorace basi duplo latiora & quadruplo longiora, sensim angustata, apice singulatim obtuse & breviter mucronata, nigra, squamulis ferrugineis, hinc inde paullo pallidioribus densissime tecta, sutura ad medium fere pallide virescenti, profunde punctato-striata, antice modice convexa, humeris valde prominulis, acuminatis, deplanatis, postice magis gibbosa, tuberculo magno in medio elytri inter striam a sutura secundam tertiamque, obtuse acuminato, valde elevato, alteroque minori propius ad apicem & marginem exteriorem sito, atque ex incurso striarum 5:æ & 6:æ excavato; duo præterea tubercula obsoleta in parte anteriore nonnihil elevantur.

Corpus subtus nigrum, squamulis pallide virescentibus densissime tectum.

Pedes mutici, nigri, squamulis supra ferrugineis, subtus pallide virescentibus tecti, pilosi; tibiæ rectæ, posteriores apice dense ciliatæ.

20. PROMECOPS NUBIFER. *Schönherr.*

*P.* oblongus, niger, griseo & brunneo-squamosus, thorace profunde punctato, scutello albo,

elytris rufo-brunneis punctato-striatis, griseo & fusco-nebulosis, interstitiis una serie setosis.

Habitat in America meridionali.

Magnitudine & statura *Curc. fulvicornis*.  
Longitudine 2 linearum.

Caput mediocre, nigrum, squamulis brunneo-griseis tectum, canalicula inter oculos impressa, ad apicem rostri continuata. Oculi laterales, oblongo-ovati, oblique transversi, nigri, subimmersi. Rostrum capiti contiguum, brevissimum, subhorizontale, obscure griseo-squamosum, supra planiusculum, canaliculatum, apice late & profunde emarginatum. Canalicula antennalis infra oculos deflexa. Antennæ in apice rostri sitæ, thoracis basin haud attingentes, cinereo-squamosæ, clava ferrugineo-rufescente, fractæ; articulo 1:mo longissimo, versus apicem parum incrassato; 2:o insequentibus paullo majori; 3:o - 8:o minutissimis, extrorsum paullo crassioribus; ultimis quatuor clavam ovatam efficientibus.

Thorax capite cum rostro paullo longior, & dimidio latior, antice supra truncatus, pone oculos lobo antrorsum productus, lateribus in medio parum dilatatus, postice paullo angustior, niger, densissime griseo-squamosus fusco-umbratus, punctis sparsis profunde impressis.

Scutellum minutum, rotundatum, squamulis albidis tectum.

Elytra thorace dimidio latiora, & plus quam triplo longiora, basi truncata, humeris prominulis, apice acuta, supra convexa, punctato-striata, inter-



stitiis setosis, setulis albidis vel fuscis una serie dispositis, rufo-brunnea, squamulis densis griseis fuscisque nebulosa, macula in medio dorsi magna fusca.

Corpus subtus nigrum, squamulis cinereis sat crebre tectum, parcius pilosum.

Pedes mediocres, nigri, pilosi; femora ad basin squamulis cinereis, versus apicem fuscis densius tecta; tibiæ fusco-squamosæ, apice unco armatæ.

21. *ALOCORHINUS COMPRIMATUS.* Schönherr.

A. oblongus, niger, rostro 4 sulcato, thorace coriaceo, elytris ad apicem compresso-carinatis, punctato-striatis, dorso transversim sulcato.

*Polydrusus barbipennis.* Dejean. Catal. d. Col. p. 93.

Habitat in Brasilia.

Longitudine 8 linearum.

Caput mediocre, nigrum, vertex subtilissime punctulatus; frons deflexa, rugis longitudinalibus, sulculoque in medio profundiori abbreviato impressis. Oculi laterales, rotundati, haud prominuli, nigri. Rostrum capite longius, crassiusculum, deflexum, apice emarginatum, nigrum, subpilosum, quadrisulcatum, sulcis intermediis dorsalibus latioribus rectis, carinula acute elevata distinctis, exterioribus vero obliquis, a basi antennarum ad angulum oculi juxta latera rostri exsurgentibus, angustioribus, medio dilatatis. Antennæ ad apicem rostri