

SVT VI : B 108

041	kieli	finsweeng
245	nimeke	Kuolemansyyt vuosina 1946-1950
246	rinnakkaisn. swe	Dödsorsaker åren 1946-1950
246	rinnakkaisn. eng	Causes of death in Finland for the years 1946-50
248	osan tiedot	Teksti
248	osan tiedot swe	Text
248	osan tiedot eng	Text
260	julkaisija	Helsinki : [Tilastollinen päätoimisto], 1954
440	sarja fin	Suomen virallinen tilasto 6 : B 108
500	ylänimeke	Väestötilastoa
598	huom.	svt
650	svt aihealue	Väestö - Befolkning - Population
650	tietovuosi	1946-1950
651	alue	Suomi - Finland

Jyväskylä 1955

Helsingfors 1955

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO—FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK

VI

VÄESTÖTILASTOA

B

KUOLEMANSYYT

108

VUOSINA 1946—1950

TEKSTI

VI

BEFOLKNINGSSTATISTIK

B

DÖDSORSAKER

108

ÅREN 1946—1950

TEXT

CAUSES OF DEATH IN FINLAND

FOR THE YEARS 1946—50

TEXT

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO — FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK

VI

VÄESTÖTILASTOA
B
KUOLEMANSYYT

108

VUOSINA 1946—1950

TEKSTI

VI

BEFOLKNINGSSTATISTIK
B
DÖDSORSAKER

108

ÅREN 1946—1950

TEXT

*CAUSES OF DEATH IN FINLAND
FOR THE YEARS 1946—50*

TEXT



15886

HELSINKI 1954

Alkusanat

Tämä erillinen selostus kuolemansyistä maassamme viisivuotiskautena 1946—50 perustuu taululiitteisiin, jotka on julkaistu virallisen tilaston VI : B sarjassa n:o 103—106. Tekstikatsauksen jälkeen julkaistusta taululiitteestä n:o 1 selviää vält vuosina 1946—50 keskimäärin sattuneet kuolemantapaukset kuolemansyyyn sekä iän ja sukupuolen mukaan keskiväkiluvun 100 000:ta henkeä kohden ja taululiitteestä n:o 2 kuolemansyyt elinkeinohaarana mukaan samoina vuosina.

Tekstiesityksen on laatinut vt. yliaktuaari K. H. K a h a n p ä ä.

Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesäkuussa 1954.

Förord

Denna separata redogörelse för dödsorsakerna i vårt land under femårsperioden 1946—50 grundar sig på de tabellbilagor, som ha publicerats i serien VI : B av den officiella statistiken under nr:s 103—106. Av tabellbilaga n:o 1, efter textöversikten, framgår inträffade dödsfall enligt dödsorsak samt ålder och kön per 100 000 personer av medelfolkmängden, i medeltal åren 1946—50 och av tabellbilaga n:o 2 dödsorsakerna enligt näringssgren under samma år.

Textöversikten har utarbetats av t. f. överaktuarie K. H. K a h a n p ä ä.

Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i juni 1954.

Valter Lindberg

A. Tunkelo

SISÄLLYS	Sivu	INNEHÅLL	Sid.
1. Kuolemantapausten luku	6	1. Antalet dödsfall	6
2. Kuolintodistukset ja -ilmoitukset ja niiden perusta	7	2. Dödsattesterna och dödsanmälningarna samt grunderna för deras uppgörande	7
3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja tuntematon kuolemansyy	11	3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlitlighet och nog- grannhet. Sannolik och obekant dödsorsak	11
4. Kuolemansyyt	12	4. Dödsorsakerna	12
5. Pienten lasten kuolemansyyt	21	5. Dödsorsaker bland spädbarn	21
Taululiitteitä	25	Tabellbilagor	25

CONTENTS

	Page
1. <i>Number of deaths</i>	6
2. <i>Basis of death certificates and of statements of death</i>	7
3. <i>Reliability and exactitude of the stated causes of death.</i> <i>Supposed and unknown cause of death</i>	11
4. <i>Causes of death</i>	12
5. <i>Infant deaths by causes of death</i>	21
Tables	25

1. Kuolemantapausten luku.

Seuraavassa tekstiesityksessä selostetaan vuosien 1946—50 aikana tapahtunutta kuolleisuutta ilman kuolemansyynimikettä n:o 8950 »sodassa kuolleet». Viime mainittuja kuolemantapaauksia käsitellään muuhun tekstiin liittyen erikseen sopivissa kohdin.

Seuraavasta asetelmasta selviää siviilikuolemantapausten luku vv. 1946—50.

Vuosi År Year	1946	1947	1948	1949	1950
	24 735	25 073	23 621	23 278	21 629
	20 663	21 614	20 744	21 892	19 899
	45 398	46 687	44 365	45 170	41 528

Kuolemansyynimikkeeseen n:o 8950 »sodassa kuolleet» kuului v. 1946 30 tapausta, v. 1947 19 tapausta, v. 1948 8 tapausta, v. 1949 13 tapausta ja v. 1950 5 tapausta (siitä 1 nainen).

Tämän tekstin ulkopuolelle jäävät tuomioistuimien kuolleiksi julistamat siviilihenkilöt. Heidän lukumääränsä vv. 1946—50 ilmenee seuraavasta asetelmasta.

1. Antalet dödsfall.

I följande textöversikt redogörs för dödligheten åren 1946—50 med undantag av dödsorsaken n:o 8950, »döda i krig», som endast i några sammanhang i förbigående beröres i anslutning till den övriga texten.

Av följande sammanställning framgår antalet civila dödsfall åren 1946—50.

Miespuolisla Mankön Male	Naispuolisla Kvinnkön Female	Mol. sukup. Bägge könen Both sexes
24 735	20 663	45 398
25 073	21 614	46 687
23 621	20 744	44 365
23 278	21 892	45 170
21 629	19 899	41 528

Dödsorsaksgruppen n:o 8950 »döda i krig» omfattade år 1946 30 fall, år 1947 19 fall, år 1948 8 fall, år 1949 13 fall och år 1950 5 fall (därav 1 kvinna).

Inom ramen för denna översikt behandlas icke civilpersoner, som dödförklarats av domstol. Deras antal åren 1946—50 framgår av följande sammanställning.

Civilians declared dead.

Vuosi År Year	1946	1947	1948	1949	1950
	202	281	276	285	397
	80	122	160	119	131
	282	403	436	404	528

Edellisessä vuosien 1941—45 kuolleisuutta käsittelevässä tekstiesityksessä (S. V. T. VI B : 102) julkaistiin siv. 6 ennakkolujuja sodassa kadonneina kuolleiksi julistetuista ryhmiteltyinä sen vuoden mukaan, jona heidät oli julistettu kuolleiksi. Seuraavassa asetelmassa esitetään Tilastollisen päätoimiston saamien tietojen mukaisesti lukuja vuoteen 1951 mennessä sodassa kadonneina kuolleiksi julistetuista katoamisvuoden mukaan.

I föregående textöversikt, som berörde dödligheten åren 1941—45 (F. O. S. VI B: 102) publicerades på sid. 6 preliminära siffror om i kriget försvarna dödförklarade personer grupperade efter det år, då de dödförklarades. I följande sammanställning presenteras på basen av uppgifter som Statistiska centralbyrån erhållit siffror över i kriget försvarna t. o. m. år 1951 dödförklarade personer efter det år då de försprungit.

Military persons reported missing and declared dead.

Vuosi — År Year of disappearance	1941	1942	1943	1944	1945	Miehiä Män Male	Naisia Kvinnor Female	Yhteensä Inalles Total
	483	—	—	2 514	8	483	—	1) 483
	174	—	—	—	—	174	—	174
	86	—	—	—	—	86	—	87
	2 514	—	—	—	—	2 514	—	2 514
	8	—	—	—	—	8	—	8

¹⁾ Tähän lukuun sisältyy vuosina 1939 ja 1940 sodassa kadonneista 119 henkilöä. — ¹⁾ I denna siffra ingår 119 personer av de under åren 1939 och 1940 i krig försprungna. — ¹⁾ Including 119 persons reported missing in the years 1939 and 1940.

Seuraavasta asetelmasta käyväät selville siviilikuolleisuuden vaihtelut viime vuosikymmeninä laskettuna maassa-asuvan väestön tuhatta henkeä kohden. Luvuista ilmenee kuolleisuus maassa-asuvan väestön 1 000 henkeä kohden. Tämän asetelman lukuihin eivät sisälly kuolleiksi julistetut siviilihenkilöt, jotka katsotaan kuluvalksi poissaolevaan väestöön. Sen sijaan sisältyvät tähän asetelmaan samoin kuin muihin tämän julkaisun asetelmiin ja tauluihin — kuten edellisenäkin viisivuotiskautena — myös kuolemantapaukset, jotka sattuivat vakinaisesti ulkomailta asuvien ja siis poissaolevan väestöön kuuluvien henkilöiden keskuudessa.

Deaths per 1 000 mean population (present-in-area).

	1936—40	1941—45 ¹⁾	1946—50	1946	1947	1948	1949	1950
Miespuol. — Mankön — <i>Male</i>	14.2	14.4	12.7	13.6	13.6	12.7	12.3	11.3
Naispuol. — Kvinnkön — <i>Female</i>	12.6	11.7	10.3	10.4	10.7	10.1	10.6	9.5
Mol. sukup. — Bägge könen — <i>Both sexes</i>	13.4	13.0	11.4	11.9	12.1	11.3	11.4	10.4
Kaupungit — Städer — <i>Towns</i>	11.6	12.0	11.0	11.1	11.5	11.0	10.9	10.0
Maaseutu — Landsbygd — <i>Market towns and rural districts</i>	14.0	13.3	11.6	12.2	12.3	11.5	11.6	10.5

¹⁾ Korjattuja lukuja. — ²⁾ Korrigrade tal. — ³⁾ Corrected figures.

Ylläolevista lukusarjoista kuvastuu kuolleisuuden yleinen aleneva suunta ja samalla sen voimakas laskusodan jälkeen. Sota-aika merkitsi miesten koko kuolleisuuden nousua ja myös miesten siviilikuolleisuuden alenemisessä pysähtymistä. Naisten kuolleisuuden aleneva suunta sen sijaan jatkui koko asetelmassa esiintyväniä aikana melkein pysähdyksittä.

Jos kuolemansyyryhmä 8950 »sodassa kuolleet» otetaan huomioon, niin ei tämä muuta koko kuolleisuutta 1 000 henkeä kohti vv. 1946—50. Ainoastaan v. 1946 promilleluku miesten osalta nousee 13.6:sta 13.7:ään.

2. Kuolintodistukset ja -ilmoitukset ja niiden perusta.

Kuolemantapauksesta on annettu joko lääkärin laatima *kuolintodistus* tai, jos sellaista ei ole saatavissa, papiston tai siviilirekisteriviranomaisten laatima *kuolinilmoitus*.

Kuolintodistukset on yleensä laadittu joko sairaala- tai lääkärinhoidon tai ruumiinnavauksen perusteella, kuolinilmoitusten perustuessa pääasiallisesti omaisten kertomukseen kuoleman aiheuttaneen taudin oireista ja kulusta. Samalla on kuitenkin mainittava, että varsin huomattava osa kuolintodistuksista on laadittu omaisten kertomusten perusteella, kun taas toisaalta kuolintodistusta ei ole voitu saada aivan kaikissa niissä tapauksissa, joissa on turvauduttu lääkärinapuun, joten pieni osa kuolinilmoituksia on itse asiassa laadittu sairaala- tai lääkärinhoidon perusteella.

Kuolintodistusten ja -ilmoitusten lukumäärä vuosina 1938 ja 1946—50 ilmenee seuraavasta asetelmasta.

Av följande sammanställning framgår den civila dödligetens variationer under de senaste årtiondena. Siffrorna ange antalet dödsfall på 1 000 personer av den i riket bosatta befolkningen. I sammanställningen ingå icke dödförklarade civilpersoner, vilka anses tillhöra den frånvarande befolkningen. Däremot omfattar sammanställningen i likhet med övriga sammanställningar och tabeller i denna publikation — såsom också under föregående femårsperiod — även de dödsfall, som inträffat bland stadigvarande i utlandet bosatta personer, alltså bland personer, som tillhör den frånvarande befolkningen.

Death certificates and statements of death.

	1938	1946	1947	1948	1949	1950
Kuolintodistuksia — Dödsattester — <i>Death certificates</i> . . .	44 390	42 241	43 938	41 942	43 105	39 517
Kuolinilm. — Dödsanmälningar — <i>Statements of death</i> . . .	3 189	3 157	2 749	2 423	2 065	2 011
Yhteensä — Summa — <i>Total</i>	47 579	45 398	46 687	44 365	45 170	41 528

Dödsattesternas andel av alla rapporter om dödsfall upptäckade en stigande tendens redan före kriget och var år 1938 93.3 %. Denna utveckling avbröts dock av de exceptionella förhållandena under krigstiden;

Kuolintodistusten osuus kaikista kuolemantapauksista oli nousussa jo ennen sotia, ollen vuonna 1938 93.3 %. Sota-ajan pojkeksellisissä oloissa tämä kehitys kuitenkin katkesi, alimillaan k. o. suhdeluku oli

1. Distribution by place of death and by

Länni — Län — County	Kuolleet — Döda — Deaths 1946				Kuolleet — Döda — Deaths 1947			
	kotipaikka-kunnalla inom hemorten at domicile	vieraalla paikka-kunnalla utom hemorten outside domicile	ulkomailla utomlands abroad	yhteensä summa total	kotipaikka-kunnalla inom hemorten at domicile	vieraalla paikka-kunnalla utom hemorten outside domicile	ulkomailla utomlands abroad	yhteensä summa total
	5 291	1 439	89	6 819	5 652	1 439	109	7 200
Uudenmaan — Nylands	5 291	1 439	89	6 819	5 652	1 439	109	7 200
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	4 826	1 356	109	6 291	5 180	1 331	101	6 612
Ahvenanmaa — Åland	190	64	24	278	199	97	15	311
Hämeen — Tavastehus	3 730	1 261	23	5 014	4 012	1 284	21	5 317
Kymen — Kymmenen	1 795	981	12	2 788	1 907	990	24	2 921
Mikkelin — S:t Michels	2 127	497	7	2 631	2 111	589	3	2 703
Kuopion — Kuopio	4 124	1 053	24	5 201	4 124	1 047	23	5 194
Vaasan — Vasa	5 290	1 268	362	6 920	5 299	1 279	351	6 929
Oulun — Uleåborgs	2 961	905	144	4 010	2 975	955	122	4 052
Lapin — Lapplands	1 093	469	74	1 636	1 227	494	44	1 765
Luovutetut alueet — Avträddna områden	—	3 776	34	3 810	—	3 663	20	3 683
Koko maa — Hela riket — Total	31 427	13 069	902	45 398	32 686	13 168	833	46 687
Kaupungit — Städer — Towns	8 037	2 295	171	10 503	8 705	2 221	188	11 114
Maaseutu — Landsbygd — ¹⁾	23 390	10 774	731	34 895	23 981	10 947	645	35 573

¹⁾ Market towns and rural districts.

vuosina 1942 (87.4) ja 1944 (87.7). Sodan jälkeen tapahtui paluu normaaliihin suhteeseen; vuonna 1945 oli prosenttiluku 90.7 ja vuonna 1946 93.0. Kuolinilmoituksille jäävä osuuus väheni sitten — lukuunottamatta vähäistä nousua vuonna 1950 — jatkuvasti: vuonna 1947 laadittiin siten kuolinilmoituksset 5.9 %:sta, vuonna 1948 5.5 %:sta, vuonna 1949 4.6 %:sta ja vuonna 1950 4.8 %:sta kuolintapauksia.

Taulusta n:o 1 selviäävät kuolemantapaukset ryhmiteltyinä kuolipaikan mukaan. Suurin osa luovutetuji alueiden rekistereihin merkityn väestön kuolemantapauksista tulevat sarakeeseen »vieraalla paikkakunnalla», koska siirtoväki ennen vuotta 1950 oli yleensä vielä kirjoilla entisissä seurakunnissaan. Viimemainituna vuonna siirtoväki oli melkein kokonaan muuttanut kirjansa luovutettujen alueiden rekistereistä, jotien sen keskuudessa sattuneet kuolemantapaukset hajautuivat eri läänien osalle tämän väestön nykyisten asuinpaikkojen mukaan.

Taulusta n:o 2 käy lääneittäin ja koko maan osalta selville, mihin kuolintodistukset ja -ilmoituksset perustuvat. Tähän tauluun samoin kuin tauluun n:o 3 sisältyvät myös sodan aiheuttamat kuolemantapaukset, koska niitä ei näissä tauluissa ole voitu saada erilleen. Ryhmittely on suoritettu ensi sijassa kuolemansyiden luottavuutta silmällä pitäen. Sen vuoksi ryhmä »sairaalahoito» käsittää paitisi sairaaloissa kuolleet, myös välittömästi ennen kuolemaa sairaalahoitoa saaneet. Ryhmä »lääkärinhoito» käsittää sellaiset tapaukset, joissa lääkäri on todennut kuoleman aiheuttaneen tauzin riippumatta siitä, onko asianomainen saanut lääkärinhoitoa vai ei. Ryhmä »ruumiinavaus» käsittää etupäässä sellaiset tapaukset, joissa ei ole turvauduttu ennakkohoitoon; joku osti tästä ryhmästä on kuitenkin sairaala- tai lääkärinhoitoa saaneita.

Sodan jälkeen lääkärinhoiton osuuus — kuten luonollista on — nousi, niin että se viisivuotiskauden 1946–50 lopulla oli jälleen päässyt ennen sotia vallinneeseen tasoon. Sairaalahoidon osuuus, joka sota-ajan lopulla oli osoittanut lievää laskua, nousi myös, mutta hitaasti, päätyen kuitenkin vuoden 1938 tasoa huomattavasti.

lägstd var ifrågavarande relationstal åren 1942 (87.4) och 1944 (87.7). Efter kriget skedde en återgång till det normala: år 1945 var procenttalet 90.7 och år 1946 93.0. Dödsanmälningarnas andel minskades sedan — med undantag av en obetydlig stegring år 1950 — fortgående; år 1947 uppgjordes dödsanmälaning sålunda i 5.9 %, år 1948 i 5.5 %, år 1949 i 4.6 % och år 1950 i 4.8 % av dödsfallen.

Tabell nr 1 utvisar dödsfallen grupperade efter dödsort. Största delen av dödsfallen bland den befolkningen som var bokförda i de avträdda områdenas register kommer i kolumnen »utom hemorten», emedan den förflyttade befolkningen före år 1950 i allmänhet ännu var kyrkskriven i sina gamla församlingar. Sistnämnda är hade den förflyttade befolkningen nästan helt och hållt utflyttat från de avträdda områdenas register, varför dödsfallen bland de förflyttade det året spridde sig över de olika länen efter ifrågavarande befolkningens nuvarande registreringssorter.

Av tabell nr 2 framgår varpå dödsattesterna och -anmälningarna grundat sig. I denna tabell samt i tabell nr 3 ingå även de dödsfall, som förorsakats av kriget, emedan de i dessa tabeller icke kunnat särskiljas från övriga dödsfall. Grupperingen har i främsta rummet skett med hänsyn till dödsorsakernas tillförlitlighet. Därfor omfattar gruppen »sjukhusvård» utom döda på sjukhus även personer, som omedelbart före sin död erhållit sjukhusvård. Gruppen »läkarvård» omfattar sådana fall, då en läkare fastställt den sjukdom som lett till döden, vare sig sjukdomen föranlett läkarvård eller icke. Gruppen »obduktion» omfattar främst sådana fall, som icke tidigare blivit föremål för vård; en del av gruppen utgöres dock av fall, som erhållit sjukhus- eller läkarvård.

Efter kriget ökades läkarvårdens andel — som naturligt är — så att den vid slutet av femårsperioden 1946–50 åter hade uppnått förkrigsnivån. Sjukhusvårdens andel, som vid slutet av krigstiden hade uppvisat en svag nedgång, ökades även, men långsamt, och stannade vid en nivå, som dock låg betydligt över nivån för år

county in the years 1946–50.

Länni — Län — County	Kuolleet — Döda — Deaths 1948				Kuolleet — Döda — Deaths 1949				Kuolleet — Döda — Deaths 1950			
	kotipaikka-kunnalla inom hemorten at domicile	vieraalla paikka-kunnalla utom hemorten outside domicile	ulkomailla utomlands abroad	yhteensä summa total	kotipaikka-kunnalla inom hemorten at domicile	vieraalla paikka-kunnalla utom hemorten outside domicile	ulkomailla utomlands abroad	yhteensä summa total	kotipaikka-kunnalla inom hemorten at domicile	vieraalla paikka-kunnalla utom hemorten outside domicile	ulkomailla utomlands abroad	yhteensä summa total
	5 419	1 403	101	6 923	5 385	1 329	85	6 799	5 355	1 189	125	6 669
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	4 823	1 368	127	6 318	5 102	1 318	100	6 520	4 912	1 312	120	6 344
Ahvenanmaa — Åland	153	76	21	250	182	79	16	277	158	82	10	250
Hämeen — Tavastehus	3 883	1 191	36	5 110	4 061	1 240	30	5 331	4 240	1 146	37	5 423
Kymen — Kymmenen	1 825	970	18	2 813	2 362	933	21	3 316	2 415	747	39	3 201
Mikkelin — S:t Michels	2 095	553	12	2 660	2 182	492	8	2 682	2 117	541	13	2 671
Kuopion — Kuopio	4 039	869	26	4 934	4 029	917	28	4 974	4 176	888	34	5 098
Vaasan — Vasa	4 944	1 111	326	6 381	5 247	1 166	355	6 768	4 953	1 086	387	6 426
Oulun — Uleåborgs	2 964	879	154	3 997	2 984	746	114	3 844	2 836	800	156	3 792
Lapin — Lapplands	1 329	399	13	1 741	1 422	358	24	1 804	1 229	284	32	1 545
Luovutetut alueet — Avträddna områden	—	3 225	13	3 238	—	2 839	16	2 855	—	84	25	109
Koko maa — Hela riket — Total	31 474	12 044	847	44 365	32 956	11 417	797	45 170	32 391	8 159	978	41 528
Kaupungit — Städer — Towns	8 398	2 167	216	10 781	8 703	2 011	177	10 891	8 675	1 369	250	10 294
Maaseutu — Landsbygd — ¹⁾	23 076	9 877	631	33 584	24 253	9 406	620	34 279	23 716	6 790	728	31 234

2. Basis of death certificates and of statements of death.

||
||
||

3. Basis of death certificates

N:o ¹⁾	Kuolemansyy ¹⁾ — Dödsorsak ¹⁾ Cause of death ¹⁾	1946—50			
		Ruumihavaus Obduction Autopsy	Sairaalahoito Sjukhusvård Hospital	Lääkärinholtto Läkarvård Medical attendance	Lääkärihoidon tukinuus undersök- ning av den döda Examination of body by physician
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum	822	6 169	1 262	90
II	Morbi senectutis	35	6 573	6 496	107
III	Morbi infectionis	1 179	19 495	14 317	166
1000	Typhus abdominalis	8	221	19	1
1010	Paratyphus	5	237	35	—
1060	Variola	—	—	—	—
1080	Morbilli	4	40	63	1
1090	Scarlatina	3	44	7	—
1100	Pertussis	10	154	301	5
1110	Diphtheria	21	716	125	9
1125	Influenza	4	269	443	8
1150	Gastroenteritis acuta	428	2 253	930	59
1210	Erysipelas	2	98	30	—
1215, 1220	Angina septica. Septicaemia. Pyaemia	140	856	220	7
1230	Poliomyelitis anterior acuta	9	114	38	1
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	7	116	46	1
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	53	194	45	3
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	210	10 646	10 291	55
1410—1480	Alli morbi tuberculosis	180	2 471	1 179	6
1520—1530	Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma inguinale	61	275	92	2
	Alli morbi infectionis	36	796	453	8
IV	Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae	132	906	497	7
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	88	784	435	13
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	604	7 985	8 057	234
VII	Morbi organorum circulationis	1 455	13 833	21 997	1 670
VIII	Morbi organorum respirationis	871	5 345	4 941	77
IX	Morbi organorum digestioonis	506	3 863	984	36
X	Morbi organorum uropoëticorum	204	1 758	951	3
XI	Morbi organorum genitalium	30	526	278	—
XII	Morbi gravidarum et puerperarum	141	689	98	8
XIII	Morbi ossium et articulorum	11	263	237	1
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei	11	30	8	—
XV	Tumores	725	8 511	13 664	49
XVI	Intoxications chronicae	16	29	17	20
XVII	Mors violenta, non naturalis ²⁾	3 314	3 142	1 437	3 065
A	Casus mortiferi	1 811	2 773	1 197	2 045
B	Suicidium	821	328	231	975
C	Homicidium ²⁾	682	41	9	45
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	60	195	134	165
	Yhteensä — Summa — Total	10 204	80 096	75 810	5 711

¹⁾ Vuoden 1935 suomalaisen kuolemansyynimistön mukaan. Kuolemansyiden suomenkieliset nimitykset ovat julkaisussa S. V. T. VI B: 103 F. O. S. VI B: 103 i tabellbilaga 1.

¹⁾ According to the Finnish list of causes of death, approved in the year 1935. — ²⁾ Including deaths from injuries resulting from operations of war

vasti korkeammalle. Ennen sotia sairaalahoidon osuus jää lääkärinhoidon osuutta huomattavasti pienemmäksi. Vuosina 1946—50 sairaalahoidon osuus koko maassa oli jonkin verran suurempi kuin lääkärinhoidon osuus. Eri läänien osalta kuitenkin on huomattavia eroja havaittavissa sairaalahoidon ja lääkärinhoidon välisessä suhteessa.

Taulusta n:o 3 selviää, miten paljon eri kuolemansyihin kuolleista on saanut sairaala- tai lääkärinhoitoa ennen kuolemaansa ja miten paljon on kuollut saamatta asiantuntevaa hoitoa. Eri sarakkeessa on mainittuna niiden tapausten luku, joissa lääkäri on ilmoittanut kuolemansyn otaksuttavaksi, sekä vastaava osuus kustakin kuolemansyvryhmästä (vrt. seur. lukua).

Taulusta käy selville, että sairaala- ja lääkärinhoitoon on turvauduttu enimmän eräissä tartuntataudeissa,

1938. Före kriget var sjukhusvårdens andel betydligt mindre än läkarvårdens. Åren 1946–50 var sjukhusvårdens andel i hela landet något större än läkarvårdens. De olika länen uppvisa dock betydande differenser i fråga om fördelningen på sjukhusvård och läkarvård.

Tabell nr 3 visar, huru många av de på grund av olika dödsorsaker avlidna som erhållit sjukhus- eller läkarvård före sin död och huru många som avlidit utan att ha erhållit sådan. I en skild kolumn har upptagits antalet fall, i vilka läkaren har anmält dödsorsaken vara sannolik, samt motsvarande andel för varje dödsorsaksgrupp (imf. följande kapitel).

Av tabellen framgår, att sjukhus- eller läkarvård vanligen har anlitats vid vissa infektionssjukdomar, köns-

and of statements of death.

^{taululiitteessä 1. — 1)} Enligt den finska dödsorsaksnomenkaturen av år 1935. Dödsorsakernas benämningar på svenska återfinnas i publikationen

(number 8950 of the Finnish list of causes of death, 1935).

sukupuolielinten taudeissa, virtsaelinten taudeissa, kasvaimissa, vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuotataudeissa sekä aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudeissa. Seuraavina järjestyksessä ovat ruoansulatuselinten taudit, raskaustilan- ja synnytystaudit sekä luuiston ja nivelen taudit.

3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja tuntematon kuolemansyy.

Kuolemansyytilaston luotettavuus (vrt. taulua n:o 3) riippuu ratkaisevasti siitä, missä määrin ilmoitetut kuolemansyyt perustuvat lääkärien havaintoihin. Luotettavimmat ovat ne tapaukset, joissa lääkäri on itse todennut kuolemansyyyn joko ennen kuolemaa tapahtu-

sjukdomar, urinorganens sjukdomar, svulster, de blodbildande organens och blodets sjukdomar och blödningssjukdomar samt ämnesomsättningssjukdomar och den inre sekretionens sjukdomar. Därefter följa matsmältningsorganens sjukdomar, havandeskaps- och förlössningssjukdomar samt bensystemets och ledgångarnas sjukdomar.

3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlitlighet och noggrannhet. Sannolik och obekant dödsorsak.

Dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet (jmf. tabell nr 3) beror i avgörande grad på i vilken utsträckning de uppgivna dödsorsakerna grunda sig på läkares iakttagelser och utlåtanden. Mest tillförlitliga äro de fall, då en läkare själv konstaterat dödsorsaken, antingen

neen hoijon ja tutkimuksen tai kuoleman jälkeen ruumiinavauksen perusteella. Lääkärin suorittama kuoleen tutkimus, joka useimmissa tapauksissa merkitsee »nähnyt ruumiin», on rinnastettava lähinnä omaisten tai muiden kertomukseen perustuvia tapauksiin; poikkeuksena ovat tapaturman aiheuttamat kuolemantapaukset.

Lääkärin toteamat kuolemansyyt (kuolintodistusten ja -ilmoitusten peruste: ruumiinavaus, sairaalahoito tai lääkärinhoito) muodostivat vuosina 1946—50 keskimäärin 74.5 % mainittuina vuosina ilmoitetuista kuolemantapauksista, siis melkein $\frac{3}{4}$ kaikista; edellisenä viisivuotiskautena — sodan oloissa — oli vastaava prosenttiluku ollut 68.9 (vuonna 1938 67.9 %). Niiden tapausten luku, joissa läänin- ja kaupunginlääkärit olivat merkinneet kuolemansyyyn otaksuttavaksi, väheni vuosina 1946—50 1.0 prosenttiin oltuaan edellisenä viisivuotiskautena 1.9 prosenttia ja vuonna 1938 2.4 prosenttia kaikista kuolemantapauksista. Kokonaan tuntemattomaksi jäi kuolemansyy vuosina 1946—50 — kuiten edellisenäkin viisivuotiskautena — keskimäärin 1.3 %:ssa tapauksista (vuonna 1938 1.6 %).

4. Kuolemansyyt.

Yksityiskohtaiset tiedot vuosien 1946—50 kuolleisuudesta on esitetty eri julkaisussa (S. V. T. VI B : 103—106). Yleiskatsauksena esitetään seuraavassa taulussa n:o 4 kuolleet kuolemansyyryhmitäin prosentteina kaikista kuolleista ja suhteessa keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.

genom att han vårdat och undersökt patienten före dödsfallet eller på grund av efter dödsfallet verkställd obduktion. Av läkare verkställd undersökning av den döda, som vanligen endast innebär att han sett liket, bör närmast jämnställas med de fall som stöda sig på de anhörigas eller andras beskrivning; undantag utgöra dödsfall till följd av olyckshändelse.

De av läkare konstaterade dödsorsakerna (dödsattesten eller dödsanmälan) grundar sig på obduktion, sjukhusvård eller läkarvård) utgjorde åren 1946—50 i medeltal 74.5 % av de under dessa år anmälda dödsfallen, således nästan $\frac{3}{4}$ av alla fall; under föregående femårsperiod — under krigsförhållandet — var motsvarande procenttal 68.9 (år 1938 67.9 %). Antalet fall, i vilka läns- och stadsläkarna hade antecknat dödsorsaken såsom sannolik, minskades åren 1946—50 till 1.0 % av alla dödsfall mot 1.9 % under föregående femårsperiod och 2.4 % år 1938. Dödsorsaken förblev h. o. h. obekant åren 1946—50 — såsom även under föregående femårsperiod — i medeltal i 1.3 % av fallen (år 1938 1.6 %).

4. Dödsorsakerna.

Detaljerade uppgifter om dödligheten åren 1946—50 ha publicerats i skilda tabellsamlingar (F. O. S. VI B: 103—106). Följande tabell, nr 4, är en översikt, i vilken finns uppgifter om döda efter dödsorsaksgrupp i procent av samtliga döda samt i förhållande till 100 000 personer av medelfolkmängden.

4. Deaths by groupes of causes of death.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	Kuolleita maassa-asuvan väestön keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden — Döda på 100 000 personer av medelfolkmängden för den i riket bosatta befolkningen Deaths per 100 000 mean population (present-in-area)								% kuolleista I % av döda Percentage distribution	
		1936—40		1941—45 *)			1946—50			1941 —45	1946 —50
		M. sp. B. k. Both sexes	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	M. sp. B. k. Both sexes	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	M. sp. B. k. Both sexes	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	M. sp. B. k. Both sexes
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum	57.7	63.9	44.3	58.7	73.2	50.1	61.1	4.1	5.4	
II	Morbi senectutis	163.9	128.5	177.5	154.0	104.7	156.5	131.7	11.9	11.5	
III	Morbi infectionis	316.6	352.1	268.9	308.8	262.5	169.5	213.9	23.8	18.7	
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	176.2	203.4	138.5	169.6	163.0	88.9	124.3	18.1	10.9	
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	29.7	32.4	25.4	28.7	28.9	19.0	21.3	2.2	1.9	
IV	Morbi systematis haematoopoëticæ et sanguinis et diatheses haemorrhagicae	8.7	7.5	9.2	8.4	8.1	8.8	8.5	0.6	0.7	
V	Morbi nutritionis et secretionis internæ	12.8	9.6	11.6	10.6	5.9	9.1	7.6	0.8	0.7	
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	111.1	100.4	122.1	111.7	93.4	127.7	111.3	8.6	9.8	
VII	Morbi organorum circulationis	269.0	312.4	221.8	265.3	290.5	219.5	253.4	20.4	22.2	
VIII	Morbi organorum respirationis	106.4	103.5	73.6	88.0	84.5	62.6	73.0	6.8	6.4	
IX	Morbi organorum digestioñis	39.5	49.0	32.1	40.2	37.5	23.8	30.4	3.1	2.7	
X	Morbi organorum uropoëticorum	22.8	22.9	16.9	19.8	18.4	14.2	16.2	1.5	1.4	
XI	Morbi organorum genitalium	5.0	8.2	1.9	4.9	8.7	0.9	4.7	0.4	0.4	
XII	Morbi gravidarum et puerparum	9.3	—	16.7	8.7	—	9.8	5.1	0.7	0.5	
XIII	Morbi ossium et articulorum	5.5	4.1	5.2	4.7	2.5	4.3	3.4	0.4	0.3	
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei	0.7	0.6	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	
XV	Tumores	114.3	119.5	118.9	119.2	138.3	127.2	132.5	9.2	11.6	
7000—7060	Carcinoma	102.8	107.9	107.5	107.7	125.8	115.7	120.5	8.3	10.5	
7500—7800	Alii tumores	11.5	11.5	11.4	11.5	12.5	11.5	12.0	0.9	1.1	
XVI	Intoxications chronicæ	1.0	1.0	0.1	0.5	1.1	0.1	0.5	0.0	0.0	
XVII ¹⁾	Mors violenta, non naturalis	74.1	131.7	36.8	82.3	119.0	31.6	73.3	6.3	6.4	
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	23.8	25.0	10.4	17.4	20.3	9.3	14.6	1.3	1.3	
	Yhteensä — Summa — Total	1 342.2	1 439.9	1 168.7	1 298.8	1 268.9	1 025.3	1 141.5	100.0	100.0	

¹⁾ Ilman n:o 8950. — ²⁾ Korjattuja lukuja.

¹⁾ Utan n:o 8950. — ²⁾ Korrigrade siffror.

¹⁾ Excluding deaths from injuries resulting from operations of war (number 8950 of Finnish list of causes of death, 1935.) — ²⁾ Corrected figures.

5. Deaths per 100 000 mean population (present-in-area) by county, in the years 1946—50.

Lääni — Län — County	Morbi senectutis	Morbi infectionis				Tumores			Yhteensä — Summa Total	
		Morbi tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	Alli morbi tuberculosis	1 410-1 480	1) 1 410-1 480	VI	VII	VIII	Alli tumores	
									Carcinoma	
1946—50										
Uudenmaan — Nylands	92.0	118.6	10.8	42.5	115.5	255.1	73.5	138.3	14.3	222.3 1 082.9
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	138.1	132.8	17.5	54.0	104.1	259.5	66.4	134.6	12.7	209.5 1 129.2
Ahvenanmaa — Åland	141.8	129.1	23.6	37.3	145.5	305.5	64.5	177.3	23.6	193.6 1 241.8
Hämeen — Tavastehus	120.4	111.1	17.3	52.7	121.3	250.5	64.9	123.9	11.2	211.4 1 084.7
Viipurin — Viborgs	127.0	98.2	15.2	48.4	117.7	278.1	65.6	128.2	10.7	217.5 1 106.6
Mikkelin — St. Michels	170.4	88.8	17.3	72.3	120.6	312.1	74.4	120.5	9.8	223.9 1 210.1
Kuopion — Kuopio	168.3	110.2	21.4	89.3	105.4	266.5	83.4	101.4	10.2	238.6 1 189.7
Vaasan — Vasa	129.0	147.8	30.2	70.2	115.8	240.5	77.6	116.9	13.0	227.7 1 168.7
Oulun — Uleåborgs	153.3	150.6	34.9	123.8	88.5	202.6	76.0	83.1	11.5	251.2 1 175.5
Lapin — Lapplands	94.0	147.6	45.5	127.2	88.3	161.6	84.4	78.4	8.3	267.4 1 097.7
Luovutetut alueet — Avträdda områden	161.1	124.5	20.4	66.1	126.6	294.3	70.9	146.5	12.0	224.3 1 246.7
Koko maa — Hela riket — Total	181.7	124.8	21.3	68.3	111.3	253.4	73.0	120.5	12.0	225.7 1 141.5
Kaupungit — Städer — Towns	71.4	126.7	12.8	55.7	116.8	263.5	71.7	126.3	14.0	236.3 1 095.2
Maaseutu — Landsbygd — Market towns and rural districts	151.9	123.5	24.1	72.5	109.5	250.0	73.5	118.6	11.3	222.1 1 157.0
V. — År 1946	125.0	154.1	25.7	83.3	106.7	245.3	82.3	113.5	11.0	245.9 1 192.8
» — » 1947	126.9	144.2	24.0	92.5	112.1	257.1	86.1	118.0	12.4	236.5 1 209.8
» — » 1948	134.0	134.0	23.3	62.4	108.4	244.0	68.2	116.7	12.0	231.2 1 134.2
» — » 1949	143.9	112.2	19.5	64.0	113.5	266.4	68.2	123.2	12.7	216.2 1 139.8
» — » 1950	128.6	79.3	14.4	40.6	115.8	253.8	61.3	130.5	11.8	199.8 1 035.9

¹⁾ 1 000—1 310, 1 500—1 610. — ²⁾ IV, V, IX—XIV, XVI, 8 500, 8 510, 8 900, 8 960, XVIII.

Taulussa n:o 5 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset lääneittäin keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.

Aikaisemmin (siv. 7) on jo huomautettu siitä, että käsittelynäisenä viisivuotiskautena kokonaiskuolleisuus laski voimakkaasti viisivuotiskaudesta 1941—45. Eri tautiryhmien kohdalla kehitys luonnollisesti kuitenkin on vaihdellut.

Vanhuudentautien osalta on havaittavissa, että näistä taudista aiheutuneiden kuolemantapausten luku oli vuosina 1946 ja 1947 huomattavasti pienempi kuin edellisen viisivuotiskauden päätyessä, jolloin se oli alempi kuin minään vuosista 1936—44. Vuoden 1946 jälkeen oli k. o. kuolemantapausten luvussa kuitenkin nousua, joka oli erityisen tuntuva vuosina 1948 ja 1949, minkä jälkeen seurasi huomattava lasku. Lukuunottamatta vuotta 1949 kuolleisuus vanhuudentautieihin po. kautena oli alempi kuin edellisen viisivuotiskauden päätyessä.

Tartuntataudeissa on havaittavissa voimakasta laskua. Nimenomaan näiden tautien osalta on kuolleisuuden alenemiseen vaikuttanut uusien lääkeaineiden keksiminen ja sairaanhoidon edistyminen.

Tuberkuloosiin kuolleiden lukumäärä väheni jyrkästi käsittelynäisenä kautena. Vuonna 1946 oli keuhkotautiin kuolleita 5 864, mutta viisivuotiskauden lopussa lukumäärä oli laskenut 3 178:aan. Kaikista kuoleman tapausista keuhkotautiin kuolleita oli siis viisivuotiskauden alussa 12.9 % ja sen lopussa 7.7 %. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli keuhkotautiin kuolleita vuonna 1946 154.1, vuonna 1947 144.2, vuonna 1948 134.0, vuonna 1949 112.2 ja vuonna 1950 79.3. Miehillä kuolleisuus keuhkotautiin laski po. viisivuotiskautena keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 201.7:stä 106.3:een

I tabell nr 5 finns uppgifter om döda, som avlidit i de viktigaste dödsorsakerna, efter län på 100 000 av medelfolkmängden.

Tidigare (sid. 7) har påpekats att under den femårsperiod denna undersökning behandlar sjönk den totala dödligheten i betydande grad i jämförelse med femårsperioden 1941—45. Dock har utvecklingen i olika sjukdomsgrupper givetvis varit olika.

Om ålderdomssjukdomarna är att observera att, antalet dödsfall i dessa sjukdomar åren 1946 och 1947 var avsevärt mindre än i slutet av föregående femårsperiod, då denna dödlighet var lägre än under något annat av åren 1936—44. Efter år 1946 förekom dock en ökning av antalet dödsfall i ifrågavarande sjukdomar. Ökningen var särskilt betydande åren 1948 och 1949; därefter följde åter en avsevärd minskning. Med undantag av år 1949 var dödligheten i ålderdomssjukdomar under ifrågavarande period lägre än i slutet av föregående femårsperiod.

Antalet dödsfall i infektionssjukdomar har kraftigt nedgått. Upptäckten av de nya läkemedlen och den förbättrade sjukvården har alldeles speciellt påverkat minskningen av dödligheten i dessa sjukdomar.

Antalet dödsfall i tuberkulos sjönk brant under den period som här behandlas. År 1946 avled 5 864 i lungsot men i slutet av femårsperioden hade siffran sjunkit till 3 178. Av samtliga dödsfall utgjorde de i lungsot avlidna i början av femårsperioden 12.9 %, i slutet av femårsperioden 7.7 %. Av 100 000 personer av medelfolkmängden avled år 1946 154.1 i lungsot, år 1947 144.2, år 1948 134.0, år 1949 112.2 och år 1950 79.3. Männens dödlighet i lungsot sjönk under ifrågavarande femårsperiod från 201.7 dödsfall på 100 000 personer av medelfolkmängden till 106.3; motsvarande siffror för

ja naisilla 110.7:stä 54.5:een. Vaikka kuolleisuus on laskenut tuntuvasti ei keuhkotautia sairastavien lukumäärä kuitenkaan ole vastaavasti alentunut. Tähän suuntaan vaikuttaa se, että uudetkaan lääkkeet eivät monessa tapauksessa paranna potilasta täysin terveksi ja että pienoisröntgenkuvauskella saadaan selville entistä enemmän tautitapauksia.

Muuhun tuberkuloosiin kuin keuhkotautiin kuolleiden luku alemi 978:sta vuonna 1946 576:een vuonna 1950. Kaikista kuolemantapauksista oli muuhun tuberkuloosiin kuolleita k. o. viisivuotiskauden alussa 2.2 % ja sen lopussa 1.4 %. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli »muuhun tuberkuloosiin» kuolleita vuonna 1946 25.7, vuonna 1947 24.0, vuonna 1948 23.3, vuonna 1949 19.5 ja vuonna 1950 14.4.

Myös muiden tartuntatautien osalta on havaittavissa huomattavia muutoksia. Niinpä tulirokkoon kuolleiden määrä 100 000 henkeä kohti lähinnä penisillijin ansiosta laski niin, että viisivuotiskautena 1946—50 kuolleisuus oli 0.3 oltuaan viisivuotiskautena 1941—45 vielä 2.2. Käsitellynäisenä kautena oli tulirokkoon sairastuneiden luku erityisen korkea v. 1950 nim. 15 908; lähinnä korkein se oli v. 1949 4 043. Kurkkumätä-tapausten luku laski suojarokotuksen ansiosta. Vuonna 1946 näitä tapauksia sattui 11 336, v. 1947 6 270, v. 1948 2 805, v. 1949 1 292 ja v. 1950 858. Kuolleisuus keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli v. 1946 13.5, v. 1947 7.7, v. 1948 2.5, v. 1949 1.2 ja v. 1950 0.9. Koko viisivuotiskautena 1946—50 kurkkumätäkuolleisuus keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli 5.1 oltuaan edellisenä viisivuotiskautena 18.8. Hinkuksaan kuolleita oli keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti käsitellynäisenä viisivuotiskautena 3.8, vv. 1941—45 7.6 ja vv. 1936—40 8.8.

Edelleen mainittakoon, että maha- ja suolitulehdusseen sairastuneiden lukumäärä pysyi viisivuotiskautena 1946—50 korkeana, mihin olivat vaikuttamassa elävänä syntyneiden lasten luvun voimakas kasvu ja ko. kauden alkupuolella vielä heikohko ravintotilanne. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli tähän tautiin kuolleita v. 1946 28.8, v. 1947 38.1, v. 1948 28.5, v. 1949 20.6 ja 1950 16.1. Koko käsitellynäisenä viisivuotiskautena oli tämä kuolleisuus keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 26.8 vastaten 27.4 vuonna 1941—45 (vuonna 1938 15.6).

Lavantauti- ja paratyfuskoluolleisuus on suojarokotuksen vaikutuksesta laskenut. Koko viisivuotiskautena 1946—50 oli lavantautiin kuolleita keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 1.3 tapausta vastaten 3.2 edellisenä viisivuotiskautena. Paratyfykseen kuolleita oli keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti vuosina 1946—50 1.5 tapausta (vv. 1941—45 2.7).

Ilmoitettujen lapsihalvaustapausten lukumäärä vuosina 1941—50 selviää seuraavasta asetelmasta:

kvinnorna voro 110.7 och 54.5. Även om dödigheten har sjunkit kännbart, har antalet personer som är insjuknade i lungrot dock icke sjunkit i motsvarande grad. Att så är fallet beror bl. a. på att icke ens de nya läkemedlen i alla fall helt kan bota patienten och att genom skärbildfotografering flere fall än tidigare bli uppdagade.

Antalet avlidna i annan tuberkulos än lungrot sjönk från 978 år 1946 till 576 år 1950. Dödsfallen i »annan tuberkulos» utgjorde i början av ifrågavarande femårsperiod 2.2 % av samtliga döda; motsvarande siffra vid femårsperiodens slut var 1.4 %. På 100 000 av medelfolkmängden kom det år 1946 25.7 dödsfall i »annan tuberkulos», år 1947 24.0, år 1948 23.3, år 1949 19.5 och 1950 14.4.

Också i avseende å andra infektionssjukdomar kan betydande förändringar konstateras. Sålunda sjönk antalet dödsfall i scharlakansfeber på 100 000 personer närmast tack vare penicillinet så att dödigheten under femårsperioden 1946—50 var 0.3, då den under femårsperioden 1941—45 ännu var 2.2. Under den period som här behandlas var antalet i scharlakansfeber insjuknade särskilt stort år 1950, nämligen 15 908; näst högst var antalet år 1949 4 043. Antalet difterifall sjönk på grund av vaccineringen. År 1946 var difterifallens antal 11 336, år 1947 6 270, år 1948 2 805, år 1949 1 292 och år 1950 858. Dödigheten på 100 000 av medelfolkmängden var år 1946 13.5, år 1947 7.7, år 1948 2.5, år 1949 1.2 och år 1950 0.9. Under hela femårsperioden 1946—50 var dödigheten i difteri på 100 000 personer 5.1 i jämförelse med 18.8 under föregående femårsperiod. Antalet dödsfall i kikhosta var under undersökningsperioden 3.8 på 100 000 personer, åren 1941—45 7.6 och åren 1936—40 8.8.

Det må vidare nämnas att antalet sjukdomsfall i mag- och tarminflammationer under hela femårsperioden 1946—50 var stort, beroende dels på den stora ökningen av antalet levande födda barn och dels på att näringstillståndet under ifrågavarande periods början ännu var jämförsevis dåligt. På 100 000 personer var antalet dödsfall i nämnda sjukdomar år 1946 28.8, år 1947 38.1, år 1948 28.5, år 1949 20.6 och 1950 16.1. Under hela den femårsperiod, som här behandlas, var nämnda dödighet på 100 000 personer av medelfolkmängden 26.3 i jämförelse med 27.4 åren 1941—45 (år 1938 15.6).

Dödigheten i tyfus och paratyfus har på grund av vaccineringen sjunkit. Under hela femårsperioden 1946—50 var antalet dödsfall i tyfus 1.3 på 100 000 av medelfolkmängden, motsvarande siffra för den föregående femårsperioden var 3.2. Dödsfallen i paratyfus voro åren 1946—50 1.5 på 100 000 personer (åren 1941—45 2.7).

Antalet anmeldta fall av barnförlamning under åren 1941—50 framgår av följande sammanställning:

Cases of acute polyomyelitis (1230) in the years 1941—50.

Vuosi År Year	Luku Antal Number	Vuosi År Year	Luku Antal Number
1941	81	1946	248
1942	41	1947	228
1943	210	1948	98
1944	382	1949	241
1945	794	1950	322

Lapsihalvauksesta aiheutuneiden kuolemantapausten lukumäärä ja kuolleisuus 100 000 keskiväkiluvun henkeä kohti vv. 1941—50 ilmenee seuraavasta asetelmasta.

Deaths from acute polyomyelitis (1 230) in the years 1941—50; cases of death and deaths per 100 000 of mean population.

Vuosi År Year	Kuolemantap. Dödsfall Deaths	% /0000	Vuosi År Year	Kuolemantap. Dödsfall Deaths	% /0000
1941—45 keskim.— i medeltal —mean	63	1.7	1945	118	2.2
1946—50 » »	36	0.9	1946	41	1.1
1941	43	1.2	1947	40	1.0
1942	27	0.7	1948	24	0.6
1943	47	1.3	1949	40	1.0
1944	82	4.9	1950	36	0.9

Influenssaan sairastuneita oli erityisen runsaasti vuosina 1947 ja 1949, jolloin kuolleisuus keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti nousi 9.9:ään ja 14.0:aan, vuosina 1946, 1948 ja 1950 olivat kuolleisuusluvut 1.4, 2.6 ja 1.8 sekä koko po. viisivuotiskautena 6.0 (vv. 1941—45 7.5).

Hengityselinten taudeista mainittakoon, että vuosina 1946 ja 1947 näiden tautitapausten lukumäärä oli vielä huomattavan korkea — tosin alempi kuin edellisen viisivuotiskauden huippuvuosina 1944 ja 1945 — mutta aleni sitten jatkuvasti vuosina 1948, 1949 ja 1950. Kuolleisuus kaikkiaan näihin tautieihin keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli siten vuosina 1946 ja 1947 82.3 ja 86.1, vuosina 1948 ja 1949 68.2 sekä vuonna 1950 61.3. Keuhkokuumekuoilleisuus erikseen oli keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti vuonna 1946 68.3, vuonna 1947 71.6, vuonna 1948 55.7, vuonna 1949 54.5 ja vuonna 1950 48.8.

Hermoston taudeista mainittakoon, että kuolleisuus verenvuotoon aivoissa tai aivokalvoissa lisääntyi käsittelynäisenä viisivuotiskautena sekä absoluuttisesti että suhteellisesti edelliseen viisivuotiskautteen verrattuna. Lukuunottamatta vuotta 1946 kuolemantapausten määrä ko. kautena oli huomattavasti suurempi kuin minään vuosista 1941—45. Vuonna 1950 se oli noussut 4 033:een 3 215:stä vuonna 1946. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti kuolleisuus aivoverenvuotoon oli v. 1946 84.5, v. 1947 91.0, v. 1948 90.6, v. 1949 96.9 ja v. 1950 92.8.

Sydän- ja muiden verenkiertoelinten tautien suhteellinen osuus kaikista kuolemantapaiksista lisääntyi käsittelynäisenä viisivuotiskautena jonkin verran edellisestä viisivuotiskaudesta. Sydäntautieihin kuolleiden määrä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti aleni sensjaaan 216.8:sta vv. 1941—45 205.2:een vv. 1946—50. Kuolleisuus muihin verenkiertoelinten tautieihin pysyi melkein muuttumattomana (vv. 1946—50 48.1 ja vv. 1941—45 48.4).

Kasvaimista mainittakoon, että todettujen syöpatapausten luku on vuosi vuodelta huomattavasti lisääntynyt. Tähän voidaan katsoa vaikuttavan ainakin kaksi syytä. Toisaalta on tautien diagnostisointi tullut tarkemaksi lääketieteen kehittyessä. Toisaalta taas yhä useammat saavuttavat korkeamman iän kuin aikaisemmin ja vanhemmat henkilöt ovat — kuten tunnettua — syöväälle alittiimpia kuin nuorempia ikäluokkiin kuuluvat.

Vv. 1946—50 kuoli syöpään kaikkiaan 23 556 henkeä vastaten 20 062 edellisestä viisivuotiskautena. Syöpä-

antalet dödsfall som förorsakats av barnförlamning samt dödligheten per 100 000 av medelfolkmängden under åren 1941—50 framgår av följande sammanställning.

Deaths from acute polyomyelitis (1 230) in the years 1941—50; cases of death and deaths per 100 000 of mean population.

Vuosi År Year	Kuolemantap. Dödsfall Deaths	% /0000	Vuosi År Year	Kuolemantap. Dödsfall Deaths	% /0000
1945	118	2.2	1946	41	1.1
1947	40	1.0	1948	24	0.6
1949	40	1.0	1950	36	0.9

Antalet insjuknade i influensa var särskilt stort åren 1947 och 1949, då dödligheten på 100 000 personer av medelfolkmängden steg till 9.9 respektive 14.0, för åren 1946, 1948 och 1950 varo dödlighetstalen 1.4, 2.6 och 1.8 samt för hela ifrågavarande femårsperiod 6.0 (åren 1941—45 7.5).

Om andningsorganens sjukdomar må sägas, att antalet insjuknade i dessa sjukdomar ännu åren 1946 och 1947 var rätt betydande — dock lägre än toppsiffrorna under föregående femårsperiod åren 1944 och 1945 — men sjönk sedan fortgående åren 1948, 1949 och 1950. Den sammanlagda dödligheten i dessa sjukdomar på 100 000 personer av medelfolkmängden var sälunda åren 1946 och 1947 82.3 och 86.1, åren 1948 och 1949 68.2 samt år 1950 61.3. Dödligheten skilt för lunginflammation var på 100 000 personer av medelfolkmängden år 1946 68.0, år 1947 71.6, år 1948 55.7, år 1949 54.5 och år 1950 48.8.

Om nervsystemets sjukdomar må nämnas, att dödligheten i hjärnblödning eller hjärnhinneblödning ökade under den femårsperiod som här behandlas såväl absolut som relativt i jämförelse med föregående femårsperiod. Antalet dödsfall under ifrågavarande period var utom år 1946 betydligt större än under något av åren 1941—45. År 1950 hade antalet stigit till 4 033 från 3 215 år 1946. Antalet dödsfall i hjärnblödning på 100 000 personer av medelfolkmängden var år 1946 84.5, år 1947 91.0, år 1948 90.6, år 1949 96.9 och år 1950 92.8.

Proportionen dödsfall i hjärtsjukdomar och andra cirkulationsorganens sjukdomar av samtliga dödsfall ökade i någon mån under den femårsperiod som här behandlas i jämförelse med föregående femårsperiod. Antalet dödsfall i hjärtsjukdomar på 100 000 personer av medelfolkmängden sjönk däremot från 216.8 åren 1941—45 till 205.2 åren 1946—50. Dödligheten i andra cirkulationsorganens sjukdomar förändrades icke mycket (åren 1946—50 48.1 och åren 1941—45 48.4).

Om svulsterna må sägas att antalet konstaterade fall av kräfta ökat betydligt — år för år. Härvid inverkar åtminstone två omständigheter. Å ena sidan har diagnosticeringen blivit noggrannare genom läkarvetenskapens utveckling. Å andra sidan åter uppnår allt fler en högre ålder än tidigare och äldre personer angripas — som bekant — lättare av kräfta än personer som höra till yngre åldersklasser.

Åren 1946—50 dogo sammanlagt 23 556 personer i kräfta mot 20 062 under föregående femårsperiod. Död-

kuolleisuus keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti oli v. 1946 113.5, v. 1947 118.0, v. 1948 116.7, v. 1949 123.3 ja v. 1950 130.6. Viisivuotiskautena 1946—50 oli syöpään kuolleista hiukan yli puolet (50.2 %) naisia. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden taas naisten kuolleisuus oli 115.7 ja miesten 125.8. Suurin oli kuolleiden määrä viisivuotiskäryhmässä 65—69, ikäryhmät 60—64 ja 70—74 olivat samaa suuruusluokkaa. Asukaslukuun verrattuna kuolleisuus oli suurin ikäluokassa 75—79, toiseksi suurin ikäluokassa 80—84 ja kolmanneksi ikäluokassa 70—74. Miehillä kuolleisuus oli suurin ikäluokissa 75—79, 70—74 ja 80—84 nim. 1 227.0, 1 179.7 ja 1 042.8, naisilla ikäluokissa 80—84, 75—79 ja 70—74 nim. 994.0, 975.0 ja 812.5.

ligheten i kräfta var på 100 000 personer av medelfolkmängden år 1946 113.5, år 1947 118.0, år 1948 116.7, år 1949 123.3 och år 1950 130.6. Under femårsperioden 1946—50 var något mer än hälften (50.2 %) kvinnor av de i kräfta avlidna. På 100 000 av medelfolkmängden åter var kvinnornas dödlighet 115.7 och männen 125.8. Störst var antalet döda i femårsgruppen 65—69 medan åldersgrupperna 60—64 och 70—74 voro av samma storleksordning. Jämfört med invånarantalet var dödligheten störst i åldersgruppen 75—79, näststörst i åldersgruppen 80—84 och närmast störst i åldersgruppen 70—74. För männen var dödligheten störst i åldersgrupperna 75—79, 70—74 och 80—84, nämligen 1 227.0, 1 179.7 och 1 042.8, för kvinnorna i åldersgrupperna 80—84, 75—79 och 70—74, nämligen 994.0, 975.0 och 812.5.

6. Deaths from diseases of pregnancy and childbirth (XII, 5 500—5 700.)

Vuonna — År — Year	Synnyttäjän ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år — Age, years							
	—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—	Yht.
Kuolleet 1 000 synnyttäjää kohden ¹⁾ — Döda i % av barnaföderskorna ¹⁾ —								
	Deaths per 1 000 maternities							
1946	(2.3)	1.6	2.2	2.6	4.0	4.7	(13.3)	2.7
1947	(1.4)	1.6	1.5	2.3	3.4	3.5	(9.0)	2.1
1948	(1.1)	1.2	1.2	1.9	2.3	4.1	(4.7)	1.7
1949	(0.7)	0.9	1.0	1.7	3.2	3.4	—	1.6
1950	(0.9)	0.8	1.0	1.3	2.6	4.7	(1.6)	1.5
1946—50	1.2	1.2	1.4	2.0	3.1	4.1	5.8	1.9
1941—45	5.1	3.5	3.4	3.8	4.5	6.5	8.2	4.0
1936—40	5.4	3.5	4.1	4.8	6.2	6.2	9.2	4.7

¹⁾ Sulkuihin on merkitty ne luvut, jotka perustuvat vähempään kuin kymmeneen tapaukseen. — Inom parentes de siffror, som grunda sig på mindre än tio fall.

Taulukosta n:o 6 selviävät raskaustilan ja synnytystautuihin kuolleet 1 000 synnyttäjää kohden ryhmitetyinä iän mukaan vv. 1946—50. Vertauksen vuoksi on esitetty myös viisivuotiskausien 1936—40 ja 1941—45 vastaavat luvut. Suhteellisesti vähiten sattui ko. kuolemantapauksia alle 30 vuotiailla. Vuosina 1936—40 ja 1941—45 oli kuolemanvaara näiden tautien kohdalla vielä ollut alle 20-vuotiailla naisilla suurempi kuin 20—29 vuotiailla. Verrattuna viisivuotiskausiin 1936—40 ja 1941—45 aleni äitiyskuolleisuus käsittelyn alaisena viisivuotiskautena kaikissa ikäryhmässä voimakkaasti.

Tapaturmakuolleisuus nousi koko sodan ajan keskeytymättä. Tämä kuolleisuus osoitti vuoden 1945 jälkeen laskevaa suuntaa. Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden sattui huippuvuonna 1945 86.7 tapaturmaista kuolemantapausta; vuonna 1946 tapahtui lasku 59.2:een, vuonna 1947 55.7:ään, vuonna 1948 55.2:een, vuonna 1949 47.6:een ja vuonna 1950 46.4:ään. Tapaturmien lukua vuosina 1946—50 valaisee taulu n:o 7.

Käsittelynäisenä viisivuotiskautena itsemurhien luku keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden oli koko maassa 16.4, kaupungeissa 22.3 ja maaseudulla 14.5. Edellisenä viisivuotiskautena ko. luvut olivat vastavasti 16.7, 24.1 ja 14.5. Miesten keskuudessa tapahtui itsemurhia keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden viisivuotiskautena 1946—50 28.1 ja naisten keskuudessa 5.8; edellisenä viisivuotiskautena olivat ko. luvut vastavasti 28.4 ja 5.9. Näin ollen muutokset ko. luvuissa

Av tabell n:o 6 framgår antalet döda i havandeskaps- och förlossningssjukdomar på 1 000 barnaföderskor, grupperade efter ålder, åren 1946—50. För jämförelsen skull presenteras även motsvarande siffror för femårsperioderna 1936—40 och 1941—45. Relativt taget minst var dödligheten i nämnda sjukdomar i åldern under 30 år. Åren 1936—40 och 1941—45 hade risken att dö för kvinnor i dessa sjukdomar ännu varit mycket större i åldern under 20 år än i åldern 20—29 år. I jämförelse med femårsperioderna 1936—40 och 1941—45 nedgick graviditetsdödligheten starkt i alla åldersgrupper under den femårsperiod som här behandlas.

Dödligheten på grund av olycksfall steg oavbrutet under hela kriget. Denna dödlighet upptäcktes efter år 1945 en nedåtgående tendens. På 100 000 personer av medelfolkmängden inträffade under toppåret 1945 86.7 dödsfall på grund av olycksfall; år 1946 inträffade en nedgång till 59.2, år 1947 till 55.7, år 1948 till 55.2, år 1949 till 47.6 och år 1950 till 46.4. Antalet olycksfall under åren 1941—45 framgår av tabell nr 7.

Under den femårsperiod som här behandlas uppgick antalet självmord på 100 000 personer av medelfolkmängden i hela riket till 16.4, i städerna till 22.3 och på landsbygden till 14.5. Under föregående femårsperiod voro ifrågavarande siffror 16.7, resp. 24.1 och 14.5. Bland män begicks 28.1 och bland kvinnor 5.8 självmord på 100 000 personer av medelfolkmängden under femårsperioden 1946—50, under föregående femårsperiod voro motsvarande siffror 28.4 och 5.9. Så-

7. Deaths from accidents in the years 1946—50.

Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	Vuosi — År — Year									
	1946		1947		1948		1949		1950	
	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female								
8500 Submersio	549	112	450	113	514	114	447	101	395	99
8520 Combustio	76	50	65	54	60	41	59	32	49	53
8530 Congelatio	14	3	19	1	11	3	7	3	4	2
8570 Contusio. Laceratio. Vulnus contumsum. Fractura	751	265	757	238	779	251	658	238	636	264
8580 Vulnus punctum, incisum, scissum	12	1	11	6	15	3	8	3	12	1
8590 Vulnus sclopetarium	80	15	64	2	64	7	43	2	36	1
8600 Intoxicatio acuta	148	42	186	52	133	30	108	30	143	43
1) Alii casus mortiferi	91	46	91	39	93	41	111	38	94	27
Yhteensä — Summa — Total	1 721	534	1 643	505	1 669	490	1 441	447	1 369	490

1) 8 510, 8 540, 8 550, 8 560, 8 602, 8 604, 8 606, 8 610, 8 650.

viisivuotiskautena 1946—50 olivat edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna hyvin pieniä. Taulu n:o 8 osoittaa itsemurhan tehneiden lukua itsemurhatavan ja iän mukaan.

lunda förändrades siffrorna för femårsperioden 1946—50 i jämförelse med föregående femårsperiod mycket litet. Tabell nr 8 visar antalet personer, som begått självmord, fördelade efter sättet, på vilket självmordet utförts, och efter ålder.

8. Suicides in the years 1946—50.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	—24 v. — år — years		25—64 v. — år — years		65— v. — år — years		Yhteensä — Summa — Total			
		Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	Kau- pungit Städer Towns	Maa- seutu- Lands- bygd — ²⁾
1946—50											
8 700	Submersio	27	12	120	79	15	17	162	108	75	195
8 710	Strangulatio	114	22	897	151	136	21	1 147	194	398	943
8 720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	30	11	132	36	5	5	167	52	94	125
8 730	Vulnus punctum, incisum, scissum	5	1	54	4	14	2	73	7	25	55
8 740	Vulnus sclopetarium	218	14	548	16	38	—	804	30	238	596
8 750	Veneficium	19	29	153	147	6	9	178	185	233	130
8 790	Alii modi suicidii	15	1	69	14	8	—	92	15	28	79
	Yhteensä — Summa — Total	428	90	1 973	447	222	54	2 623	591	1 091	2 123
	V. — År 1946	75	20	393	84	43	9	511	113	212	412
	» — » 1947	86	13	402	112	53	17	541	142	224	459
	» — » 1948	91	21	390	83	45	6	526	110	219	417
	» — » 1949	86	11	388	79	42	15	516	105	223	398
	» — » 1950	90	25	400	89	39	7	529	121	213	437

2) Market towns and rural districts.

Murhia ja tappoja (lukuunottamatta kuolemansyy-nimikettä 8950, »sodassa kuolleet») oli kunakin vuosista 1946—50 keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden 4.8, 4.3, 4.7, 3.4 ja 3.4 sekä koko viisivuotiskautena 1946—50 4.1. Toisen sotamme päätytyä murhien lukuisuus edelleen kohosi. V. 1945 tapahtui vielä 6.9 murhaa keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, mutta sen jälkeen murhien luku asukaslukuun verrattuna osoitti laskevaa suuntaa tasaantuen vuosina 1949 ja 1950. Vuonna 1945 murhien määrä oli vielä 259, mutta laski seuraavana vuonna 173:een; v. 1947 murhia oli 165, v. 1948 182, v. 1949 136 ja seuraavana vuonna 135.

Koko ryhmässä »väkivaltainen ja luonnoton kuolema» oli siviilikuolleisuus keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden v. 1946 81.1, v. 1947 76.0, v. 1948 76.1, v. 1949 68.8, v. 1950 56.4 ja koko käsittelynalaisena viisivuo-

I gruppen mord och dråp (med undantag av dödsorsaksnummer 8950 »döda i krig») uppgick antalet dödsfall på 100 000 personer av medelfolkmängden i hela riket under var och ett av åren 1946—50 till 4.8, 4.3, 4.7, 3.4 och 3.4 samt under hela femårsperioden 1946—50 till 4.1. Sedan vårt andra krig slutat steg antalet mord fortgående. År 1945 begicks ännu 6.9 mord på 100 000 personer av medelfolkmängden, men därefter uppvisade antalet mord i jämförelse med folkmängden en sjunkande tendens; åren 1949 och 1950 upphörde nedgången och läget stabiliseras. År 1945 var antalet mord ännu 259, men nedgick följande år till 173; år 1947 var antalet mord 165, år 1948 182, år 1949 136 och följande år 135.

I hela gruppen »våldsam och onaturlig död» var den civila dödligheten på 100 000 personer av medelfolkmängden år 1946 81.1, år 1947 76.0, år 1948 76.1, år 1949 68.8, år 1950 56.4 och för hela undersöknings-

9. Deaths by age and by cause of death,

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	Allamainitun ikäisistä kuolleet Döda vid nedannämnda åldrar fördelade Percentage distribution of deaths by principal 0 v. — år year 1—14 v. — år years 15—29 v. — år years 30—44 v. — år years			
		0 v. — år year	1—14 v. — år years	15—29 v. — år years	30—44 v. — år years
1946—50					
II	Morbi senectutis	—	—	—	—
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	0.6	6.7	45.5	33.2
1410—1480	Alli morbi tuberculosis	2.2	15.8	5.7	2.3
*)	Alli morbi infectionis	26.4	21.7	4.8	3.4
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	4.0	4.9	3.5	5.0
VII	Morbi organorum circulationis	(0.03)	2.4	4.8	13.8
VIII	Morbi organorum respirationis	17.2	11.1	2.2	3.2
7000—7060	Carcinoma	—	0.2	0.7	7.1
7500—7800	Alli tumores	0.1	2.0	1.6	1.8
XVII *)	Mors violenta, non naturalis	1.2	24.0	20.4	16.9
*)	Alli morbi	48.3	11.2	10.8	13.3
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0

¹⁾ 1 000—1 310 ja 1 500—1 610. — ²⁾ paitsi — utom — excluding 8 950. — ³⁾ I, IV, V, IX—XIV, XVI ja XVIII.

tiskautena 73.3. Mikäli »sodassa kuolleet» huomioidaan oli edellämainitussa kuolemansyyryhmässä kuolemantapauksia keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden v. 1946 81.9, v. 1949 68.6 ja koko viisivuotiskautena 1946—50 73.7; vuosina 1947, 1948 ja 1950 ovat suhdeluut samat kuin siviilikuoilleisuudessa.

Kuolemansyytä iän mukaan valaisee kolme eri taulua. Näistä taulussa n:o 9 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset määrätyissä ikäryhmässä prosentteina kaikista samassa iässä kuolleista ja eri kuolemansyihin määrätyssä iässä kuolleet prosentteina saman kuolemansyyyn kaikkiaan aiheuttamista kuolemantapauksista. Tässä selostuksessa on joissakin yhteyksissä viittattu jo muutamiin ikäsuhteista johtuviihin eroavaisuuksiin. Mainittakoon tässä, että taulukossa n:o 9 keuhkotautikuolemantapaukset käsittelynäisenä viisivuotiskautena verrattuna vv. 1941—45 vähenivät erityisesti 15—29 vuotiailla; sen sijaan ne lisääntyivät jonkin verran 45—49 vuotiailla ja huomattavasti sitä vanhemmilla. »Muiden tartuntatautien» aiheuttamien kuolemantapauksien osuus kaikista näihin tauteihin kuolleista lisääntyi edellisestä viisivuotiskaudesta voimakkaasti alle 1-vuotiailla, mutta väheni huomattavasti 1—14 vuotiailla; muissa ikäluokissa — paitsi yli 59-vuotiailla — oli havaittavissa näiden kuolemantapausten vähenystä. Hengitys- elinten tautien kuolemantapausten osalta oli havaittavissa huomattavaa lisäystä alle 1-vuotiailla ja yli 59-vuotiailla, sensjaaan huomattavaa vähenystä 1—14 vuotiailla.

Taulusta n:o 10 selviää yksityiskohtaisemmin imenväiskäisten, leikki-ikäisten (1—6-vuotiaitten), koulu-ikäisten (7—14 vuotiaitten), nuorukaisikäisten (15—19 vuotiaitten), 20—59 vuotiaitten ja sitä vanhempien kuolemantapaukset eri kuolemansyiden kohdalta prosentteina kaikista näiden ikäryhmien keskuudessa satunnaisista kuolemantapauksista.

Litteenä tähän tekstikatsaukseen esitetään taulu (taululiite n:o 1, siv. 26), josta selviää vuosina 1946—50 keskimäärin sattuneet kuolemantapaukset kuolemansyyyn sekä iän ja sukupuolen mukaan keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. Mainittakoon, että ve-

perioiden 73.3. Om även gruppen »döda i krig» beaktas, uppgrick antalet dödsfall i »våldsam och onaturlig död» på 100 000 personer av medelfolkmängden år 1946 till 81.9, år 1949 till 68.6 och under hela femårsperioden 1946—50 till 73.7; åren 1947, 1948 och 1950 voro relationstalen desamma som för den civila dödligheten.

Dödsorsakerna efter ålder framgår av tre tabeller. Av dem visar tabell nr 9 för olika åldersgrupper dödsfallen i de viktigaste dödsorsakerna i procent av hela antalet i samma ålder avlidna samt för olika dödsorsaker de i en viss ålder avlidna i procent av samtliga dödsfall till följd av samma dödsorsak. I några fall har i denna redogörelse redan hävits till vissa oliheter i sjukdomars framträende, som bero på åldern. Det må nämnas, att antalet dödsfall i lungsot i tabell nr 9 under den femårsperiod som här behandlas i jämförelse med åren 1941—45 nedgick speciellt bland personer i åldern 15—29 år; däremot ökade antalet sådana dödsfall något i åldern 45—49 år och betydligt i åldern däreover. Andelen dödsfall i »andra infektionssjukdomar» av det totala antalet döda i dessa sjukdomar ökade i jämförelse med föregående femårsperiod kraftigt bland 1-åringarna, men minskades betydligt bland personer i åldern 1—14 år; i andra åldersklasser — förutom bland personer i åldern över 59 år — kan en nedgång konstateras i antalet dödsfall i »andra infektionssjukdomar». Med avseende på andningsorgans sjukdomar observerades en betydlig ökning bland barn under ett år och bland personer i åldern över 59 år, däremot inträffade en betydlig minskning bland personer i åldern 1—14 år.

Av tabell n:o 10 framgår mera detaljerat för spädbarn, barn i lekåldern (1—6 år), barn i skolåldern (7—14 år), barn i ynglingåldern (15—19 år), 20—59 åringar och 60 år fyllda antalet dödsfall till följd av olika dödsorsaker i procent av samtliga dödsfall i resp. åldersgrupper.

Bland tabellbilagorna till denna textöversikt finns en tabell (tabellbilaga nr 1, sid. 26), varav framgår de under åren 1946—50 inträffade dödsfallen, i medeltal efter dödsorsak samt ålder och kön på 100 000 personer av medelfolkmängden. Det må nämnas, att antalet per-

in percentage, average numbers for the years 1946—50.

Tärkeimpin kuolemansyihin, % enligt viktigaste dödsorsaker, 1 % causes of death for different age groups			Tärkeimpin kuolemansyihin kuolleista allamainitun ikäisistä, % Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid nedannämnda åldrar, 1 % Percentage age distribution of deaths from different causes of death							
45—59 v. — år years	60— v. — år years	Yhteensä Summa Total	0 v. — år year	1—14 v. — år years	15—29 v. — år years	30—44 v. — år years	45—59 v. — år years	60— v. — år years	Yhteensä Summa Total	
0.1	22.6	11.5	—	—	—	—	0.2	99.8	100.0	
15.8	3.5	10.9	0.6	3.0	29.1	27.7	23.1	16.5	100.0	
0.8	0.2	1.9	14.1	40.5	21.2	11.2	7.1	5.9	100.0	
2.5	1.4	6.0	53.6	17.3	5.6	5.3	6.7	11.5	100.0	
9.0	13.5	9.8	5.0	2.4	2.5	4.6	14.7	70.8	100.0	
28.6	31.2	22.2	(0.02)	0.5	1.5	5.6	20.6	71.8	100.0	
4.7	5.1	6.4	32.7	8.3	2.3	4.5	11.8	40.4	100.0	
18.6	13.5	10.6	—	0.1	0.5	6.1	28.0	65.3	100.0	
1.8	0.7	1.0	1.6	9.1	10.4	15.5	27.6	35.8	100.0	
7.2	2.0	6.4	2.3	17.8	22.1	23.9	17.8	16.1	100.0	
10.9	6.3	13.3	44.0	4.0	5.7	9.0	13.0	24.3	100.0	
100.0	100.0	100.0	12.1	4.8	7.0	9.1	15.9	51.1	100.0	

10. Deaths by age and by causes of death, average numbers for the years 1946—50.

N:o	Kuolemansyy ja ikä Dödsorsak och Ålder Causes of death and age	Kuolemantapauksia Dödsfall Deaths %	N:o	Kuolemansyy ja ikä Dödsorsak och ålder Causes of death and age	Kuolemantapauksia Dödsfall Deaths %
0150	0-vuotiaat — Under 1 år Under 1 year of age		1110	Diphtheria	3.5
	Debilitas congenita. Partus praematurus	29.3	2360	Diabetes mellitus	2.9
1150	Gastroenteritis acuta	16.4	4040	Appendicitis	2.7
3520, 3530	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa	16.1	3520	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris	2.3
1400—1480	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa. Alii morbi tuberculosus	11.7	3020	Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis	2.2
0001	Vitia prima conformatio	6.4	8590	Vulnus scelopetarium	1.9
0250	Laesiones intra partum	5.2	1220	Septicaemia. Pyaemia	1.3
0300	Aliae causae mortis neonatorum	2.8		Alii morbi	38.6
1610	Alii morbi infectionis	2.8		Yhteensä — Summa — Total	100.0
2640	Eclampsia infantum	2.7	1400	15—19 vuotiaat — år — years	
1100	Pertussis	2.0		Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	40.6
1220	Septicaemia. Pyaemia	1.8		Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	6.3
	Alii morbi	2.8		Submersio	5.5
	Yhteensä — Summa — Total	100.0		Appendicitis	1.8
				Tuberculosis meningum, cerebri	1.7
				Diphteria	1.5
				Vulnus scelopetarium	1.4
				Diabetes mellitus	1.4
				Septicaemia. Pyaemia	0.8
				Alii morbi	35.1
				Yhteensä — Summa — Total	100.0
				20—59 vuotiaat — år — years	
				Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	26.5
				Combustio	8.4
				Tuberculosis miliaris	2.8
				Pertussis	2.5

N:o	Kuolemansyy ja ikä Dödsorsak och Ålder <i>Causes of death and age</i>	Kuolemantapausksia Dödsfall Deaths %	N:o	Kuolemansyy ja ikä Dödsorsak och Ålder <i>Causes of death and age</i>	Kuolemantapausksia Dödsfall Deaths %
	60 — v. — år — years		1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	3.5
0500	Marasmus senilis	22.1	3040	Arteriosclerosis	3.0
3030	Morbi myocardii	18.0	3045	Hypertonia arterialis	2.2
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum ...	13.1	3020	Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis	1.7
7010	Carcinoma ventriculi	6.5	8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	1.2
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	5.0		Alii morbi	19.6
3520, 3530	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa	4.1		Yhteensä — Summa — Total	100.0

renkierotelinten tauteihin kuolleiden määrä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden oli edellisestä viisivuotiskaudesta laskenut kaikissa muissa ikäryhmässä (naisilla ikäryhmässä 75—84 vuotta kuitenkin pieni nousua) paitsi 84 vuotta vanhemmillä, joilla sen sijaan oli havaittavissa ko. kuolleisuuden huomattavaa nousua. Kuolleisuus verenvuotoon aivokalvoissa ja aivoissa pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä viisivuotiskautena alle 65-vuotiailla, mutta nousi sen sijaan sitä vanhemmillä, erityisesti vanhimmissa ikäluokissa.

soner som avlidit i cirkulationsorganens sjukdomar beräknat på 100 000 personer av folkmängden hade sjunkit från föregående femårsperiod i alla andra åldersgrupper (hos kvinnor i åldern 75—84 dock en smärre ökning) utom hos personer i åldern över 84 år, bland vilka däremot märktes en betydlig ökning av ifrågavarande dödlighet. Dödligheten i hjärnblödning och hjärnhinneblödning höll sig vid ungefär samma nivå som under föregående femårsperiod hos personer i åldern under 65 år, men steg däremot hos äldre personer, speciellt i de äldsta åldersgrupperna.

11. Deaths among the economically active population by industry and cause of death in the years 1946—50.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Max- ja metsätalous Jord- och skogsbruk Agriculture, forestry, fishing etc.	Teollisuus ja käityö Industri och hantverk Manufacturing and handicraft	Kauppa Handel Commerce	Liikenne — Samferdsel Transport and communication	Tjänster kunnalle Community and business services	Fäljekurset yhteis- kunnalle Community and business services	Henkilökuntaiset pal- velujiset Personal services	Yhteensä — Summa — Total
1946—50									
II	Morbi senectutis	14.3	6.4	3.7	4.4	7.0	10.5	13.2	10.7
III	Morbi infectionis	14.7	20.1	20.1	19.7	12.9	16.2	18.9	17.3
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sens.	8.6	8.8	9.6	7.6	11.3	11.7	8.6	8.9
VII	Morbi organorum circulationis ...	29.1	27.6	29.2	26.1	31.1	26.4	23.7	27.4
VIII	Morbi organorum respirationis ...	4.6	5.0	4.7	4.5	5.2	5.0	4.5	4.7
XV	Tumores	14.4	14.2	13.3	12.4	15.2	16.1	11.1	13.6
XVII	Mors violenta, non naturalis	6.2	10.2	9.6	17.3	8.3	5.7	9.4	8.6
1)	Alii morbi	8.1	7.7	9.8	8.0	9.0	8.4	10.6	8.8
	Yhteensä — Summa — Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

) IV, V, IX — XIV, XVI, XVIII.

Eri elinkeinoryhmässä toimineiden kuolemansyitä prosentteina kaikista kussakin elinkeinohaarassa sattuneista kuolemantapausista vv. 1946—50 esittää tekstillä n:o 11. Liitteenä tähän tekstikatsaukseen esitetään taulu (liitetaulu n:o 2, siv. 28), josta selviäävät tarkemmin kuolemansyyt elinkeinohaarana ja ammattiaseman mukaan e. m. vuosina.

Elinkeinoryhmityksessä vv. 1946—50 on kuitenkin tapahtunut muutoksia edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna, joten yllämainitun tekstitaulun luvut eivät ole täysin verrannollisia aikaisemmin julkaistuihin kuolemansyitä ja ammattia koskeviin lukuihin. Mainitakoon kuitenkin yleisenä toteamuksesta, että kasvaimien aiheuttamien kuolemantapausten osuus ja verenkierotelinten tauudeista sekä hermoston tauudeista johtuvien kuolemantapausten osuudet osoittavat kaikissa elinkeinohaarissa nousua edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna.

Texttabell nr 11 visar dödsorsakerna för yrkesutövare i olika näringsgrenar i procent av alla dödsfall, som inträffat inom resp. näringsgren. Såsom bilaga till denna textöversikt finns en tabell (tabellbilaga nr 2, sid. 28), varav dödsorsakerna efter näringsgren och yrkesställning under ifrågavarande år närmare framgå.

Grupperingen efter näringsgren under åren 1946—50 har dock undergått förändringar, varför siffrorna i ovannämnda texttabell icke är fullt jämförbara med de siffror, som tidigare publicerats angående dödsorsak och yrke. Det må dock såsom en allmän iakttagelse nämnas, att proportionen dödsfall i tumörer samt i sjukdomar i cirkulationsorganen och nerverna i alla näringsgrenar uppvisar en uppgång i jämförelse med föregående femårsperiod.

5. Pienten lasten kuolemansyyt.

Tuhatta elävänä syntynyttä kohden laskien saadaan vuotta nuorempana kuolleista seuraava asetelma. Asetelmassa esiintyviin suhdelukuihin nähden on kuitenkin syytä huomauttaa, että niiden vertailukelpoisuutta vähentää syntyneisyyden vaihetut, koska osa kuolleista pikkulapsista kuuluu edellisenä vuonna syntyneisiin eikä kyseessä olevan vuoden, joita käytetään vertailukohteena.

5. Dödsorsaker hos spädbarn.

Antalet döda i åldern under 1 år i förhållande till 1 000 levande födda framgår av följande sammanställning. Om de i sammanställningen anförda siffrorna bör dock påpekas, att deras jämförbarhet minskas av fluktuationerna i nativiteten, emedan en del av de under året avlidna spädbarnen är barn som fötts under föregående år och icke tillhör det ifrågavarande årets födelsekull.

Deaths 0—1 years per 1 000 live births.

	1936—40	1941—45	1946—50	1946	1947	1948	1949	1950
Miespuoliset — Mankön — <i>Male</i>	79.3	67.1	57.4	62.1	64.6	58.5	52.8	48.5
Naispuoliset — Kvinnkön — <i>Female</i>	63.8	55.3	45.9	50.0	52.0	45.0	43.5	38.7
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — <i>Both sexes</i>	71.8	61.4	51.9	56.2	58.5	51.9	48.3	43.5
Aviolapset — Barn inom äktenskapet — <i>Legitimate</i>	59.2	50.3	55.0	56.8	50.3	46.6	42.0
Aviottomat — Barn utom äkt. — <i>Illegitimate</i>	92.3	78.4	75.5	87.1	80.6	76.5	71.2
Kaupungit — Städer — <i>Towns</i>	61.1	55.0	47.6	50.4	56.7	49.3	43.6	36.0
Maaseutu — Landsbygd — <i>Market towns and rural districts</i>	73.9	63.2	53.1	58.1	59.0	52.7	49.6	45.7

Eri läänissä on pienien lasten kuolleisuus ollut seuraava:

I de olika länen har spädbarnsdödligheten gestaltat sig på följande sätt:

Deaths 0—1 years per 1 000 live births.

Lääni — Län — County	1936—40	1941—45	1946—50	1946	1947	1948	1949	1950
Uudenmaan — Nylands	52.6	51.7	43.3	47.6	48.6	44.6	41.8	32.1
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	56.2	47.8	45.6	50.2	52.4	45.0	42.8	36.9
Ahvenanmaa — Åland	44.6	47.4	27.7	20.0	31.8	23.4	38.4	27.1
Hämeen — Tavastehus	57.7	50.8	44.3	44.7	54.4	46.2	41.0	34.8
Kymen ¹⁾ — Kymmenen ¹⁾	84.1	61.8	45.4	44.4	57.6	43.1	43.8	39.0
Mikkeli — S:t Michels	69.6	57.7	51.1	59.4	57.2	51.6	45.4	42.3
Kuopion — Kuopio	81.8	68.0	59.2	68.2	61.7	61.9	54.7	49.8
Vaasan — Vasa	68.1	60.7	49.8	56.8	57.0	46.5	46.5	41.6
Oulun — Uleåborgs }	91.6	{ 76.4	67.9	76.2	73.6	69.5	58.5	62.8
Lapin — Lapplands }		{ 106.5	67.9	66.8	78.1	64.7	67.6	62.3
Luovutetut alueet — Avträdda områden	56.6	56.6	59.2	56.4	51.1	.

¹⁾ Ennen vuotta 1946 Viipurin lääni. — Före år 1946 Viborgs län. — Prior to the year 1946 county of Viipuri.

Imeväiskuolleisuus oli viisivuotiskautena 1946—50 huomattavasti pienempi kuin kahtena edellisenä viisivuotiskautena. Kunakin vuosista 1946—50 olivat ko. kuolleisuusluvut seuraavat: v. 1946 56.2 %, v. 1947 58.5 %, v. 1948 51.9 %, v. 1949 48.3 % ja v. 1950 43.5 %. Vaikkakin imeväiskuolleisuus siis meillä on jatkuvasti alentunut, se on kuitenkin vielä huomattavan korkea verrattuna naapurimaamme Ruotsin imeväiskuolleisuuteen. Niinpä imeväiskuolleisuus siellä oli esim. v. 1941 32.7 %, v. 1946 23.4 % ja v. 1950 18.1 %.

Imeväiskuolleisuutta valaisevat tarkemmin taulut 12, 13 ja 14. Taulu n:o 12 osoittaa alle 1-vuotiaitten tärkeimpien kuolemansyiden kuolleisuusluvut, siis kuolleiden lukumäärän verrattuna 1 000 elävänä syntyneeseen. Kuten edellisenäkin viisivuotiskautena kuolleisuus oli suurin kehitysvirheiden aiheuttamien ja vastasynteeniden tauteihin (vv. 1941—45 24.4 %). Ko. tauteihin kuolleiden lukumäärä lisääntyi käsittelynäisenä viisivuotiskautena ensi sijassa sodanjälkeisen suuren syntyneisyyden vuoksi. Alle vuoden vanhana kuoli p.o. tauteihin v. 1946 2 549, v. 1947 2 448, v. 1948 2 461,

Spädbarnsdödligheten var under femårsperioden 1946—50 betydligt lägre än under de två föregående femårsperioderna. Under vart och ett av åren 1946—50 voro ifrågavarande dödlighetssiffror följande: år 1946 56.2 %, år 1947 58.5 %, år 1948 51.9 %, år 1949 48.3 % och år 1950 43.5 %. Ehuru spädbarnsdödligheten hos oss sálunda fortgående har sjunkit, är den dock ännu rätt hög i jämförelse med spädbarnsdödligheten i vårt grannland Sverige. Sálunda var spädbarnsdödligheten där t. ex. år 1941 32.7 %, år 1946 23.4 % och år 1950 18.1 %.

Spädbarnsdödligheten belyses mera detaljerat i tabellerna 12, 13 och 14. Tabell nr 12 innehåller mortalitetssiffror för de viktigaste dödsorsakerna bland barn i åldern under 1 år, d. v. s. antalet döda i förhållande till 1 000 levande födda. Såsom också under föregående femårsperiod var dödligheten störst i sjukdomar, som förorsakades av bildningsfel samt i sjukdomar hos nyfödda (år 1941—45 24.4 %). Antalet döda i nämnda sjukdomar ökade under den femårsperiod som här behandlas i främsta rummet på grund av den höga nativiteten efter kriget. I åldern under 1 år dog i ifråga-

v. 1949 2 341 ja v. 1950 2 063 lasta; viisivuotiskautena 1946—50 oli vastaava luku keskimäärin 2 372 ja sitä edellisenä viisivuotiskautena 1 965. Toisella sijalla oli nyt äkillinen maha- ja suolitulehdus, joka edellisenä viisivuotiskautena oli ollut kolmannella sijalla. Ero tämän taudin kuolleisuusluvuissa edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna oli hyvin pieni (vv. 1946—50 8.5 % ja vv. 1941—45 8.8 %; vrt. siv. 14). Keuhkokuumeukolleisuus, joka aikaisemmin oli ollut toisella sijalla, oli käsittelynäisenä viisivuotiskautena kolmannella sijalla; tuhatta elävänä syntynytä kohden laskettuna se oli edellisestä viisivuotiskaudesta alentunut 9.7 %:sta 8.3 %:een. Neljäntenä ryhmänä olivat — kuten aikaisemmin — »muut tartuntataudit», mutta tuhatta elävänä syntynytä kohden laskettuna niiden aiheuttamien kuolemantapausten luku oli laskenut 8.6 %:sta 5.2 %:een. Pikkulasten kouristuksista johtuva kuolleisuus aleni 2.2 %:sta vv. 1941—45 1.4 %:een käsittelynäisenä viisivuotiskautena.

12. Infant deaths (under one year of age) per 1 000 live births.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	Mp. Mk. Male	Np. Kvk. Female	Mol. sp. B. k. Both sexes	Aviolapsia Äkta Legitimate	Aviottomia Oäkta Illegitimate
1946—50						
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum	25.2	20.0	22.6	22.0	34.2
1150	Gastroenteritis acuta	9.4	7.6	8.5	8.2	14.4
1400—1480	Morbi tuberculosis	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
1)	Alii morbi infectionis	5.4	4.9	5.2	5.1	6.5
2640	Eclampsia infantum	1.6	1.1	1.4	1.3	2.3
3520, 3530	Pneumonia	9.3	7.3	8.3	8.2	10.4
4030	Atrophy infantum	0.5	0.4	0.5	0.4	1.0
8800	Infanticidium	0.2	0.1	0.2	0.0	2.7
2)	Alii morbi	3.8	2.6	3.2	3.1	4.8
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8
	Yhteensä — Summa — Total	57.4	45.9	51.9	50.3	78.4

Taulussa n:o 13 on esitetty tärkeimpien pienten lasten kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaustet keskimäärin kutakin vuoden kuukautta ja 100 000 elävänä syntynytä kohden. Vuodenajan vaihtelut kuvasi tuvat ulkonaisille häiritseville vaikutuksille alittiuden imeväiskäisten kuolemansyissä. Verrattain tasaista on

Tabell nr 13 visar antalet dödsfall, som förorsakats av de viktigaste dödsorsakerna bland spädbarn, i medeltal under de olika månaderna samt på 100 000 levande födda. Årstidernas växlingar återspeglar sig i dödsorsakerna hos spädbarn som är omvälvliga för ytterstörande inflytelser. Relativt jämn är frekvensen under

14. Infant deaths (under one year of age), in

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	Allamainitun ikäisistä kuolleet Döda vid nedanmäntä Åldrar fördelade Percentage distribution of deaths by principal			
		0 vrk. dygn day	1—7 vrk. dygn days	8—14 vrk. dygn days	15—29 vrk. dygn days
		1—2 kk. mån. months	3—5 kk. mån. months	6—11 kk. mån. months	Yhteensä Summa Total
1946—50					
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum	96.5	92.8	71.4	44.2
1150	Gastroenteritis acuta	0.1	0.5	4.3	16.4
1400—1480	Morbi tuberculosis	—	(0.04)	0.1	(0.04)
1)	Alii morbi infectionis	0.2	1.6	7.2	13.3
2640	Eclampsia infantum	(0.03)	1.0	2.5	4.3
3520, 3530	Pneumonia	0.1	2.4	9.5	14.7
4030	Atrophy infantum	—	0.1	0.5	0.7
8800	Infanticidium	2.3	—	—	—
2)	Alii morbi	0.3	1.1	3.2	4.5
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	0.5	0.5	1.3	1.9
	Yhteensä — Summa — Total	100.0	100.0	100.0	100.0

¹⁾ 1 000—1 140, 1 165—1 310, 1 500—1 610. — ²⁾ IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005—4 020, 4 040—4 500,

13. Infant deaths (under one year of age) per month and per 100 000 live births, average numbers for the years 1946—50.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause of death	Tammikuu January	Helmikuu February	Mars March	April	Huhtikuu April	Toukokuu May	Juni June	Heinäkuu July	Elokuu August	Syyskuu September	Oktoktu October	Marraskuu November	Joulukuu December	Viiteensä Summa Total
1946—50															
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum	202.2	208.9	219.4	201.4	208.6	192.9	194.3	164.0	158.8	162.1	169.1	184.8	188.8	
1150	Gastroenteritis acuta	65.0	47.7	60.3	65.6	68.8	75.1	81.0	96.1	88.5	74.4	68.9	58.5	71.0	
1400—1480	Morbi tuberculosis	13.5	16.8	12.6	16.3	15.0	14.7	9.2	8.0	8.9	7.5	10.3	10.3	11.9	
1)	Alii morbi infectionis	55.6	65.4	64.8	60.0	51.0	38.5	25.5	28.3	30.2	30.4	31.8	36.2	43.0	
2640	Eclampsia infantum	19.3	19.1	16.6	17.2	15.7	10.3	5.4	5.6	4.2	5.3	7.9	11.4	11.4	
3520, 3530	Pneumonia	106.8	118.7	116.7	102.4	83.0	57.5	31.3	28.5	34.1	42.7	50.5	66.1	69.6	
4030	Atrophy infantum	5.4	3.5	2.2	3.9	3.4	3.1	5.1	3.8	4.0	4.1	3.3	3.2	3.7	
8800	Infanticidium	3.8	2.6	3.2	3.1	4.8									
2)	Alii morbi	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8									
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	7.8	4.8	5.0	3.1	3.9	3.9	4.3	1.5	4.3	6.0	5.4	7.6	4.8	
	Yhteensä — Summa — Total	510.3	521.2	534.1	504.0	480.1	422.0	379.5	360.2	352.8	355.5	368.9	402.5	432.1	

eri kuukausina ollut kehitysvirheiden aiheuttamien ja vastasyntyneiden taudeista johtuvien kuolemantapausten esiintymisen; kuitenkin havaitaan selvää laskua loppukesällä ja alkusyksystä. Keuhkokuumeukolleisuus alkaa voimakkaammin nousta marras-joulukuussa saavuttaen huippunsa helmi-maaliskuussa; sen jälkeen se melko tasaisesti on laskenut saavuttaen aallonpohjan kesän lopulla. Äkillisessä maha- ja suolitulehdussa oli kuolleisuus suurin heinä-, elo- ja syyskuussa. Tuberkuloskuolleisuus on pienempi loppukesällä ja alkusyksystä kuin talvella ja keväällä. »Muiden tartuntatautien» kuolleisuuden frekvenssivaihetut olivat suhteellisen lieviä; keskikesällä kuolleisuus näihin tauteihin oli alimmissa, pysyi syyskuuden tasaisena, oli talvella tasaisesti korkeammalla ja laski sitten vähitellen kesään mennessä.

Taulu n:o 14 esittää yhdistelmänä pienten lasten kuolemansyyt iän mukaan. Ensimmäisen vuorokauden aikana sattuneista kuolemantapaustaista vastasyntyneiden taudit ja kehitysvirheet aiheuttavat 96.5 % ja ensimmäisen viikon aikana 92.8 %. Toisen viikon aikana alkavat jo vaikuttaa keuhkokuume, »muut tartuntatautit» ja äkillinen maha- ja suolitulehdus sekä pikkulasten kouristukset. Yli puolen vuoden vanhoilla lapsilla laskee äkillisen maha- ja suolitulehdus osuus, kun sensijaan »muiden tartuntatautien» osuus kasvaa; keuhkokuumeen osuus on yli puolen vuoden ikäisillä huomattavan suuri.

de olika månaderna för dödsfall, som förorsakats av bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda; dock förmärkes en tydlig nedgång på sensommaren och i början av hösten. Dödligheten i lunginflammation börjar stiga kraftigt i november—december och kulminerar i februari—mars; där efter sjunker den relativt jämnt och når botten i slutet av sommaren. I akut mag- och tarminflammation var dödligheten störst i juli, augusti och september. Dödligheten i tuberkulos är lägre på sensommaren och i början av hösten än på vintern och våren. »Andra infektionssjukdomar» uppvisade relativt små fluktuationer i dödlighetsfrekvensen; på högsommaren var dödligheten i dessa sjukdomar lägst, höll sig under hösten tämligen stabil, var under vintern på en jämn men högre nivå och sjönk sedan småningom mot sommaren.

Av tabell nr 14 framgår i sammandrag dödsorsakerna för spädbarn enligt ålder. Dödsfallen under det första dygnet berodde till 96.5 % och under den första veckan till 92.8 % på sjukdomar hos nyfödda och bildningsfel. Under den andra veckan börja redan lunginflammation, »övriga infektionssjukdomar» och akut mag- och tarminflammation samt kramper hos småbarn att inverka. Hos barn i över ett halvt års ålder sjunker andelen för akut mag- och tarminflammation, då däremot andelen för »andra infektionssjukdomar» stiger; andelen för lunginflammation hos barn i över ett halvt års ålder är avsevärt stor.

percentage, average numbers for the years 1946—50.

Tärkeimpien kuolemansyihin, % enligt viktigaste dödsorsaker, i % causes of death for different age groups				Tärkeimpien kuolemansyihin kuolleista allamainitun ikäisii, % Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid nedanmäntä Åldrar, i % Percentage age distribution of deaths from different causes of death			
1—2 kk. mån. months	3—5 kk. mån. months	6—11 kk. mån. months					

TAULULIITTEITÄ
TABELLBILAGOR
TABLES

1. Kuolleet keskimäärin vuosina 1946—50 kuolemansyn sekä iän ja
Döda i medeltal åren 1946—50 efter dödsorsak, ålder och
Deaths by causes of death, age and sex per 100 000

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	0		1—4		5—9		10—14		15—19		20—24	
		Mp Mk M	Np Kvk F										
I	Vitia primae conformatio- nis, morbi neonatorum ..	2 628	2 062	6	5	0	0	—	—	—	—	—	—
II	Morbi senectutis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Morbi infectionis	1 695	1 434	173	158	60	58	45	56	134	137	242	176
1000	Typhus abdominalis	1	—	1	—	0	0	1	2	2	2	2	1
1010	Paratyphus	4	4	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2
1080	Morbilli	10	14	6	5	1	1	1	1	0	0	0	0
1090	Scarlatina	0	1	2	1	1	0	1	0	—	0	0	0
1100	Pertussis	100	119	8	14	0	0	—	—	—	—	0	0
1110	Diphtheria	34	26	31	22	11	10	2	2	3	4	1	3
1125	Influenza	67	50	6	5	1	2	1	1	0	1	1	1
1150	Gastroenteritis acuta	981	783	22	19	3	3	1	1	1	1	0	0
1210	Erysipelas	8	4	0	—	0	0	—	—	0	—	—	—
1215, 1220	Angina septica. Septicaemia. Pyaemia	107	88	6	4	3	2	2	1	2	2	4	4
1400	Tuberculosis pulmonum, laryn- gis. Pleuritis tuberculosa	31	32	13	14	8	10	15	26	94	101	207	144
1410—80	Alli morbi tuberculosis	117	116	62	56	25	22	16	16	22	20	20	18
1520—30	Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma inguinale	29	15	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0
IV	Morbi systematis haemato- poëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae	20	12	8	5	4	3	4	2	2	3	4	3
V	Morbi nutritionis et secretio- nis internae	20	11	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5
2360	Diabetes mellitus	2	0	3	1	3	3	4	3	3	3	3	3
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi or- ganorum sensoriorum	258	172	18	18	6	6	5	6	12	8	12	10
2600	Haemorrhagia cerebri, menin- gum	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	1	1
2700, 2750	Dementia paralytica. Alli mor- bi mentis	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
VII	Morbi organorum circulatio- nis	2	2	4	3	6	4	7	7	12	8	17	12
VIII	Morbi organorum respiratio- nis	1 033	810	55	59	7	6	5	6	7	7	8	4
3520—30	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crou- posa	969	759	45	50	5	4	4	5	5	6	6	3
IX	Morbi organorum digestio- nis	176	115	14	12	7	6	7	6	9	7	11	8
4005—70	Morbi ventriculi et intestinorum X	148	100	10	9	6	4	6	5	8	6	9	4
XI	Morbi organorum uropoëti- corum	6	4	2	3	1	2	2	4	3	4	8	6
XII	Morbi organorum genitalium	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	5
XIII	Morbi gravidarum et puer- perarum	—	—	—	—	—	—	—	3	—	20	—	10
XIV	Morbi ossium et articulorum et subcutanei	4	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
XV	Tumores	8	7	6	6	4	4	3	7	6	6	6	6
7000—60	Carcinoma	—	—	0	1	0	0	0	1	1	3	—	1
XVI	Intoxications chronicae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
XVII ¹⁾	Mors violenta, non naturalis A Casus mortiferi	74	57	91	60	66	22	46	10	78	17	133	20
A	Casus mortiferi	50	38	89	59	65	22	45	10	59	12	88	11
8500	Submersio	3	2	42	25	38	11	24	6	22	4	27	3
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	2	4	20	11	19	8	12	3	25	5	41	4
B	Suicidium	—	—	—	—	—	1	0	16	4	36	8	—
C ¹⁾	Homicidium	24	19	2	1	1	0	0	0	3	1	9	1
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita ..	67	52	5	3	2	1	1	1	3	2	5	3
8950	Mortui in bello	5 992	4 742	386	335	167	116	131	106	273	206	450	274
	Kaikkiaan — Inalles — Total	5 992	4 742	386	335	167	116	131	106	274	206	453	274

sukupuolen mukaan kesiväkiluvun 100 000:ta henkeä kohden.
kön per 100 000 personer av medelfolkmängden.
mean population, average for the years 1946—50.

25—34		35—44		45—54		55—64		65—74		75—84		85—		Yhteensä — Summa Total		
Mp Mk M	Np Kvk F	Mp Mk M	Np Kvk F	Msp-Bk Both sexes												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	50	61
234	172	235	135	340	116	437	141	207	351	3 859	10 900	14 809	105	156	132	
2	2	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	—	2	1	1	
0	2	1	1	1	2	3	3	3	2	1	—	—	0	0	0	
—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4
1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	5
0	1	1	1	2	2	8	9	22	76	60	90	197	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	9	—	12	1	1	1	
3	3	4	4	7	5	9	9	14	1							

2. Kuolemansyyt elinkeinohaarottain vuosina 1946—1950. — Dödsorsakerna efter näringsgren

Elinkeinohaarja ja ammattiasema Näringsgren och yrkesställning Industry and industrial state	Ammatissa toimivat, ent. ammatinharjoittajat ja itsen. ammatittomat — Kuolemansyyt — Döds-									
	Morbi senectus	Morbi infectionis	Morbi nutritio et secretio	Morbi systematis haemato- pathia et sanguinis et diathesae	Morbi haemorrhagiae	Morbi organorum circulatio	Morbi organorum respirationis	Morbi organorum digestio	Morbi organorum uropatoco	
	6 107	6 231	278	173	3 681	12 408	1 967	1 250	673	
I. Maa- ja metsätalous — Jord- och skogsbruk — Agriculture, forestry, fishing etc.	5 319	4 205	205	130	2 979	10 680	1 600	985	500	
Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers, administrative and clerical employees	788	2 026	73	43	702	1 728	367	265	173	
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Manufacturing and handicraft	1 640	5 169	153	110	2 251	7 071	1 278	673	457	
Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers etc.	1 585	4 967	146	103	2 096	6 563	1 206	638	424	
III. Kauppa — Handel — Commerce	211	1 161	43	59	551	1 682	274	180	132	
Työntekijöitä — Arbetarpersonal — Workers	181	668	29	36	460	1 397	223	144	94	
Työntekijöitä — Arbetarpersonal — Workers	30	493	14	23	91	285	51	36	38	
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication	285	1 275	51	25	492	1 691	294	167	130	
Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers etc.	79	271	12	12	136	464	69	40	35	
Työntekijöitä — Arbetarpersonal — Workers	206	1 004	39	13	356	1 227	225	127	95	
V. Palvelukset yhteiskunnalle — Tjänster åt samhället — Community and business services	395	730	53	45	637	1 756	294	166	138	
Virkamiehet, toimistohenkilöt — Tjänstemän, kontorspersonal — Civil servants, office clerks etc.	233	440	38	24	417	1 154	194	110	97	
Palveluskunta — Tjänstepersonal — Others	162	290	15	21	220	602	100	56	41	
VI. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Personal services	655	1 015	55	56	729	1 648	311	160	112	
A. Ravintolat ja hotellit — Värddhus- och hotellrörelse — Restaurants and hotels ..	33	139	7	10	64	161	30	18	24	
Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers etc.	10	8	2	1	12	49	4	1	3	
Työntek. — Arbetarpersonal — Workers	23	131	5	9	52	112	26	17	21	
B. Muut — Övriga — Others	622	876	48	46	665	1 487	281	142	88	
Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers etc.	4	5	1	—	2	663	1 469	277	140	87
Työntek. — Arbetarpersonal — Workers	618	871	47	46	663	1 469	277	140	87	
VII. Ammatittomat tai tuntematon ammatti — Utan yrke eller okänt yrke — Without profession or unknown profession	3 410	4 877	170	119	2 229	6 138	1 155	789	439	
Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers etc.	94	117	15	10	167	463	86	48	55	
Työntekijöitä — Arbetarpersonal — Workers	1 771	3 881	109	72	1 347	4 308	804	565	311	
Opiskelijoita, laitoshoidokkeja, tuntematon ammatti — Studerande, inräddningsinterner, personer med okänt yrke — Students, inmates of institutions, unknown profession	1 545	879	46	37	715	1 367	265	176	93	
Yhteensä — Summa — Total	12 703	20 458	803	587	10 570	32 394	5 573	3 385	2 081	
1. Yrittäjä ja toimihenkilötä — Företagare och förvaltningspersonal — Employers and ownaccount workers, administrative and clerical employees	5 975	5 916	309	220	4 328	14 733	2 252	1 365	798	
2. Työntekijöitä — Arbetarpersonal — Workers	5 183	13 663	448	330	5 527	16 294	3 056	1 844	1 190	
3. Opiskelijoita, laitoshoidokkeja, tuntematon ammatti — Studerande, inräddningsinterner, personer med okänt yrke — Students, inmates of institutions, unknown profession	1 545	879	46	37	715	1 367	265	176	93	

^a) Ammatissa toimivien, ent. ammatinharjoittajien ja itsen. ammatittomien perheenjäsenet, joilla ei ole omaa ammattia, on viety perheen päähenkilöön.

^b) Yrkesutvare, f. d. yrkesutvare och självständiga yrkeslösas familjemedlemmar utan eget yrke har härförts till familjens huvudmans yrke.

^c) Economically active persons, persons having been formerly economically active and economically inactive independent persons. — *) Including deaths from injuries resulting from operations of war (number 8950 of the Finnish list of causes of death, 1935).

åren 1946—1950. — Causes of death according to industry in the years 1946—1950.

Yrkesutvare, f. d. yrkesutvare och självständiga yrkeslösas — *) orsak — Cause of death	Ammatitt. perheenjäs. *) — Familje- medlemmar utan eget yrke *) Dependents													
	Väinölä — Hustrur Wives													
	Multa — Övriga Others	Alle 15-vuot. lapsia Barn under 15 år Children under 15 years of age	Leskü — Ärkor Widowers	Valmoja — Hustrur Wives	Yhteensä — Summa Total	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	Homicidium *)	Suicidium	Intoxications chronicae	Tumores	Morbi systematis cutanei et subcutanei	Morbi ossium et articulorum	Morbi gravidae et puerperatum	Morbi organorum genitalium
421	36	130	10	6 130	13	1 687	790	181	455	42 621	11 207	18 765	13 618	1 995
396	2	95	7	5 134	12	1 015	495	101	309	34 169	10 495	17 455	11 678	1 907
25	34	35	3	996	1	672	295	80	146	8 452	712	1 310	1 940	88
161	54	59	3	3 647	39	1 743	705	169	278	25 660	4 877	7 130	7 569	284
10	—	1	—	209	3	99	45	6	10	1 457	312	399	528	20
151	54	58	20	3 438	36	1 644	660	163	268	24 203	4 565	6 731	7 041	264
33	30	1	764	12	303	221	29	54	5 760	910	1 121	1 604	64	
31	12	11	—	583	11	201	169	20	43	4 313	708	1 022	1 053	51
2	18	9	1	181	1	102	52	9	11	1 447	202	401	551	13
47	5	3	1	806	8	880	197	48	85	6 490	1 407	1 664	2 750	101
16	3	—	—	231	1	109	31	4	12	1 526	297	401	531	30
31	2	—	—	575	7	771	166	44	73	4 964	1 110	1 263	2 219	71
32	15	10	—	861	8	244	206	18	44	5 652	803	1 170	1 315	53
24	5	6	—	553	6	129	107	6	27	3 570	472	726	649	34
8	10	4	—	308	2	115	99	12	17	2 082	331	444	666	19
21	49	30	2	1 009	4	239	90	29	38	6 252	301	269	1 065	25
4	21	3	—	125	2	44	23	14	3	725	15	17	185	1
—	—	1	—	19	1	2	3	1	1	118	9	10	5	—
4	21	2	—	106	1	42	20	13	2	607	6	7	180	1
17	28	2	2	884	2	195	67							