

FLORÆ FENNICÆ
BREVIARIUM,

DISSERTATIONIBUS ACADEMICIS ABSOLVENDUM,
QUARUM SEXTAM,

Venia Amplissimæ Facultatis Philosophicæ Aboënsis,

Publicæ Censuræ subjiciunt

AUCTOR,

LAURENTIUS JOHANNES PRYTZ,

MEDICINÆ & PHILOSOPHIÆ DOCTOR,

ATQUE

RESPONDENS

ISAACUS REGINALDUS ENEBERG,

BOREA-FENNO.

In Auditorio Medico, die XII Maji MDCCCXXI,

horis post meridiem confvetis.

ABOÆ, Typis FRENCKELLIANIS.

PROBATION DEPARTMENT

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 1906

REPORT

OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF CORRECTIONS

FOR THE YEAR

ENDING DECEMBER 31, 1905

ALBANY:

AND

SYRACUSE:

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1906.

LXXXVIII. CIRCÆA: Calyx diphyllus, superus, caducus; Petala 2; Stamina 2; Capsula hispida, bilocularis, disperma, indehiscens.

†† *Aquaticæ, floribus obsoletis.*

LXXXIX. MYRIOPHYLLUM: Flores monoici; Calyx 4-phyllus; Petala 4; Stamina 8; Stigmata 4, sessilia; Semina 4, nucularia, supera.

XC. HIPPURIS: Calyx minimus, dentatus; Petala nulla; Stamen 1; Pistillum 1; Semen 1, nuculare, calyce coronatum.

XCI. CALLITRICHE: Flores submonoici; Calyx nullus; Petala duo, falciformia; Stamen 1; Styli duo; Semina 4, per paria connata, nuda, compressa, extrorsum marginata.

Gen. LXXXVII. EPILOBIUM.

* *Petalis inæqualibus.*

216. E. ANGUSTIFOLIUM (L.): caule erecto, simplici, glabro; foliis sparsis, lineari-lanceolatis, glabris, subintegerrimis; floribus irregularibus; genitalibus declinatis. — *Hab.* in locis submontosis denudatis frequens.

** *Petalis æqualibus.*

217. E. HIRSUTUM (L.): radice repente; caule erecto, ramosissimo, hirsuto; foliis semiamplexicaulis, ovato-lanceolatis, serratis, hirsutis. — *Hab.* in oris maritimis Ostrobothniæ locis humidis rarius.

218. E. PUBESCENS (WILLD.): radice fibrosa; caule erecto, simplici, villosa; foliis sessilibus, lanceolatis, denticulatis, pubescentibus. — *Hab.* in scrobibus agrorum Alandiæ rarius.

219. *E. MONTANUM* (L.): caule erecto, tereti, ramoso, glabro; foliis inferioribus petiolatis, ovatis, dentatis, glabris; stigmatate cruciato. — *Hab.* in sylvarum rupestribus sat frequens.

220. *E. TETRAGONUM* (WILLD.): caule erecto, tetragono, glabriusculo, superne ramoso; foliis sessilibus, lanceolatis, denticulatis, glabris; stigmatate integro, clavato. — *Hab.* Utsjoki locis humidis S. CASTRÉN.

221. *E. PALUSTRE* (L.): caule erecto, tereti, glabriusculo; foliis sessilibus, lanceolatis, subintegerrimis; stigmatate integro, acuminato; capsulis pubescentibus. — *Hab.* locis uliginosis vulgaris.

222. *E. ALPINUM* (L.): caule ascendente, bifariam pubescente, paucifloro; foliis oppositis, ellipticis, subintegerrimis; stigmatate integro, clavato; capsulis glaberrimis. — *Hab.* in alpium lapponicarum confinio. locis graminosis irriguis passim.

Gen. LXXXVIII. CIRCEA.

223. *C. LUTETIANA* (L.): caule erecto, pubescente; foliis ovatis, denticulatis, opacis, pubescentibus. — *Hab.* in locis umbrosis roridis Finl. medialis rarius.

224. *C. ALPINA* (L.): caule geniculato, ascendente, glaberrimo; foliis cordatis, dentatis, nitidis, glabris; calyce membranaceo. — *Hab.* ad scaturigines sylvaticas Finl. inferioris passim.

Gen. LXXXIX. MYRIOPHYLLUM.

225. *M. SPICATUM* (L.): floribus masculis verticillato-spicatis, ebractealis; foliis omnibus pectinato-capillaceis. — *Hab.* in rivulis sylvaticis passim.

226. *M. VERTICILLATUM* (L.): floribus omnibus axillaribus, bracteis foliaceis, pectinato-pinnatifidis. — *Hab.* in stagnis graminosis rarius.

Gen.

Gen. XC. HIPPURIS.

227. *H. VULGARIS* (L.): verticillis polyphyllis; foliis linearibus, attenuatis. — *Hab.* in aquis stagnantibus frequens.

228. *H. MARITIMA* (HELL.): verticillis oligophyllis; foliis submersis spatulatis, emerfis ovatis, obtusis. — *Hab.* in ripis lutosis archipelagi aboënsis passim.

Gen. XCI. CALLITRICHE.

229. *C. VERNA* (L.): foliis trinerviis, inferioribus linearibus, summis obovatis; seminibus obtusangulis. — *Hab.* in aquis stagnantibus vulgarissime.

230. *C. AUTUMNALIS* (L.): foliis uninerviis, linearibus, truncatis; seminibus margine membranaceis. — *Hab.* cum priore frequens.

ORDO XVIII. SALICARIÆ.

Calyx liber, tubulosus, persistens; *petala summo calyci inserta*, numero definita, interdum nulla; *stamina medio calycis inserta*, ejusdem laciniis numero dupla aut æqualia; ovarium simplex; stylus 1; capsula calyce tecta, uni- aut multi-ocularis; semina numerosa, *receptaculo centrali adfixa*; perispermium nullum; corculum rectum; radícula infera. — *Herbæ sæpius oppositifoliæ (De Candolle).*

XCI. CERATOPHYLLUM: flores monoici, solitarii; Calyx maris multipartitus, foeminae hexaphyllus; Corolla nulla; Stamina numerosa: antheris tricuspidatis; Pistillum 1; Semen 1, nuculare.

XCII. PEPLIS: Calyx campanulatus, coloratus, 12-fidus: dentibus alternis brevioribus, reflexis; Petala 6, obsoleta; Stamina 6; Capsula bilocularis, evalvis, polysperma.

XCIV. GLAUX: Calyx campanulatus, coloratus, 5-lobus: lobis reflexis; Corolla nulla; Stamina 5; Capsula unilocularis, 5-valvis, pentasperma.

XCv. LYTHRUM: Calyx cylindricus, costatus, 12-dentatus: dentibus alternis interioribus brevioribus; Petala 6; Stamina 12; Capsula bilocularis, bivalvis, polysperma.

Gen. XCII. CERATOPHYLLUM.

231. *C. DEMERSUM* (L.): foliis trichotomis; fructibus trispinosis. -- *Hab.* in puteolis submersum prope Aboam rarius.

Gen. XCIII. PEPLIS.

232. *P. PORTULA* (L.): foliis petiolatis, obovatis; floribus axillaribus, solitariis. -- *Hab.* locis inundatis Finl. inferioris sat frequens.

Gen. XCIV. GLAUX.

233. *G. MARITIMA* (L.): caule erecto, foliis ovato-oblongis; floribus axillaribus. -- *Hab.* in ripis maritimis argillosis frequens.

Gen. XCV. LYTHRUM.

234. *L. SALICARIA* (L.): foliis oppositis, cordato-lanceolatis; floribus verticillato-spicatis. -- *Hab.* in littoribus maris & lacuum frequens.

ORDO XIX. GROSSULARIÆ.

Calyx ovario adhaerens, 5-fidus; petala 5 & stamina 5, calyci inserta; stylus bifidus; stigmata 2; bacca globosa, 1-locularis, polysperma, receptaculis 2 oppositis feminiferis; corculum rectum, minimum, ad basim perispermii corni. -- Frutices foliis alternis, palmato-5-lobis. (*De Candolle*).

Gen.

Gen. XCVI. RIBES.

XCVI. RIBES: Calyx superus, 5-fidus; Petala 5; Stamina 5; Stylus bifidus; Bacca globosa, unilocularis, polysperma.

* *Ramis inermibus.*

235. R. ALPINA (L.): inermis; foliis subtus lucidis; racemis erectis; bracteis florum longitudine; floribus subdioicis. — *Hab.* in dumetis montosis frequens.

236. R. RUBRA (L.): inermis; foliis subtus puberulis; racemis pendulis calycibusque glabris; floribus planiusculis, subbracteatis. — *Hab.* in dumetis sat frequens.

237. R. NIGRA (L.): inermis; foliis subtus glandulosis, olentibus; racemis pendulis, pilosis; floribus oblongis — *Hab.* in dumetis ad rivulos frequens, præsertim in Finl. boreali.

** *Ramis aculeatis.*

238. R. GROSSULARIA (L.): aculeata; pedunculis unifloris, pilosis; bracteis binatis; fructibus glanduloso-pilosis. — *Hab.* in dumetis prope pagos Finl. australis minus frequens.

ORDO XX. PORTULACÆ.

Calyx apice divisus; corolla calyci inserta, pentapetala, monopetala aut nulla; stamina corollæ inserta; ovarium liberum aut basi adhærens; stylus 0 aut 1-3; capsula uni- aut multi-ocularis, loculis mono- aut polyspermis; perispermum farinaceum centrale; corculum incurvum aut annulare. — *Herbæ* aut frutices, habitu vario. (*De Candolle*).

XCVII. MONTIA: Calyx diphyllus, persistens; Corolla monopetala, 5-partita: laciniis tribus alternis minoribus, staminiferis; Stamina 3-5; styli 3; Capsula unilocularis, 3-valvis, 3-sperma.

XCVIII.

XCVIII. SCLERANTHUS: Calyx tubulosus, collo coarctatus, 5-dentatus, persistens; Corolla nulla; Stamina 5-10; Styli 2; Capsula monosperma, calyce nuculariter inclusa.

Gen. XCVII. MONTIA.

239. **M. FONTANA** (L.): caule prostrato; ramis radican-
tibus; foliis oblongo-ovatis, subcarnosis; pedunculis uni-
floris. -- *Hab.* ad scaturigines & in locis humidis denuda-
tis sat frequens.

Gen. XCVIII. SCLERANTHUS.

240. **S. ANNUUS** (L.): caulibus diffusis, dichotomis; flo-
ribus fasciculatis; dentibus calycis fructiferis patulis, acutis,
margine concolore. -- *Hab.* in arvis arenosis frequens.

ORDO XXI. CRASSULACEÆ.

Calyx liber, partitus; corolla basi calycis inserta, mo-
no- aut sæpius polypetala, lobis aut petalis numero par-
tes calycis æquantibus; stamina partium corollæ numero
æqualia aut dupla; ovaria distincta, tot quot lobi corollæ;
squama nectarifera ad basin externam cujusque ovarii; folli-
culi tot quot ovaria, uniloculares, intus rima longitudinali
dehiscentes, polyspermi; perispermum tenue, carnosum;
corculum rectum; radícula infera. -- *Herbæ* foliis sæpius
alternis carnosis glabris, floribus cymosis. (*De Candolle*).

XCIX. TILLÆA: Calyx 3—5-partitus; Petala
3-5; Nectaria nulla; Stamina 3-5; Capsula 3-5, uni-
loculares, polyspermæ.

C. RHODIOLA: Flores dioici; Calyx 4-parti-
tus; Petala 4; Nectaria 4, emarginata; Stamina 8;
Capsulæ 4, uniloculares, polyspermæ.

CI. SE-

CL. SEDUM: Calyx 5-partitus; Petala 5; Squamæ 5 nectariferæ ad basin germinis; Stamina 10; Capsulæ 5, uniloculares, polyspermæ.

Gen. XCIX. TILLÆA.

241. T. AQUATICA (L.): caule erectiusculo; foliis linearibus; floribus axillaribus, sessilibus. — *Hab.* in aquis prope Wafam rarius ÆMILÉ.

Gen. C. RHODIOLA.

242. R. ROSEA (L.): radice tuberosa; floribus corymbo-capitatis. — *Hab.* in declivibus alpium lapponicarum passim.

Gen. CI. SEDUM.

* *Foliis planis.*

243. S. TELEPHIUM (L.): caule erecto; foliis planis, ovato-oblongis, serratis; corymbo folioso. — *Hab.* in montibus calvis frequens.

** *Foliis teretibus.*

244. S. ALBUM (L.): caule adscendente; foliis teretibus, distantibus, patentibus, oblongis, obtusis; panicula ramosissima, nuda. — *Hab.* in monticulis campestribus passim.

245. S. ANNUUM (L.): caule erecto; foliis teretibus, sparsis, adpressis, ovatis; panicula rariflora, foliosa; petalis linearibus. — *Hab.* locis aridis campestribus Finl. australis rarius.

246. S. ACRE (L.): caule decumbente; foliis teretibus, imbricatis, adpressis, subovatis; cyma foliosa. — *Hab.* in collibus montosis apricis & in tectis cæspiticiis antiquis vulgatissime.

ORDO

ORDO XXII. SAXIFRAGÆ.

Calyx adhærens aut rarius liber, limbo 5-lobo; *petala* 4-5, *apice calycis inserta*, ejusdem laciniis alterna, *interdum nulla*; stamina cum petalis inserta, eorum numero dupla aut æqualia; *styli* 2, *persistentes*; *capsula birostris, bivalvis, uni- aut bilocularis, poro terminali dehiscens*, valvis in bilocularibus introsum flexis; femina dissepimento aut imæ capsulæ inserta; *perispermum carnosum*; corculum rectum; radícula infera. — Herbæ habitu vario. (*De Candolle*).

CII. SAXIFRAGA: Calyx 5-partitus; Petala 5; Stamina 10; Styli 2, persistentes; Capsula birostris, bilocularis, polysperma, foramine inter rostra dehiscens.

CIII. CHRYSOSPLENIUM: Calyx 4-5-fidus, coloratus; Corolla nulla; Stamina 10; Styli 2; Capsula semiinfera, semibivalvis, subbirostris, unilocularis, polysperma.

CIV. ADOXA: Calyx diphyllus, persistens; Corolla 4-5-fida, plana; Stamina 8-10; Styli 4-5; Capsula baccata, infera, globosa, tetrasperma, calyce coronata.

Gen. CII. SAXIFRAGA.

* *Acaules, foliis indivisis.*

247. S. STELLARIS (L.): scapo paniculato, hirsuto; foliis oblongis, serratis; calyce reflexo; petalis lanceolatis, inferis. — *Hab.* in irriguis inferalpinis Lapponiæ passim.

248. S. NIVALIS (L.): scapo corymbofo, piloso; foliis obovatis, truncatis, crenatis, subsessilibus; floribus aggregatis; petalis calycem æquantibus, semisuperis. — *Hab.* in lateribus irriguis montium subalpinorum rarius, e. gr. Kusamo ÆMILÉ.

** *Caus.*

** *Caulescentes, foliis indivisis.*

249. *S. OPPOSITIFOLIA* (L.): caule calycibusque glabris; foliis obovatis, coriaceis, ciliatis: inferioribus imbricatis, superioribus oppositis; floribus solitariis, terminalibus, semisuperis. — *Hab.* in lateribus alpium Utsjoki & montium subalpinorum Kufamo rarius.

250. *S. AIZOIDES* (L.): caule decumbente; foliis alternis, lineari-subulatis, subciliatis, mucronatis; floribus paniculato-racemosis, semiinferis, planis. — *Hab.* in confinio alpium juxta flumen utsjokense sat copiose.

251. *S. HIRCOLUS* (L.): caule erecto, unifloro; foliis caulinis alternis, lanceolatis, nudis, obtusiusculis; floribus inferis, campanulatis. — *Hab.* in pratis paludosis Oltrobothniæ & Lapponiæ passim.

*** *Caulescentes, foliis dissectis.*

252. *S. TRIDACTYLITES* (L.): caule subpaniculato; foliis viscosis: radicalibus oblongis, subintegris; caulinis cuneiformibus, trifidis, capsulis inferis, globosis. — *Hab.* in collibus arenosis rarius, e. gr. in Kufamo.

253. *S. GRANULATA* (L.): radice granulata; caule paniculato; foliis radicalibus reniformibus, lobatis; caulinis multifidis; germine semiinfero. — *Hab.* in graminosis declivibus Finl. inferioris passim.

Gen. CIII. *CHRYSOSPLENIUM.*

254. *C. ALTERNIFOLIUM* (L.): foliis alternis, reniformibus, crenatis; floribus sessilibus. — *Hab.* ad scaturigines umbrosas rarius.

Gen. CIV. *ADOXA.*

255. *MOSCHATELLINA* (L.): radice squamata; caule simplicissimo, erecto; foliis radicalibus biternatis: foliolis 3-fidis; caulinis oppositis, ternatis: foliolis bi- l. trilobis. — *Hab.* in nemoribus umbrosis Finl. australis & medialis minus frequens.

ORDO XXIII. UMBELLIFERÆ.

Calyx ovario adhærens, limbo 5-dentato, aut integro subullo; petala 5 ovario aut glandulæ ovarium tegenti inserta; stamina 5, petalis alterna & cum iisdem inserta; styli 2, sæpius persistentes, divaricati; fructus scissione bipartibilis constans ex duabus akenis, nempe feminibus calyce adhærentibus, superius propendentibus ex axe-filiformi, primum coalitis, demum a basi ad apicem segregatis; corculum minimum ad apicem perispermii lignosi; radícula supera. — Herbæ foliis alternis, sæpius decompositis; floribus umbellatis aut rarissime capitatis, involucro & involucello sæpius cinctis. (De Candolle).

† *Umbella universali & partiali nudis (prior interdum involucro spurio.)*

CV. **ÆGOPODIUM**: Involucra nulla; Calyx nullus; Petala æqualia, emarginata: apiculo inflexo, uncinato; Semina ovalia, gibba, 5-costata, stylis deflexis coronata.

CVI. **PASTINACA**: Involucra nulla; Calyx integer; Petala subæqualia, integra, incurva; Semina elliptica, compresso-plana, 3-costata, subalata, emarginata.

CVII. **PIMPINELLA**: Involucra nulla; Calyx integer, obsoletus; Petala æqualia, emarginata: apiculo inflexo, canaliculato; Semina ovalia, gibba, 5-costata.

CVIII. **CARUM**: Involucrum universale spurium, monophyllum; parziale nullum; Calyx integer; Petala subæqualia, carinata, inflexo-emarginata; Semina oblonga, gibba, 5-costata.

†† *Um-*

†† *Umbella universali nuda, partiali involucrata.*

CIX. CUCUTA: Involucrum universale nullum; partiale polyphyllum; Calyx integer; Petala æqualia, inflexa; Semina subglobosa, 5-costata: costis tuberculatis.

CX. PHELLANDRIUM: Involucrum universale nullum; partiale polyphyllum, patulum; Calyx dentibus binis majoribus, persistentibus; Petala patula, æqualia, obcordata, apiculo inflexo; Semina elliptica, gibba, lævia, connata, calyce stylisque coronata.

CXI. OENANTHE: Involucrum universale nullum; partiale polyphyllum; Calyx 5-dentatus, persistens; Petala inæqualia, exteriora maxima; Semina oblonga, sulcata, calyce stylisque erectis coronata.

CXII. CHÆROPHYLLUM: Involucrum universale nullum, partiale subpentaphyllum, reflexum: foliolis concavis, ciliatis; Calyx nullus; Petala subæqualia, plana, obcordata; Semina oblongato-subulata, lævisima, rostro brevi costato.

CXIII. ÆTHUSA: Involucrum universale nullum; partiale sub-tetraphyllum, unilaterale, pendulum; Calyx obsoletus; Petala subinæqualia, scrobiculata, bifida, apiculo obtuso inflexo; Semina subglobosa, 5-costata.

††† *Umbella universali & partiali involucratis;
feminibus planis l. alatis.*

CXIV. ANGELICA: Involucrum universale oligophyllum, subcaducum; partiale polyphyllum; Calyx obsoletus; Petala æqualia, acuminata, arcuato-

incurvata; Semina planiuscula, 3-costata, membranaceo-marginata.

CXV. SELINUM: Involucrum universale subpolyphyllum; parziale polyphyllum; Calyx nullus; Petala subæqualia, obcordata, conniventia; Semina compressa, ovalia, 3-costata, marginibus alatis.

CXVI. LASERPITIUM: Involucra polyphylla; Calyx subquinquedentatus; Petala æqualia, obcordata; Semina quadricostata, costis alatis.

CXVII. HERACLEUM: Involucrum universale caducum; parziale polyphyllum; Calyx subinteger; Petala inæqualia: interiora inflexo-emarginata; exteriora bifida; Semina plana, margine alata.

CXVIII. PEUCEDANUM: Involucra brevissima; Calyx 5-dentatus; Petala æqualia, oblonga, apice inflexo; Semina ovalia, convexa, margine subalata, medio costata.

†††† *Umbella universali & partiali involucratis;
feminibus gibbis.*

CXIX. SIUM: Involucra polyphylla, persistencia; Calyx denticulatus, persistens; Petala æqualia, obcordata, erecta, apiculo inflexo obtuso; Semina subovata, gibba, 5-nervia.

CXX. CONIUM: Involucra dimidiata, reflexa: universali subpentaphyllo, partiali triphylo; Calyx obsoletus; Petala æqualia, emarginata, apiculo inflexo, obtuso; Semina subglobosa, gibba, costis undulatis, demum nodosis.

CXXI.

CXXI. ATHAMANTA: Involucra polyphylla, adpressa; Calyx obsoletus; Petala æqualia, obcordata, apiculo uncinato; Semina ovata, gibba, 5-costata, hirsuta.

††††† *Umbella universali & partiali involucretis; seminibus hispidis.*

CXXII. TORILIS: Umbellæ multiradiatæ; Involucra polyphylla, adpressa: foliolis indivisis; Flores disci abortientes; Calyx 5-dentatus, persistens; Petala strigosa, inæqualia, extrorsum subradiantia, obcordata, apiculo brevi; Semina oblonga, 5-costata, hispida.

CXXIII. SANICULA: Umbella universalis triradiata, involucro diphylo, subpinnatifido; partialis subcapitata, involucro polyphylo; Flores disci abortientes; Calyx 5-dentatus; Petala æqualia, erecta, inflexa; Semina ovata, muricata aculeis uncinatis.

Gen. CV. ÆGOPIDIUM.

256. *Æ. PODAGRARIA* (L.): foliis radicalibus triternatis, summis ternatis: foliolis ovalibus, inciso-ferratis. — *Hab.* in umbrosis Finl. interioris rarius.

Gen. CVI. PASTINACA.

257. *P. SATIVA* (L.): foliis pinnatis, glabris: foliolis ovaro-oblongis, inciso-lobatis, exterioribus trilobis. — *Hab.* jamjam spontanea in aggeribus & cultis ad pagos Finl. australis passim, ex hortis propagata.

Gen. CVII. PIMPINELLA.

258. *P. SAXIFRAGA* (L.): foliis pinnatis: foliolis radicalium subrotundis, inciso-ferratis; caulnorum pinnatifidis:

dis: laciniis linearibus, integerrimis. -- *Hab.* in collibus aridis frequens.

259. *P. DISSECTA* (WILLD.): foliis pinnatis: pinnis omnium multipartitis: laciniis falcato-linearibus, acutis. -- *Hab.* in campis arenosis paroeciæ Vitsbofjerd Ditionis Bjoerneburgensis rarissime SAHLBERG,

Gen. CVIII. CARUM.

260. *C. CARVI* (L.): foliis bi- & tripinnatis, glabris; vaginis tumidis; stipulis multifidis. -- *Hab.* in pratis, pascuis & agrorum marginibus vulgarissime.

Gen. CIX. CICUTA.

261. *C. VIROSA* (L.): foliis glabris: radicalibus tripinnatis: pinnis divaricatis; caulinis simpliciter l. bipinnatis: pinnis lanceolatis, incis, ferratis; stipulis petiolo adnatis, obtusis; umbellis oppositifoliis. -- *Hab.* ad ripas lacuum & fluviorum frequens.

Gen. CX. PHELLANDRIUM.

262. *P. AQUATICUM* (L.): foliis bi- l. tripinnatis: pinnis divaricatis; umbella pauciradiata. -- *Hab.* in lacubus & rivulis rarius.

Gen. CXI. OENANTHE.

263. *OE. FISTULOSA* (L.): stolonifera; foliis radicalibus bi- l. tripinnatis: foliolis planis, cuneatis, lobatis; caulinis pinnatis, tubulosis; umbellis fructiferis densis. -- *Hab.* in paludosis rarissime, e. gr. prope Uloam JULIN.

Gen. CXII. CHÆROPHYLLUM.

264. *C. SYLVESTRE* (L.): caule sulcato: geniculis tumidiusculis, pubescentibus; foliis bi- & tripinnatis: foliolis inciso-pinnatifidis. -- *Hab.* in pratis fertioribus & ad pagos frequentissime.

Gen.

Gen. CXIII. ÆTHUSA.

265. *Æ. CYNAPIUM* (L.): foliis conformibus, tripinnatis: pinnulis incis: laciniis linearibus, acuminatis; umbellis utrisque pauciradiatis. — *Hab.* in cultis vulgatissime.

Gen. CXIV. ANGELICA.

266. *A. ARCHANGELICA* (L.): foliis radicalibus biternatis: foliolis incis, lateralibus bipartitis; caulinis bipinnatis: pinnis ovatis, inciso-ferratis, impari triloba; vaginis inflatis, coloratis. — *Hab.* in pratis subsylvaticis humidis passim, præsertim in Finl. boreali vulgaris.

267. *A. SYLVESTRIS* (L.): foliis bipinnatis: pinnis æqualibus, indivisis, ovato-oblongis, argute ferratis; vaginis subinflatis, concoloribus. — *Hab.* ad rivulos & in pratis humidis frequens.

Gen. CXV. SELINUM.

268. *S. PALUSTRE* (L.): caule angulato; involucre polyphylo; petiolis laxè vaginantibus; foliis triplicato-pinnatis: pinnulis lineari-lanceolatis, acutis. — *Hab.* in paludosis sylvaticis sat frequens.

269. *S. CARVIFOLIA* (WILLD.): caule angulis membranaceis; involucre suptriphylo, unilaterali, deciduo; petiolis lateralibus; foliis triplicato-pinnatis: pinnulis lanceolatis, calloso-mucronatis. — *Hab.* in graminosis submontosis Nylandiæ rarius AF FORSELLES.

Gen. CXVI. LASERPITIUM.

270. *L. LATIFOLIUM* (L.): foliis biternatis l. bipinnatis: foliolis oblique cordatis, mucronato-dentatis. — *Hab.* in pratis montosis umbrosis passim, præsertim insularum maritimarum Finl. australis.

Gen.

Gen. CXVII. HERACLEUM.

271. H. SPHONDYLIIUM (L.): foliis pinnatis, scabris: foliolis pinnatifidis: laciniis oblongo-lanceolatis, dentatis, inæqualibus. — *Hab.* in pratis nemorosis Finl. australis & medialis sat frequens.

Gen. CXVIII. PEUCEDANUM.

272. P. SILAUS (WILLD.): foliis supradecompositis: foliolis pinnatifidis: laciniis lineari-lanceolatis; involucro universaliter subdiphylo. — *Hab.* in pratis uliginosis Nylandiæ rarissime AF FORSELLES.

Gen. CXIX. SIUM.

273. S. LATIFOLIUM (L.): foliis pinnatis: foliolis oblongo-lanceolatis, argute serratis. — *Hab.* in ripis lacuum & fluviorum passim.

Gen. CXX. CONIUM.

274. C. MACULATUM (L.): caule maculato; foliis supradecompositis, glabris: pinnulis lanceolatis, argute serratis; involucellis brevissimis, lanceolatis. — *Hab.* in ruderalis & agrorum marginibus minus frequens.

Gen. CXXI. ATHAMANTA.

275. A. LIBANOTIS (L.): foliis bipinnatis, glabris: foliolis pinnatifidis: laciniis ovatis, acutis. — *Hab.* in collibus pratorum passim.

Gen. CXXII. TORILIS.

276. T. ANTHRISCUS (HOEFEM.): foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis, serratis, scabris; aculeis seminum incurvis, apiculatis. — *Hab.* in ruderalis Finl. australis rarius.

Gen. CXXIII. SANICULA.

277. S. EUROPEA (L.): caule scapaceo, unifolio: foliis 5-lobis: lobis trifidis, dentatis; flosculis omnibus sessilibus. — *Hab.* in actis Alandiæ passim.

FAMIL-